PRÆLUDIA BOTANICA

ROBERTI MORISON

SCOTI

ABERDONENSIS.

HORTUS REGIUS

BLESENSIS AUCTUS,

CUM

Notulis durationis & Charactiſmis Plantarum tam additarum, quam non ſcriptarum;

ITEM

Plantarum in eodem horto Regio *Bleſenſi* aucto contentarum, nemini hucuſque ſcriptarum, brevis & ſuccincta delineatio.

Quibus acceſsere

Obſervationes Generaliores (Plantarum in eodem horto Regio *Bleſenſi* aucto contentarum) rei Herbariæ ſtudioſis valdè neceſſariæ, & cognitu perutiles.

PRÆLUDIORUM BOTANICORUM

Pars prior.

AUTHORE

ROBERTO MORISON Medico & Profeſſore Botanico, *ſereniſſimo* CAROLO *ſecundo, magnæ* Britanniæ, *&c. REGI.*

Doctis (in arte) ſcribo:
Indoctos docebo.

LONDINI.

Typis Tho. Roycroft, *Impenſis* Jacobi Alleſtry *ad Inſigne Roſæ Coronatæ in vico vulgò dicto* Duckiane, *Anno* 1669.

BIBLIOTHECA BOTANICA

SERENISSIMO
ET
POTENTISSIMO
CAROLO II.
Magnæ Britanniæ, Franciæ, *&*
Hyberniæ,
REGI.

Sereniſſime REX:

CUM *Hortum Regium* Bleſenſem *auctum*, *pro tertia vice typis committere decreveram. Statim ſubiit animum meum, aliquid de novo addere,*

præter nomenclaturam Authorum, in plantis recitandis: quod Reipublicæ Botanicæ *ejusque emolumento publico inservire queat. Quare ex longa experientia edoctus: durationem Stirpium omnium ibidem contentarum, per notulas* ☉ *scilicet* ♃ ♀, *apposite satis ad eandem indigitandam quadrantes; alios docere æquum judicavi. Plantas præterea* 260. *a nullo Authore descriptas exhibeo, & Charactismo* ♌, *serenissimi principis* Gastonis Franciæ (*Majestatis vestræ*) *Avunculi easdem honoravi. Quia ejus liberalitate & impensis fuerunt acquisitæ. Easque hic breviter & succincte delineavi; ut prodessent omnibus & singulis, quibus volupe est Artis* Botanicæ *studium. Porro observationes generaliores (Plantarum in horto eodem Regio contentarum) rei*

Her-

Herbariæ ſtudioſis valde neceſſarias & cognitu perutiles edo. Plantas inſuper 360, *in eodem prædicto horto Regio auctо contentas, plus minuſve, Aſteriſco affectas offero. Quo augmento accrevit idem hortus Regius* Bleſenſis *ab Anno* 1655, *uſque ad Annum* 1660 *quo Anno, extinctus eſt ſereniſſimus, Majeſtatis veſtræ, Avunculus, omnium* Botanicorum *Patronus & Mœcenas vere Regius: verſatiſſimus & oculatiſſimus, in Arte* Botanica *Princeps. Cui ego per decennium, in indagandis & in hortum Regium invehendis plantis, operam navavi iiſdem ex omnibus* Galliæ *tractibus collectis; præter meridionales Alpinos & Pyrenæos Montes: ad quos nos mittere (ſi Dii voluiſſent) decreverat. Quin & methodum meam novam a*

natura datam, a me ſolummodo (citra jactantiam) obſervatam; a nullo niſi meipſo, in hunc uſque diem detectam, quamvis mundi incunabilis ſit coæva; Deſignatoribus, Chalcographis & (id genus) aliis hominibus ingenioſis comminiſſet, publicique juris feciſſet. Sed proh! dolor atque decus Botanicorum *inevitabili fato, morte præventus, tam Charus Mœcenas; qui nullis ſumptibus pepercit, ut tam indigenas, in* Gallia *ſponte venientes, quam aliunde, ex omnibus mundi plagis; omnis generis haberet plantas. Nunquam ſatis eb hoc, omnibus* Botanicis *tam præſentibus, quam adventuris & mihi præcipue laudandus. Ego ut viam præſternerem methodo novæ, a me ſolummodo (ut ſupra dictum) detectæ, con-*

cinnaturus

cinnaturus historiam generalem, omnium Stirpium, tam Arborum, fruticum quam suffruticum, per Tabulas cognationis seu affinitatis, amicorum quorundam (imo doctorum) Botanicorum precibus, pluries tam hic quam alibi terrarum, verbis coram, literis è longinquo solicitatus. Ut has meas primitias (tanquam præludia Botanica, ad methodum prædictam) in lucem darem. Oratum me sæpe fateor, tandem me exoratum habuere. Atque ingenii mei, in Arte Botanica specimen exhibere volui. Quin & Patronum (Majestate vestra Augusta) aptiorem eligere non potui, cui collectionem hanc Plantarum, voverem aut dicarem: quicquid est, est novum. Cui inquam aptius voverem aut inscriberem, quam M. V.

quum

quum eundem mihi obtines locum, quem defunctus vester Avunculus. Alumnus sum vester, in vestro solo, antiquo scilicet vestro Regno Scotorum, *natus & educatus. Ad idem Officium vobis reddendum vocatus, eandemque quam apud Avunculum M. V. sustineo hic Provinciam. Ideo M. V. in defuncti Avunculi vestri locum vicemque sufficere, par erat. Quare primitias has nostras, præludiorumve* Botanicorum *horum nostrorum, partem hanc primam accipe (serenissime REX) fronte serena, meque benigne intuere. Dum subliniora quæ meditor, id est methodum novam, nulli adhuc auditam, per Tabulas cognationis disponentem, omnes vegetabilium classes: Modo faveat Augusta vestra Majestas, nostris conatibus, & laboribus æstate,*

lucubra-

lucubrationibus hyeme, per aliquot annos exantlatis: partim sub Auspiciis Avunculi vestri in Gallia, Gastonis Franciæ; *partim sub Auspiciis vestris hic. Quod si annuere hoc mihi digneris: Polliceor* Britanniam *vestram, cum methodo exactissima (quæ est naturæ ipsius) imposterum, in re* Botanica *gloriari posse: quemadmodum,* Italia, Gallia, Germania, *superiori sæculo, sine methodo, in Scientia* Botanica, *gloriatæ sunt. Penes me eandem nunc habeo, sed unde designatorum Chalcographorumque labores compensentur, non mihi suppetit. Tandem ut concludam, quod beatæ memoriæ, serenissimi Principis* Gastonis, *Patroni & Domini (quondam) mei dignissimi vovi; jam tandem partim persolvi: Cætera (favente Numine) persolvam. Has nostras primitias,*

primitias, benigno ſi M.V. intueatur oculo; animum nobis addet, ad majora & ſublimiora prompte edenda.

Sereniſſimæ veſtræ

MAJESTATIS,

Fideliſſimus & devotiſſimus

Servus Domeſticus

MEDICUS

&

Profeſſor *Botanicus*

ROBERTUS MORISON.

PRÆFATIO
AD
Lectorem Botanicum.

Catalogum omnium Stirpium, in horto Regio Bleſenſi *vegetantium, ſub interitum Mecœnatis ipſius, exhibiturus. Certiorem te redderem (amice lector) neminem in quacunque re fœlicitèr verſari: niſi inclinatione naturæ, fatove vel divinâ ordinatione ad eam trahatur. Quæ omnia in Celſitudine ejus Regiâ,* Aurelianenſi *Duce defuncto, in re* Botanicâ *concurrere videbantur. Nam ab ineunte ætate, (pueritiâ ſcilicet) incepit illi hic ardor* Botanicus, *quique cum adoleſcentiâ accrevit; ætate mediâ, ſtabilita & conformata fuit. Ut paucis multa comprehendam, principem oculatiorem, poſt* Salomonem, *in re* Botanicâ *orbis nunquam tulit. Quapropter non potiore jure, naturali*

propen-

propenſione, Medicinam affectantes; Apollo Æſculapius, Machaon, *atque* Podalyrius, *in Divorum numerum à Veteribus relati: quam ſereniſſimus hic Princeps,* Botanicorum *Divus, poſteris denominandus. Obſervabis (amice lector) plantas omnes hac notulâ* ☉ *affectas, vivaces ſeu perennes denotari. Plantas vivaces ſeu perennes appello, quarum radix (poſtquam defloruerint, ſemenque produxerint plantæ) novos quotannis emittit Aſparagos cauleſve, quin & ex eâdem radice, de novo ſingulis annis reviveſcunt plantæ perennes. Arbores & frutices nulla indigitantur notâ, quippe ſponte ſeſe declarant vivaces. Plantas autem quibus paſſim affigitur hæc notula* ♀ *intellige (amice lector) annuas, per annuas, non ſolùm intelliguntur eæ plantæ, quæ intra anni ſpatium, ſemen ſuum perficiunt, ſed & quæ ſecundo, aut perrarò tertio anno, ſemine perfecto, exſiccantur pereuntque nulla reſtibili radice; ex quâ de novo, ſtolones ut perennes emittant. Has duas notulas* ☉, *&* ♀ *ad plantarum durationem indigitandam elegi: quippè ut aurum, in multos annos ignem facilè perfert, ſine perditione; ita plantæ perennes, plurimos Solis*

acceſſus

acceſſus & receſſus, paritèr facillimè tollerant, ſeſe renovantes de novo quotannis. Mercurii omnium metallorum magìs fluidi & ad ignem poſiti, citiſſimè evanidi, notulam hanc ☿ annuis affixi; quippè annuæ intra annum (ut plurimum) pereunt. Nota inſupèr plantas in Catalogo hoc contentas, quibus adjicitur Characteriſmus ℭ esſe non ſcriptas apud Authores, ſed à nobis primò exhibitas. Quoniam ſereniſſimi principis Gaſtonis Franciæ, *imperio, juſſu & expenſis, acquiſitæ & examinatæ fuerunt; ſeu indigenæ in* Gallia, *à nobis collectæ, ſive è longinquo ad nos delatæ eaſdem ipſius Principis Characteriſmo honoravimus. Nota plantas Aſteriſco in margine notatas, fuiſſe recuperatas ab Anno* 1655. *uſque ad Annum* 1660. *quo extinctus eſt Mecœnas ipſe ſereniſſimus dux* Aurelianenſis. *Sic quinque illis Annis* 360 *plùs minúſve plantis, noviſſimum hunc à me auctum percipies Catalogum. Deniquè intuendo, ictu oculi percipere potes, quæ Stirpes ſunt vivaces, quæ annuæ, quæque à Celſitudine ejus Regiâ, primò exhibitæ: ipſi, ejuſque memoriæ eas acceptas refer. Cum enim, omnium Stirpium, tam in agris ſpontè naſcentium, quam in hortis*

tis Celſitudinis ejus, Regiæ educatarum (ex frequenti omnium ſeminum inſpectione & ad invicèm collatione) durationem, longâ, nempè decennali experientiâ didicimus: hanc liberè Botanicæ *rei ſtudioſis exhibemus. Nec hoc à quovis ante nos factum. Ideò omnibus & ſingulis* Botanicis, *opus gratum ac maximè deſideratum eſſe concludimus. Porrò accipe plantarum* 260 *in eodem horto Regio* Bleſenſi *auctò contentarum; brevitèr & ſuccinctè à nobis factam delineationem. Quin & inſuper adjecimus (quorundam amicorum precibus) obſervationes generaliores,* Botanicis *valdè neceſſarias & cognitu perutiles; atque ex hiſce ſuprà citatis, conſtruere præludiorum* Botanicorum *noſtrorum partem primam, operæpretium duximus.* Vale.

(Amice Lector)

Tuus humillimus

& ad omnia paratus, ſervus

Rob. Moriſon M. & P.B.R.

In Hortum Regium Blesensem.

HINC, nulli biferi miranda Rosaria pelti.
Nec mala hesperidum, vigili servata Draconi.
Si Paradisiacis quicquam (sine crimine) campis;
Conferri possit. Blæsis *mirabile spectat!*
Magnifici Gastonis *opus: qui terra capaci;*
Quicquid alit fœcunda sinu, plantasque tenellas;
Robur & Arboreum, modico consevit in Horto.
Bersabidem perhibent, novisse à Graminis herba,
Ad Libani *Cedros. Coluit propriisque locavit*
Sedibus hic princeps: siccis montana reponens
Udis ima locis. Ut vultu cuncta venirent
Nativo, facilique florent tibi nota labore.

posuit JACOBUS METELANUS Scotus

Ad Lectorem Botanicum.

DEsine mirari claris Babylonis *in Hortis.*
Pendula, cottilibus, semina fulta pilis.
Nec sese Alcinoi *jactent Pomaria, plures*
Plantas Blesensis *nobilis Hortus alit,*
Quas decus Hectoridum variis distinxit arenis
Gastonus, *populo Pharmaca sana suo:*
Principibus cædis multis, Laus maxima habetur.
Cura erat huic hominum, principe digna, salus.
Regia progenies, mens Regia, Regia virtus,
Regia vita, obitus Regius ipse fuit.
Gastoni *Auspiciis magni, collegerat herbas*
Quotquot in Europa, *quotquot ubique virent,*
Primus & Astragalos meminit, Scutellariasque
Morisonus, *Patria splendida fama suæ.*

Morisoni *nomen cunctis celebrabitur Hortis:*
Dum sua cum foliis semina planta feret.

Canebat CLAUDIUS CRITCHTONIUS Scotus.

In Horti Regii BLESENSIS, ejusque Authoris Encomium: scribit Authoris amicus.

QUÆ Dives Natura mihi miracula jactat,
Thesaures pandens Ambitiosa novos?
Mirandum Gastonis *opus! dabit Area, quicquid*
Orbe datum est; ingens in nuce mundus adest.
Quicquid ubique viget plantarum, hæc horrea servant.
Hic stupet ornatus flora vel ipsa suos,
Area sparsa suis stellis, velut Æthera, luce,
Invidiosa polis, inferiore micat;
Nec Morisone *minor Tua gloria; Qualilet herba*
Naturæ paret legibus, atque Tuis,
Sceptra tenens, clauso plantarum in carcere regnas
Surgit & Auspiciis herba cadítque Tuis.
Quasque prius terris, nunc chartis inseris herbas
Et datur in Libris Vita secunda Tuis.
Quæque suis foliis poterat tam sæpe perire
Non poterit foliis planta perire Tuis.
Quid quod & hæc tantum vibras lusoria tela
Ridet & hæc tanquam ludicra majus opus.
Non aliter Liber hic quam magni Anteambulo Regis
Sive sunm veluti Phosphorus ante diem
Illa edas cunctis optata volumina votis
Illud, quo majus non habet Orbis, opus.
Illic innumeras Tu digeris ordine plantas
Illic in proprios herba redacta locos
Illa Tibi fient monumenta perennia; vitam
Quam dederas herbis & dabit herba Tibi.

ALEXANDER MORISON *A. M.*

Explicatio nominum Authorum, in Horto Regio *Blesensi* auctorum Citatorum.

AD. & Adv. Lob. Lobelius in Adversariis.

Ad. Lob. part. pr. & part. alt. Lobelium in Adversariorum parte prima, & parte altera.

Ama. Amat. Amatus Lusitanus.

Apul. Apuleius.

Bapt. Ferr. & Ferrar. Joh. Baptista Ferrarius.

Bell. Bellon. Petrus Bellonius.

Bauh. Pin. B Pin. Casparus Bauhinus in Pinace.

Bauh. Prod. B. Prod. & Prodr. Casparus Bauhinus in Prodromo.

Bauh. & B. Phytop. Casparus Bauhinus in Phytopinace.

B. Pin. app. Bauhinus in Pinacis appendice.

C. B. Pin. Casparus Bauhinus in Pinace.

Casp. Bauh. in Pin. C. B. P. aliquando C. B. Casparus Bauhinus in Pinace.

C. B. Prod. descr. Casparus Bauhinus in Prodromo, descriptione.

Cæs. & Cæsalp. Andreas Cæsalpinus.

Cam. & Camer. Camerarius in Epitome Matthioli & horto suo.

Cest. Castor Durantes.

Clus. hist. vel Clus. Carolus Clusius in historia sua rariorum.

Clus. desc. Clusius in historia rariorum descriptione.

Clus. cur. post. Carolus Clusius in curis posterioribus.

Clus. ex. & exot. Carolus Clusius in historia exoticarum.

Clus. hist. app. 1. & app. alt. Carolus Clusius in appendice prima & altera ad historiam.

Col. & Colum. Fabius Columna in historia de minùs cognitis.

Col. Phytob. Fabius Columna in Phytobasano.

Cord. & Cord. hist. Cordus in historia sua Plantarum.

Corn. & Cornuti, Jacobus Cornutus de plantis suis Canadensibus.

Dalech. & Dal. Dalechampius. Dal. & Dalechamp. Dalechampii hist. Lugd. est historia Lugdunensis citans Dalechampium.

Diosc. Dioscorides. Dod.

Dod. Dodonæus *in* hiſtoria pemptadum, editione Latina *in folio.*

Dod. Gall. ed. Dod. ut. & utr. Dodonæus *in* editione Gallica, *&* utraque tam Gallica (à Carolo Cluſio edita) quam ſua Latina.

Dod. deſc. Dodonæus *in folio Latinè, deſcriptione.*

Deſc. & deſcr. poſt citationem Authoris, denotant plantam ab ipſo Authore citato ſcriptam, non figuratam: ut Lob. Dod. Cluſ. &c. deſc. ſignificat ab ipſis eſſe deſcriptam.

Eyſt. & Eyſtet. & hort Eyſt. hortus Eyſtettenſis à Beſlero editus.

Fuch. Fuchius *in* hiſtoria ſua Latina, *in folio.*

Ger. Johan. Gerardus, emaculatus à Janſono.

Geſ. Geſn. Geſnerus *in* corrallario, hiſtoriæ Cordi, addito: *&* in Libello de collectione Stirpium

Hiſt. Lugd. & Lugdun. hiſtoria Lugdunenſis Latinè edita *in folio.*

Hiſt. & hiſtor. Mex. & Mexitan. hiſtoria Mexicana *in folio.*

Hiſt. ſ. hiſtor. Braſil. hiſtoria Braſiliana *in folio.*

Hort. Farneſ. & Farn. hortus Farneſianus.

Hort. Eyſt. & Eyſtet. hortus Eyſtettenſis.

Icon. Lob. Lobelius *in* Iconibus.

Imperat. ſerantes Imperatus in ſua hiſtoria naturali.

Joh. Bauh. & J. B. Johannes Bauhinus. in univerſali ſua hiſtoria, tribus Tomis digeſta.

Lob. Icon. obſ & Ad. & Adver. Lobelius in Iconibus, forma oblonga, obſervationibus & Adverſariis Stirpium: in folio.

Lug. & Lugdun. hiſtor. hiſt Lugd. & Lugdun. hiſtoria Lugdunenſis, Lugduni excuſa, lingua Latina: in folio.

Matth. & Matt. ed. Bauh. Mattheoli editionis Bauhini citatio.

Maran. & Maranthæ, Bartholomæus Maranta.

Muton. & Mutoni. Mutonus ab Authoribus citatus.

Obſ. & Icon. Lob. Lobelius in Obſervationibus & Iconibus ſuis.

Obſ. Lob. & ad. Lob. Lobelius in Obſervationibus & Adverſariis ſuis.

Park. Johannes Parkinſon, in ſuo Theatro Botanico.

Park. in appad. Theat. Joh. Parkinſon in appendice ad Theatrum ſuum Botanicum.

Park. parad. idem Joh. Parkinſon in ſuo Paradiſo terreſtri.

Paſſ.

Pass. Passæi. Passæus in Iconibus suis in forma oblonga.

Plin. Plinius.

Pon. & Ponæ, Johannes Pona in editione sua Latina.

Pon. & Ponæ. desc. Mont. Bald. Johannes Pona in Montis Baldi descriptione.

Prosp. Alp & Alpin. de plant. & plan. Ægypt. Prosper Alpinus de plantis Ægypti.

Prosp. Alp. exot. Prosper Alpinus de exoticis.

Rob. Steph. Præd. Rust. Robertus Stephanus in Prædio Rustico suo.

Ruel. & Ruell Johannes Ruellius.

Stapel & Stapelii, Johannes Boda Stapelius, novissimus in Theophrastum Commentator.

Swert. Swertius in florilegio suo.

Tab. & Tabern. Theodorus Tabernemontanus in Iconibus suis in forma oblonga.

Thal. & Thalii, Johannes Thalius in Sylva sua Harcynica.

Theoph. & Theophr. Theophrastus.

Trag. & Tragi, Hieronymus Tragus in historia.

Vesl. & Vesling. Obs. in Prosp. Alp. Veslingii Observationes in Prosperum Alpinum.

Valet. hortus valet, Acupictorum in usum factus.

Dese-

Desc. & descript. intellige Authoris citati plantam scriptam, non figuratam.

Col. & Colum. in hallucinationibus Caspari Bauhini *à nobis primo exhibitis, Columnam designat. I. & II. Pl. primam & secundam demonstrat (post paginam designatam) plantam prædictæ Columnæ.*

Quicunque plura, de Authoribus desiderat; consulat Casparum Bauhinum, *sub introitum Pinacis sui, ibi prolixiùs docet. Qui fuêre Authores omnes, qui (ante suum sæculum) de re* Botanica *scripsêre: & quo volumine & quandò ipsorum opera, in lucem prodiêre.*

Nota insuper, quando nomina Theophrasti, Dioscoridis, Plinii, Mattheoli Tragi, Thalii, Lobelii, Dodonæi, Clusii Fuchsii, Dalechampii, Ponæ, *& cæterorum (id genus) Authorum aliorum; ad longum, ab aliis citantur; scribuntur ut suprà. Et citantes ipsos curtè in* Botanographorum *monumentis, in medium adferuntur ut passim à nobis, & aliis antè nos scribentibus factitatum, observare licet.*

HOR-

HORTUS REGIUS BLESENSIS AUCTUS.

A

ABIES Hiſt. Lugd. alba ſive fœmina B. pin.

Abrotonum mas Dod. mas anguſtifolium majus B. pin. ☉

Abrotonum mas incanum Col. mas anguſtifolium incanum B. pin. ☉

* Abrotanum mas anguſtifolium maximum C. B. P. magnum camphoratum quibuſdam incenſaria cam. ☉

Abrotonum odoratum humile Dod. mas anguſtifolium minus B. pin. ☉

Abrotonum campeſtre B. pin. Artemiſia tenuifolia Dod. ☉

Abrotonum fœmina vulgare Cluſ. fœmina foliis teretibus B. pin. ☉

Abrotonum fœmina Narbonenſe Cluſ. fœmina flore majore B. pin. ☉

Abrotonum fœmina viride B. pin. fœm. ſextum Cluſ. deſcr. ☉

Abſinthium vulgare Fuchſ. latifolium Dod. Ponticum, ſeu Romanum officinarum, ſeu Dioſcoridis B. pin. ☉

Abſinthium inſipidum, Abſinthio vulgari ſimile B. pin. ♆

Abſinthium maritimum Lavendulæ folio B. pin. latifolium marinum hort. Eyſt. ☉

Abſinthium marinum Latifolium Park. ☉

Abſinthium Seriphium vulgare, perperam Dioſcoridis Icon. Lob. Seriphium Belgicum B. pin. ☉

Abſinthium Seriphium Gallicum Matth. ed. & B. pin. Narbonenſe Dod. deſcr. ☉

Abſinthium tenuifolium Dod. Ponticum Matth. ed. B. Ponticum tenuifolium incanum B. pin. ☉

Abſinthium Auſtriacum tenuifolium Cluſ. Ponticum, Tridentinum herbariorum Obſ. Lob. Ponticum tenuifolium Auſtriacum B. pin. ☉

Abſinthium Alpinum umbelliferum Cluſ. Alpinum umbelliferum latifolium B. pin. ☉

Acacia Americana Robini, Cornuti.

Acacia Ægyptiaca hiſt. Lugd. foliis ſcorpioidis leguminoſæ B. pin.

Acanthium Dod. Spina alba tomentoſa latifolia ſylveſtris B. pin. ♀

Acanthium Illyricum Obſ. Lob. ♀

Acanthium Luſitanicum. ♃ ♀

* Acanthium Illyrico accedens capitulis minoribus. ♃ ♀

Acanthus ſativus Dod. ſativus vel mollis Virgilii B. pin. ☉

Acanthus ſylveſt. Dod. aculeatus B. pin. ☉

Acarna flore luteo patulo B. pin. Carlina ſylveſtris minor Dod. ♀

Acarna flore purpurorubente patulo B. pin. Acanthioides parva Apula Col. ♀

Acarna major caule folioſo B. pin. Chamæleon Salmanticenſis Cluſ. ♀

Acer major Dod. montanum candidũ B. pin.
Acer montanum flavum .ſ. criſpum B. pin. Opulus montanus hiſt. Lugd. deſcr.
Acer minor Dod. campeſtre & minus B. pin.
Acer Monſpeſſulanum hiſt. Lugd. trifolia B. pin.

* Acetoſa criſpa I. B. ☉
Acetoſa pratenſis B. pin. Oxalis Dod. ☉
Acetoſa montana maxima B. pin. Oxalis major Broccenbergenſis Thal. ſyl. Harcyn. ☉
Acetoſa veſicaria peregrina hort. Eyſt. Americana foliis longiſſimis pediculis donatis B. pin. & prodr. ♀
Acetoſa rotundifolia hortenſis B. pin. Oxalis rotundifolia Dod. ☉
Acetoſa Cretica ſemine aculeato B. prodr. & pin. ♀
Acetoſa arvenſis lanceolata B. pin. Oxalis minima Dod. ☉

Aconitum hyemale Ponticum hort. Eyſt. Unifolium luteum bulboſum B. pin. ☉
Aconitum lycoctonon luteum majus Dod. Lycoctonon luteum B. pin. ☉

Aconitum

Aconitum lycoctonon luteum minus Dod. descr. ☉

Aconitum lycoctonon flore Delphinii Dod. cœruleum glabrum flore consolidæ regalis B. pin. ☉

Aconitum cœruleum .ſ. Napellus primus B. pin. Napellus Dod. ☉

Aconitum violaceum .ſ. Napellus ſecundus B. pin. Lycoctonon quartum Tauricum Cluſ. ☉

Aconitum lycoctonon quintum Neubergenſe Cluſ. purpureum .ſ. Napellus tertius B. pin. ☉

Aconitum lycoctonon cœruleum parvum Dod. cœruleum minus .ſ. Napellus minor B. pin. ☉

Aconitum ſpica florum pyramidali. ♃ ☉

Aconitum novum Judenbergenſe Cluſ. ☉

Aconitum ſalutiferum .ſ. Anthora B. pin. Anthora Dod. ☉

Aconitum racemoſum B. pin. Chriſtophoriana Dod. ☉

Aconitum baccis niveis Cornuti. ☉

Aconitum baccis rubris Cornuti. ☉

Acorus verus .ſ. Calamus aromaticus officinarum

narum B. pin. Acorum legitimum Cluſ. ☉

Adiantum foliis Coriandri B. pin. Adiantum ſ. Capillus Veneris verus Ad. Lob. ☉
Adiantum Americanum Cornuti. Fruticoſum Braſilianum B. prodr. ☉
Adiantum nigrum Plinij Lob. Dryopteris nigra Dod. ☉

Adonis Matth. ed. B. ſylveſtris flore phœniceo B. pin. ♃
Adonium luteum Tab. ♃

Æthiopis Dod. foliis ſinuoſis B. pin. ♃

Ageratum Matthioli hiſt. Lugd. foliis ſerratis B. pin. ☉
Ageratum floribus candidis Obſ. Lob. ☉
Ageratum purpureum hiſt. Lugdun. ſerratum Alpinum B. pin. ☉
Ageratum villoſum purpureum. ♃ ☉

* Agrimonoides Col. ☉
Alaternus prima Cluſ. Philyca elatior B. pin.
Alaternus foliis ex albo variegatis. ♄
Alaternus foliis ex luteo variegatis. ♄

Alcea

Alcea vulgaris Dod. vulgaris major B. pin. ☉
Alcea folio rotundo laciniato B. pin. Malva .ſ. Alcea montana Col. ☉
Alcea fruticoſa cannabino folio Cluſ. cannabina B. pin. ☉
Alcea Syriaca hort. Eyſt. arboreſcens Syriaca B. pin. Althæa frutex ſecunda Cluſ. ☉
Alcea Syriaca flore candido Hort. Eyſt. ☉
Alcea Veneta hort. Eyſt. veſicaria Dod. B. pin. ♀
* Alcea veſicaria capitis bonæ ſpei ♃ ♄
Alcea villoſa Dalechampij hiſt. Lugd. hirſuta B. pin. ♀
Alcea Indica parvo flore B. pin. Ægyptia Cluſ. Bamia Alexandrina Cæſalp. ♀
Alcea Ægyptiaca villoſa B. pin. Bamia moſchata Veſlingij Obſ. in proſp. Alp. ♀

Alchimilla Dod. vulgaris Cluſ. B. pin. ☉
Alchimilla minor. ♃ ☉
Alchimilla minima montana Col. Saxifraga .ſ. Perchepier Anglorum Icon. Lob. Chæ-

rophyllo nonnihil ſimilis B. pin. ♀

Alliaria Dod. B. pin. ♀

Allium Dod. ſativum B. pin. ☉
Allium ſphæriceo capite, folio latiore B. pin. Ampelopraſum Dod. Scorodopraſum primum Cluſ. ☉
Allium Urſinum Fuchſ. ſylveſtre latifolium B. pin. ☉
Allium anguinum Matthioli hiſtor. Lugdun. montanum latifolium maculatum Bauh. pin. Victorialis longa Cluſ. ☉
Allium ſylveſtre tenuifolium Dod. campeſtre juncifolium capitatum purpuraſcens majus B. pin. ☉
* Allium inſipidum juncifolium Gethoides ſylveſtre Col. ☉
Allium montanum bicorne flore obſoletiore B. pin. Moly lurido colore Swertij. ☉
Allium juncifolium bicorne luteum B. prodr. & pin. ☉
Allium montanum capite rotundo B. pin. Allium ſeu Moly montanum quintum Cluſ. ☉
Allium montanum foliis Narciſſi majus B. pin.

pin. Allium ſ. Moly Narciſſinis foliis primum Cluſ. ☉

Alnus Dod. vulgaris Cluſ. rotundifolia glutinoſa viridis B. pin.
Alnus nigra baccifera hiſt. Lugd. B. pin. Frangula Dod.
Alni effigie lanato folio major B. pin. Aria Theophraſti effigie Alni Ad. & Icon. Lob.
Alni effigie lanato folio minor B. pin. Amelanchier Gallorum Obſ. Lob.

Aloe Dod. vulgaris B. pin. ☉
Aloe ex America Dod. folio in oblongum aculeum abeunte B. pin. ☉

Alſine heredulæ folio B. pin. hederacea Tab. ♀
Alſine foliis Veronicæ Tab. Veronicæ foliis, floſculis cauliculis adhærentibus B. pin ♀
Alſine foliis Triſſaginis Icon. Lob. chamædryfolia floſculis pediculis oblongis inſidentibus B. pin. ♀
Alſine triphyllos cœrulea B. pin. Elatine triphyllos hiſt. Lugd. ♀
Alſine ſcandens baccifera B. pin. Cucubalus Plinii hiſt. Lugd. ☉

Alſine altiſſima nemorum B. pin. major Dod. ♀

Alſine media B. pin. minor Dod. ♀

Alſine minor multicaulis B. pin. minima Dod. ♀

Alſine petræa minima Tab. minor Lini capitulis B. pin. ♀

Alſine affinis Androſace dicta major B. pin. Androſace altera Matthioli Cluſ. ♀

Alſine ſpergula dicta major B. pin. Sagine ſpergula Obſ. Lob. ♀

Alſine ſpergulæ facie .ſ. Spergula minor ſubcœruleo floſculo B. prodr. ♀

* Alſine ſpergula flo. violacio major C. B. P. ſpergula marina Dal. ☉

* Alſine ſpergula ſemine foliaceo nigro. ♋ ♀

* Alſine ſpergula, ſemine foliaceo ſubfuſco. ♋ ♀

Alſine fontana Tab. aquatica media B. pin. ♀

Alſine littoralis foliis portulacæ B. pin. Alſines Pelagicum genus Cluſ. ☉

Alſine nodoſa Germanica B. prodr. ♀

Alſine tenuifolia muſcoſa B. pin. muſcoſa hiſt. Lugd. ♀

Alsine inaperto flore. Noctiflora minima ☋ ☿

Alsine hirsuta magno flore B. pin. Auricula muris quibusdam Dod. Gall. ed. ☿

* Alsine hirsuta viscosa altera C. B. P. ☿ Folia hujus angustiora & saturatius virentia sunt.

Althæa, Ibiscus Dod. vulgaris Clus. Althæa Dioscoridis & Plinij B. pin. ☉

Althæa arborea Olbiæ Lob. frutescens folio acuto, parvo flore B. pin. ☉

Althæa Theophrasti flore luteo B. pin. Abutilon Avicenæ hort. Eyst. ☿

* Althæa flo. luteo minimo, semine rostrato. ☋ ☿

Alysson Galeni Dod. verticillatum foliis profundè incisis B. pin. ☉

Amaranthus maximus B. pin. Quinûa Clus. Blitum majus Peruanum Clus. Idem semine rubro. ♄

Amaranthus coccineus elegans maximus Park. ☿

Amaranthus maximus semine nigro. ☋ ☿

Amaranthus

Amaranthus ſpicis viridibus. ☌ ☿
Amaranthus criſtatus Camerarii hort. Eyſt. paniculâ incurvâ B. pin. ☿
Amaranthus purpureus Dod. paniculâ conglomeratâ B. pin. ☿
Amaranthus ſpicatus hort. Eyſt. ſimplici paniculâ B. pin. ☿
Amaranthus tricolor hort. Eyſt. Icon. Lob. folio variegato B. pin. ☿
* Amaranthus ſpica erecta viridi. ☌ ☿
* Amaranthus ſpica erecta obſoletè rubra ☌ ☿
* Amaranthus ſpica erecta rubra, ſemine albo. ☌ ☿
* Amaranthus auriculatus luteus Chriſtatus. ☌ ☿
* Amaranthus auriculatus luteus ſpicatus ☌ ☿
* Amaranthus auriculatus Phœniceus ſpicatus. ☌ ☿
* Amaranthus auriculatus Phœniceus criſtatus. ☌ ☿

Ambroſia campeſtris repens B. pin. Coronopus repens Lob. hiſt. Lugd. ☿

Ammi vulgare Dod. majus B. pin. ☿
Ammi Matth. ed. B. ☿ A-

Amygdalus Dod. ſativa B. pin.
Amygdalus pumila ♄ ☉
* Amygdalus putamine fragili. ♄

Anagallis phœniceo flore B. pin. mas phœnicea Icon. Lob. ☿
Anagallis flore cœruleo B. pin. fœmina cœrulea Icon. Lob. ☿
Anagallis tenuifolia Monnelli Cluſ. app. alt. ☉
Anagallis lutea nemorum B. pin. flavo flore Cluſ. ☉
Anagallis omnium minima. ♄ ☿
Anagallis aquatica major folio oblongo B. pin. Berula major Tab. ☉
Anagallis aquatica minor folio ſubrotundo B. pin. aquatica .ſ. Beccabunga Germanorum Ad. Lob. ☉
Anagallis aquatica folio rotundo non crenato B. pin. aquatica tertia Icon. Lob. ☉
Anagallis aquatica anguſtifolia B. pin. aquatica quarta Icon. Lob. Eadem flore albo. ☉

Anagyris Dod. fœtida B. pin.
Anagyris non fœtida major vel Alpina B. pin. Laburnum Dod. Gall. ed.

Anchuſa

Anchuſa puniceis floribus B. pin. minor .ſ. Alcibiadion, vel Onochiles Lob. ⊙
Anchuſa lignoſior anguſtifolia Ad Lob. anguſtifolia B. pin. ⊙

Androſæmum Dod. maximum fruteſcens B. pin. ⊙
Androſæmum Campoclarenſe Col. Aſcyrum .ſ. Hypericum bifolium glabrum non perforatum B. pin. ⊙
Androſæmum alterum Apulum Col. perfoliatum & perforatum B. pin. ⊙
Androſæmum alterum hirſutum Col. hirſutum B. pin. ⊙
Androſæmum fœtidum .ſ. Tragodes hort. Eyſt. ⊙

Anemone tenuifolia flore ſimplici dilutè purpureo. ⊙
Anemone tenuifolia flore ſimplici igneo. ⊙
Anemone tenuifolia flore ſimplici violaceo. ⊙
Anemone tenuifolia flore ſimplici albo, circa caulem purpuraſcente. ⊙
Anemone tenuifolia flore ſimplici ex albo rubeſcente. ⊙

Anemone tenuifolia flore ſimplici ſubalbido. ⊙

Anemone tenuifolia flore ſimplici dilutè violaceo. ⊙

Anemone flore pleno coccineo foliolis interius ianthinis, *Amaranthe.* ⊙

Anemone flore pleno foliis & foliolis coccineis. *Double rouge.* ⊙

Anemone flore pleno ex viridi rubeſcente, foliolis interius viridibus. ⊙

Anemone ex albo & igneo variegata. *Orlate Romaine.* ⊙

Anemone Orlate magis albeſcens. *Orlate d' Angleterre.* ⊙

Anemone flore pleno flammeo. ⊙

Anemone flore pleno dilutè violaceo. ⊙

Anemone flore pleno exiguo albo. ⊙

Anemone flore pleno hyacinthino. *Illuſtre de Leon.* ⊙

Anemone florum mali perſicæ quoad colorem æmula. ⊙

Anemone multiplex flore Ranunculi. ⊙

Anemone tenuifolia hermaphrodita. ⊙

Anemone tenuifolia ſcala dicta. ⊙

Anemone tenuifolia Aurelianenſis flore pleno eleganter variegato. ⊙

Anemone tenuifolia flore pleno coccineo Paſſæi Icon. tenuifolia multiplex purpurea B. pin. *Cramoiſine.* ☉

Anemone latifolia pavo minus polyphylla B. pin. hortenſis latifolia pavo major ſecunda Cluſ. ☉

Anemone tertia Matth. ed. B. Sylveſtris prima Cluſ. Sylveſtris alba major B. pin. ☉

Anethum Dod. hortenſe B. pin. ♆

Angelica major Dod. ſativa B. pin. ♆

Angelica ſylveſtris Dod. Sylveſtris major B. pin ♆

Angelica ſylveſtris minor .ſ. erratica B. pin. Podagraria Germanica .ſ. Belgica Obſ. & Icon. Lob. ☉

Angelica montana maxima. Archangelica Dod. Cluſ. ♆

Angelica lucida Canadenſis Cornuti. ♆

Aniſum Dod. ♆

Anonis ſpinoſa flore purpureo B. pin. Anonis Fuchſ. Dod. Eadem flore albo quæ Anonis flore albo Tab. ☉ Eadem non ſpinoſa purpurea. ☉

A-

Anonis floribus luteis exiguis. Ononis lutea ſylveſtris minima Col. ☉

Anonis non ſpinoſa flore luteo variegato B. pin. Ononis flore luteo variegato non ſpinoſa hort. Eyſt. ☉

* Anonis fruteſcens verna ſiliqua hirſuta pendula. ♃ ☉

* Anonis ſiliqua hirſuta pendula flo. luteo, viſcoſa minor flo. pendulo B. prod. ♀

* Anonis ſiliqua hirſuta pendula, flo. purpureo; minima hirſuta Cherleri J. B. ♀

Anonis mitis annua purpurea. ♃ ♀

Anthyllis prior lentifolia maritima Peplios effigie Ad. & Icon. Lob. Portlandiæ lentifolia Penæ hiſt. Lugd. ☉

Anthyllis marina incana alſinefolia Narbonenſium Lob. maritima alſinefolia B. pin. ☉

Antirrhinum majus rotundiore folio B. pin. Cynocephalus Plinij hiſt. Lugd. ♃ ☉

Antirrhinum Dod. majus alterum folio longiori B. pin. ♀ Idem quod Antirrhinum flore albo hort. Eyſt. ♃ ☉

Antirrhinum flaveſcens Dod. deſcr. ♃ ☉

Antirrhinum ex dilutè albo purpur ascens Dod. descr. ♀
Antirrhinum arvense majus B. pin. primum Matth. ed. B. Idem flore albo. ♀

Aparine Dod. vulgaris B. pin. ♀
Aparine semine lævi, lævis Park. desc. ♀
Aparine fructu verrucoso. semine coriandri saccharati Park. desc. ♀

Apios Americana Cornuti. ☉

Apium hortense Dod. hortense .s. Petroselinum vulgò B. in pin. ♀
Apium vel Petroselinum crispum B. pin. Petroselinum crispum Cam. hort. med. ♀
Apium hortense maximum B. prodr. ♀
Apium montanum folio tenuiore B. pin. Petroselinum Dalechampii hist. Lugd. ♀
Apium montanum folio ampliore B. pin. Oreoselinum Clus. ☉
Apium sylvestre .s. Thysselium Dod. sylvestre lacteo succo turgens B. pin. ☉
Apium palustre, & Apium officinarum B. pin. Eleoselinum Dod. ♀
Apium Macedonicum B. pin. Petroselinum Mace-

Macedonicum Ad. Lob. ♀

* Apium peregrinum i. Cluſii peregrinum fol. ſubrotundis C. B. P. ☉

Apocynum folio ſubrotundo B. pin. primum latifolium Cluſ. ☉

Apocynum folio oblongo B. pin. Periploca ſerpens anguſtiore folio Obſ. & Icon. Lob. ☿

Apocynum majus Syriacum rectum Cornuti. ☉

Apocynum rectum minus Canadenſe Cornuti. ☉

* Apocynum tertium latifolium Cluſ. hiſt; Periploca prior Dod. ☉

* Apocynum Canadenſe foliis Androſemi. ♃ ☉

* Apocynum Canadenſe anguſtifolium flo. aureo. ♃ ☉

* Apocynum Canadenſe maximum flore minimo herbaceo. ♃ ☉

Aquifolium Matth. ed. B. Ilex aculeata baccifera folio ſinuato B. pin.

Aquilegia Fuchſ. ſylveſtris B. pin. ☉

Eadem quæ

Aquilegia flore albo ſimplici hort. Eyſt. ☉

Aquilina rubra Icon. Lob. ☉

Aquilegia pumila præcox Canadenſis Cornuti. ♀

Aquilegia hortenſis multiplex flore magno B. pin. Aquileia multiplici flore cœruleo Dod. ☉

Aquilegia flore pleno albo hort. Eyſt. ☉

Aquilegia flore pleno incarnato hort. Eyſt. ☉

Aquilegia flore pleno verſicolori. ♃ ☉

Aquilegia flore roſeo multiplici B. pin. ſtellata flore purpureo hort. Eyſt. ☉

Aquilegia ſtellata flore violaceo hort. Eyſt. ☉

Aquilegia ſtellata flore albo. ☉

Arbutus Dod. folio ſerrato B. pin.

Argemone capitulo torulis canulato Obſ. Lob. capitulo breviori B. pin. ♀

Argemone capitulo longiore Obſ. Lob. B. pin. ♀

* Argemone capitulo Longiori glabro. ♃ ♀

Ariſarum anguſtifolium Dod. anguſtifolium Dioſcoridis fortè B. pin. ⊙

Ariſtolochia rotunda Dod. rotunda flore ex purpurâ nigro B. pin. ⊙
Ariſtolochia longa Dod. longa vera B. pin. ⊙
Ariſtolochia clematitis recta B. pin. Clematitis vulgaris Cluſ. ⊙
Ariſtolochia, Piſtolochia dicta B. pin. Piſtolochia Cluſ. ⊙
Ariſtolochia, Piſtolochia Cretica B. pin. Piſtolochia altera ſemper virens Cluſ. app. prim. ⊙

Artemiſia Matth. ed. B. vulgaris major B. pin. ⊙
* Artemiſia variegatis foliis. ♃ ⊙

Arum venis albis B. pin. ⊙
Arum venis albis lituris nigris ſignatum. ⊙
Arum Fuchſ. vulgare non maculatum B. pin. ⊙
Arum maculatum maculis nigris B. pin. maculatum Tab. ⊙
Arum maculatum maculis candidis B. pin. Caſt. deſcr. ⊙

Arum indicum amplo flore. ♃ ☉
Arum Ægyptium minus Veſlingii Obſ. in proſp. Alp. ☉
Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgò Colocaſia B. pin. Colocaſſia Ægyptia florida Veſlingii Obſ. in proſp. Alp. ☉

Arundo vallatoria .ſ. phragmites Obſ. & Icon. Lob. vulgaris .ſ. phragmites Dioſcoridis B. pin. ☉
Arundo donax .ſ. Cypria Dod. ſativa B. pin. ☉
Arundo Indica variegata .ſ. Laconica Theophraſti Cornuti ☉
Arundo Indica florida, Cannacorus quorundam. Obſ. & Icon. Lob. Indica latifolia B. pin. Canna Indica rubra hort. Eyſt. ♀
Arundo Indica latifolia flore luteo punctato B. pin. Canna Indica lutea punctata hort. Eyſt. ♀

Aſarum Dod. B. pin. ☉
Aſarum Canadenſe Cornuti. ☉

Aſclepias Fuchſ. albo flore B. pin. ☉
Aſclepias anguſtifolia flore flaveſcente. ☉

Aſcle-

Aſclepias nigro flore B. pin. altera flore nigro Obſ. Lob. ☉

Aſcyrum Matth. ed. B. Dod. Lob. ☉

Aſparagus hortenſis Dod. ſativa B. pin. ☉
Aſparagus marinus Cluſ. maritimus craſſiore folio B. pin ☉
Aſparagus foliis acutis B. pin. Corruda prior Cluſ. ☉

Aſperula odorata flore albo Dod. Aſperula ſ. Rubeola montana odora B. pin. ☉
Aſperula cœrulea Dod. cœrulea arvenſis B. pin. ♃
* Aſperula verticillata Latifolia C. B. P. cruciata muralis Col. ♃

Aſphodelus albus ramoſus mas B. pin. major albus hort. Eyſt. ☉
Aſphodelus albus non ramoſus B. pin. Haſtula regia ſ. Aſphodelus Matt. ed. B. ☉
Aſphodelus luteus Dod. luteus & flore & radice B. pin ☉
Aſphodelus foliis fiſtuloſis B. pin. minor Cluſ. Phalangium Cretæ Salonenſis Ad. Lob. ♃

Aſplenium Dod. Ceterach officinarum B. pin. ☉

Aſter luteus foliolis ad florem rigidis B. pin. Aſter primus Cluſ. ♀

Aſter cernuus Col. atticus foliis circa florem mollibus B. pin. ♀

Aſter montanus luteus ſalicis glabro folio B. pin. Auſtriacus ſecundus Cluſ. ☉

Aſter conyzoïdes odoratus luteus hort. Eyſt. ☉

Aſter conyzoïdes Monſpel. ♃ ♀

Aſter atticus ſupinus Dod. luteus ſupinus B. pin. ♀

Aſter luteus alatus Cornuti. ☉

Aſter atticus Dod. atticus cœruleus vulgaris B. pin. ☉

Aſter præcox flore cœruleo majore. ♃ ☉

Aſter elatior flore cœruleo minore. ♃ ☉

Aſter montanus cœruleus magno flore foliis oblongis B. pin. Alpinus cœruleo flore .ſ. ſeptimus Cluſ. ☉

Aſter minor Narbonenſium Tripolii flore, Linariæ folio Lob. Tripolii flore B. pin. ☉

Aſter flore Tripolii latifolius. ♃ ☉

Aſteriſcus

Aſteriſcus latifolius autumnalis Cornuti. ☉
Aſter ſerotinus. Canadenſis anguſtifolius flo. cœruleo. ♃ ☉
Aſter flore Bellidis ſylveſtris minoris. ♃ ☉
Aſter Canadenſis annuus. ♃ ☿ vide Senecio. ☿

Aſtragalus Bæticus Cluſ. Bæticus lanuginoſus radice ampliſſima. B. pin. ☉
Aſtragalus Monſpelienſis Cluſ. ☿
Aſtragalus ſylvaticus Thal. ſylvaticus foliis oblongis glabris B. pin. ☉
* Aſtragalus Monſpelienſium J. B. ☉

Atractylis Dod. lutea B. pin. ☿

Atriplex ſativa alba Icon. Lob. hortenſis alba ſ. pallidè virens B. pin. ☿
Atriplex hortenſis rubra B. pin. rubra Tab. ☿
Atriplex ſylveſtris vulgatior ſinuata Lob. ſylveſtris folio ſinuato candicante B. pin. ☿
Atriplex ſylveſtris latifolia B. pin. Pes anſerinus Dod. ☿
Atriplex ſylveſtris latifolia acutiore folio

B. pin. Chenopodium, Pes anſerinus ſecundus Tab. ☿

Atriplex ſylveſtris Mori fructu major, ſpinachia *B*aptiſt. ferarii. ☿

Atriplex ſylveſtris fragifera media, ſyl. baccifera Cluſ. hiſt. ☿

Atriplex ſylveſtris fragifera minor lappulas habens B. prodr. ☿

Atriplex fœtida B. pin. vulvaria Tab. ☿

Atriplex ſylveſtris Polygoni, aut helxines foliis Obſ. & Icon. Lob. anguſto oblongo folio B. pin. ☿

Atriplex folio haſtato .ſ. deltoide. ♃ ☿

Atriplex marina Dod. maritima laciniata B. pin. ☿

* Atriplex procumbens folio ſinuato craſſo. ♃ ☿

* Atriplex halimi folio C. B. P. halimoides Lob. Obſ. ☿

* Atriplex maritima ſinuato folio C. B. prod. ☿

Avena Dod. vulgaris .ſ. alba B. pin. ☿

Avena nigra B. pin. ☿

Azedarach Dod.

B

Balsamina cucumerina punicea Obſ. & Icon. Lob. rotundifolia repens .ſ. mas B. pin. ♀

Balſamina fœmina perſicifolia Obſ. & Icon. Lob. fœmina B. pin. ♀

* Balſamina lutea .ſ. Noli me tangere C. B. P. Impatiens herba Dod. ♀

Barba capræ Fuchſ. floribus oblongis B. pin. ☉

Barba capræ floribus compactis B. pin. ulmaria Cluſ. ☉

Barba Jovis hiſt. Lugd. B. pin.

Bellis major Dod. ſylveſtris caule folioſo major B. pin. ☉

Bellis Alpina major rigido folio B. prodr. ♃ ☉

* Bellis latioribus ſerratis foliis, radice repente. ♃ ☉

Bellis ramoſa umbellifera Cornuti. ♀

Bellis media hiſt. Lugd. ſylveſtris media caule

caule carens B. pin. ☉
Bellis minor ſylveſtris Fuchſii hiſt. Ludg. Sylveſtris minor B. pin. ☉
* Bellis pratenſis duplici florum ſerie. ♃ ☉
Bellis hortenſis multiplici flore Obſ. Lob. ☉
Bellis minor flore multiplici albo hort. Eyſt. ☉
* Bellis hortenſis flo. herbaceo. ♃ ☉
* Bellis hortenſis flo. prolifero. ♃ ☉
Bellis cœrulea caule folioſo B. pin. cœrulea .ſ. Globularia Monſpeliaca Icon. Lob. ☉
Bellis cœrulea montana fruteſcens B. pin. Scabioſa decima .ſ. repens Cluſ. ☉
Bellis lutea foliis profundè inciſis major B. pin. Chryſanthemum ſegetum Obſ. & Icon. Lob. ♀
* Bellis tanaceti fol. glabris. ☉ Vide tanacetum inodorum.
* Bellis tanaceti fol. hirſutis. ☉

Berberis dumetorum B. pin. vulgaris Cluſ.

* Beta marina ſpontanea Lob. Obſ. ♀
Beta alba Matth. ed B. alba vel palleſcens quæ cicla officinarum B. pin. ♀

Beta

Beta rubra vulgatior Obſ. & Icon. Lob. rubra vulgaris B. pin. ♀
Beta rubra radice Rapæ B. pin. rubra Romana Dod. ♀
Beta rubra radice Rapæ coſtâ & foliis latioribus. ♀
Beta ſicula coſtâ amplâ aureâ. ♃ ♀
Beta Cretica ſemine aculeato B. prodr. ♀

Betonica Dod. purpurea B. pin. ☉
Betonica flore albo Matth. ed. B. alba B. pin. ☉
Betonica major Danica Park. ☉
* Betonicæ folio alopecuros quorundam J. B. ☉

Betula Dod. B. pin.

Biſtorta Dod. major radice minus intorta B. pin. ☉
Biſtorta major radice magis intorta B. pin. Serpentaria mas, ſive Biſtorta Fuchſ. ☉
* Biſtorta minor noſtras Park. ☉

Blattaria Fuchſ. Matth. ed. B. lutea folio longo laciniato B. pin. ♀
Blattaria alba, Verbaſculum Tab. alba B. pin. ♀

* Blattaria folio verbaſci incano, amp
luteo flore. ♃ ♀
* Blattaria perennis flo. cœruleo. ♃
* Blattaria perennis flo. carneo. ♃ ☉
* Blattaria perennis flo. Gilvo. ♃ ☉

Blitum album, Matth. ed. B. album maj
B. pin. ♀
Blitum minus Dod. album minus B. pin.
Blitum polyſpermon Tab. B. pin. ♀
Blitum rubens Dod. rubrum majus B. pin.
Blitum rubrum ſupinum Icon. Lob. rubrum
minus B. pin. ♀

Botrys Dod. ambroſioïdes vulgaris B. pin.
Botrys ambroſiïdes Mexiocana B. pin. app
deſcr. ♀
Botrys chamædryoïdes B. pin. Chamædry
laciniatis foliis Obſ. & Icon. Lob. ♀

Braſſica capitata albida Dod. capitata alb
B. pin. ♀
Braſſica Sabauda Hyberna Icon. Lob. alb
capite oblongo non penitùs clauſo B.
pin. ♀
Braſſica capitata polycephalos hiſt. Lugd.
ex

ex capitibus pluribus conglobata B. pin. ♀

Braſſica rubra capitata Dod. B pin. ♀

Braſſica gongylodes Matth. ed. b. ejuſdem pin. ♀

Braſſica dicta, Napobraſſica B. pin. ♀

Braſſica cauliflora Dod. B. pin. ♀

Braſſica vulgaris ſativa Dod. alba vel viridis B. pin. ♀

Braſſica rubra B. pin. Cumana .ſ. rubra Dod. Gall. ed. ♀

Braſſica criſpa Matth. ed. B. alba criſpa B. pin. ♀

Braſſica aſparagodes Dalechampii hiſt. Lugd. aſparagodes criſpa *B.* pin. ♀

Braſſica fimbriata Obſ. & Icon. Lob. *B.* pin. ♀

Braſſica Anglica minima Ad. Lob. fimbriata pumila *B.* pin. ♀

Braſſica Seliniſia latifolia Tab. Lato Apii folio *B.* pin. ♀

Braſſica ſelinoides Dod. anguſto Apii folio *B.* pin. ♀

Braſſica ſylveſtris Dod. arvenſis *B.* pin. ♀

Braſſica marina ſylveſtris monoſpermos Penæ hiſt. Lugd. maritima *B.* pin. ☉

Braſſica.

Braſſica ſylveſtris perfoliata Dod. Campeſtris perfoliata flore albo B. pin. ♃

Braſſica ſylveſtris foliis circa radicem cichoraceis B. pin. Sinapi album hiſt. Lugd. ☉

Braſſica ſylveſtris foliis integris, & hiſpidis B. pin. Turritis Icon. Lob. ☉

* Braſſica ſyl. ramoſa tota pene Glabra B. pin. Turritis maj. plateau Cluſ. ☉

Brunella major folio non diſſecto b. pin. Brunella Dod. Eadem flore albo. ☉

Brunella folio laciniato B. pin. Symphytum petræum Obſ. & Icon. Lob. Eadem flore albo, & roſeo. ☉

Brunella hyſſopyfolia B. phytop. ☉

Brunella cœrulea magno flore hort. Eyſt. B. pin. ☉

* Brunella Alpina folio glabro, anguſto integro. ♃ ☉

Bryonia alba Dod. aſpera .ſ. alba baccis rubris B. pin. ☉

Bryonia ſylveſtris, Sigillum Mariæ Ad. Lob. lævis .ſ. nigra racemoſa B. pin. ☉

Bugloſſum latifolium, Borrago B. pin. Borrago

Borrago Dod. Idem flore albo. ♀

Bugloſſum ſempervirens Ad. & Icon. Lob. latifolium ſempervirens B. pin. ☉

Bugloſſum ſempervirens minus. Symphytum pumilum repens Borraginis facie Obſ. & Icon. Lob. ☉

Bugloſſum anguſtifolium majus B. pin. anguſtifolium Obſ. & Icon. Lob. ♀

Bugloſſum minus ſativum Dodonæi hiſt. Lugd. anguſtifolium minus. B. pin. ♀

Bugloſſum ſylveſtre minus B. pin. minus ſylveſtre Dodonæi hiſt. Lugd. ♀

Bugloſſum ſylveſtre caulibus procumbentibus B. pin. Alyſſum Germanicum echioides Obſ. & Icon. Lob. ♀

* Bugloſſum Luſitanicum bullatis foliis. ♂ ♀

* Bugloſſum procumbens annuum pullo minimo flo. ♂ ♀

* Bugloſſum luteum minimum nobis, Echioides lutea Apula minima campeſtris. Col. ♀

Bulbocaſtanum majus folio Apii B. pin. Bulbocaſtanum Dod. ☉

Bulbus eriophorus Cluſ. eriophorus Orientalis B. pin. ☉

Buphtalmum lanuginoſum foliis millefolii B. pin. Chryſanthemum valentinum Cluſ. ☉

Bupleurum anguſtifolium Dod. folio ſubrotundo .ſ. vulgatiſſimum B. pin. ☉

Bupleuron anguſtiſſimo folio B. pin. minimum Col. ♀

Burſa paſtoria Dod. paſtoris major folio ſinuato B. pin.

Burſa paſtoria minor Dod. ♀

Burſa paſtoris major loculo oblongo B. pin. Draba minima muralis diſcoides Col. ♀

Burſa paſtoris minor loculo oblongo B. pin. Paronychia alſine folia Obſ. & Icon. Lob. ♀

Burſæ paſtoris ſimilis ſiliquoſa major B. pin. Aizoon telephium Dalechampii hiſt. Lugd. ♀

Buxus Fuchſ. arboreſcens B. pin.

Buxus humilis Dod. deſcr. foliis rotundioribus B. pin.

Buxus foliis aureis. ♃

C

* CACALIA tomentosa B. prod. ☉
* Cacalia glabro folio Clus. ☉
* Cacalia foliis crassis hirsutis B. pin. Chini Lugd. ☉

* Cachris ferulaceis foliis sem. fungoso lævi. ♃ ☉
* Cachris Peucedani folio semine fungoso sulcato lævi. ♃ ☉
* Cachris Peucedani folio semine fungoso sulcato aspero. ♃ ☉

Cæpa capitata Matth. ed. B. vulgaris B. pin.
Cæpa sectilis Matth. ed. B. ☉
Cæpa Ascalonica Matth. ed. B. sterilis B. pin. ☉

* Calceolus Mariæ luteus C. B. Pin. desc. ☉
* Calceolus Mariæ albus C. B. P. desc. ☉

Calamintha montana vulgaris Obſ. & Icon. Lob. vulgaris, vel officinarum Germaniæ B. pin. ☉

Calamintha montana præſtantior hort. Eyſt. magno flore B. pin. ☉

Calamintha vulgaris exiguo flore B. prodr. ☉

Calamintha arvenſis verticillata B. pin. aquatica Matthioli hiſt. Lugd. ☉

* Calamintha altera gravi odore Pulegii Lob. adv. odore Pulegii ſ. nepeta C. B. P. ☉

Caltha vulgaris B. pin. Calendula Dod. Eadem flore citrino. ☿

Caltha polyanthos major B. pin. Calendula lutea flore pleno hort. Eyſt.

Eadem quæ

Calendula ſativa polyanthos melina Tab. ☿

Caltha arvenſis B. pin. Calendula arvenſis Tab. ☿

Caltha paluſtris Dod flore ſimplici B. pin. ☉

Caltha paluſtris flore pleno Cluſ. ☉

Campanula minor rotundifolia Obſ. & Icon. Lob. minor rotundifolia vulgaris

B. pin. Eadem flore albo. ☉
Campanula minor rotundifolia Alpina B. pin Cluſ. deſcr. ☉
Campanula maxima foliis latiſſimis B. pin. ☉
Campanula hortenſis Rapunculi radice B. pin. Trachelium in maritimis Ad. Lob. ☉
Campanula hortenſis folio & flore oblongo B. pin. Viola mariana Dod. Eadem flore ſubalbido. ♀
Campanula vulgatior foliis Urticæ B. pin. Cervicaria major Dod. Eadem duplici florum ſerie, & flore albo. ☉
Campanula foliis Echii B. pin. Cervicaria major tenuifolia Thal. Echium montanum Dal. hiſt. Lugd. ♀
Campanula pratenſis flore conglomerato B. pin. Trachelium minus hiſt. Lugd. Eadem flore albo. ☉

Champhorata hirſuta B. pin. Monſpeliaca Icon. Lob. ☉
Camphoratæ congener B. pin. Anthyllis altera Italorum Obſ. & Icon. Lob. ♀

Cannabis mas hiſt. Lugd. ſativa B. pin. ♀
Cannabis fœmina hiſt. Lugd. ♀

Cannabis lutea ſterilis Contareni proſp. Alp. exot. ☉

Capparis retuſo folio Obſ. Lob. Spinoſa fructu minore folio rotundo B. pin. ☉
Capparis ſabago Dod. portulacæ folio B. pin. ☉

Carduus pratenſis Tragi, Acanthii facie Ad. Lob. ☉
Carduus bulboſus Monſpel. Ad. & Icon. Lob. pratenſis Aſphodeli radice latifolius B. pin. ☉
Carduus vinearum repens folio Sonchi B. pin. Ceanothos Theophraſti Col.
Idem flore albo. ☉
Carduus mollis foliis Helenii B. pin. mollis Camerarii Cluſ. ☉
Carduus albis maculis notatus vulgaris B. pin. Leucographus Dod. ♀
* Carduus Mariæ hirſutus cap. minore. ♂ ♀
* Carduus Mariæ non maculatus. ♂ ♀
Carduus albis maculis notatus exoticus B. pin. lacteus Syriacus Cam.
Idem flore albo. ♀

Carduus

Carduus albis maculis notatus exoticus minor Galaeſites J. B. ♀

Carduus ſphærocephalus Dod. ſphærocephalus latifolius vulgaris B. pin. ☉

Carduus ſphærocephalus cœruleus minor B. pin. Crocodilium Monſpelienſium Dal. hiſt. Lugd. ☉

Carduus ſphærocephalus acutus Dod. Sphærocephalus capitulo longis ſpinis armato B. pin. ☉

* Carduus ſpærocephalus annuus Bœticus minor. ♃ ♀

Carduus eriocephalus Dod. capite rotundo tomentoſo B. pin. ♀

Carduus aſininus capite maj. nutante. Onopyxus tertius Dalech. hiſt. Lugd. ♀

Carduus aſininus capite maj. nutante flore albo. Acanthium ſylveſtre flore albo hort. Eyſt. ♀

Carduus aſininus capitulis parvis. Sylveſtris primus Dod. ♀

Carduus ſpinoſiſſimus vulgaris, Polyacantha Theophraſti Obſ. & Icon. Lob. Spinoſiſſimus anguſtifolius vulgaris B. pin. ☉

Carduus Polyacanthæ æmulus capite nutante. ♃ ♀

Carduus lanceolatus Tab. lanceatus latifolius B. pin. Idem flore albo. ♀
Carduus ſtellatus Dod. ſtellatus foliis papaveris erratici B. pin. Idem flore albo ♀
Carduus ſtellatus luteus foliis cyani B. pin. Spina ſolſtitialis Dod. ♀
Carduus ſolſtitialis capitulis minus ſpinoſis. Spina ſolſtitialis mitior Apula Col. ♀
* Carduus Leucoii foliis, ſubtus incanis. ♃ ♀

Carlina herbariorum Obſ. Lob. acaulos magno flore B. pin. ☉
Carlina cauleſcens magno flore B. pin. elatior, Chamæleon albus vulgaris Cluſ. ☉
Carlina acaulos minore purpureo flore B. pin. Carduus acaulis Septentrionalium Obſ. & Icon. Lob. ☉

Carpinus Matth. ed. B. Dod.

Carum Dod. Cuminum pratenſe, Carvi officinarum B. pin. ♀

Caryophyllata Dod. vulgaris B. pin. ☉
Caryophyllata vulgaris majore flore B. pin. Sylveſtris Fuchſ. ☉ Cary-

Caryophyllata montana prima Cluſ. aquatica nutante flore B. pin. ☉
Caryophyllata montana minor flore nutante. ☉
Caryophyllata major rotundifolia Obſ. & Icon. Lob. alpina lutea B. pin. ☉
Caryophyllata alpina omnium minima Pon. deſcr. mont. Bald. alpina minor B. pin. ☉

Caryophyllus maximus ruber B. pin. maximus plenus flore rubro hort. Eyſt. ☉
Caryophyllus multiplex flore albo hort. Eyſt. ☉
Caryophyllus multiplex maximus variegatus hort. Eyſt. ☉
Caryophyllus hortenſis ſimplex flore majore B. pin. Caryophylleus flos ſimplex Dod. ☉
Caryophyllus arboreſcens Creticus B. prodr. Sylveſtris arboreus Proſp. Alp. de exot. ☉
Caryophyllus ſimplex flore minore pallidè rubente B. pin. Sylveſtris tertius flore pallido ſuaverubente Icon. Lob. ☉
Caryophyllus ſimplex ſupinus latifolius B. pin. minimus pulchellus ſupinus maculis aureis, argenteiſve aſperſus Icon. Lob. ☉

Caryophyllus barbatus flore multiplici B. pin. armerius pleno flore Cluſ. Idem flore albo. ☉

Caryophyllus barbatus hortenſis latifolius B. pin. Viola barbata latifolia hiſt. Lugd. Idem qui

Flos armerius ruber hort. Eyſt. ☉

Flos armerius albus ejuſdem.

Flos armerius variegatus ejuſdem.

Caryophyllus barbatus ſylveſtris B. pin. Viola barbata anguſtifolia hiſt. Lugd. ♀

Caryophyllus ſylveſtris prolifer B. pin. armeria prolifera Icon. Lob. ♀

Caryophyllus montanus primus Tab. ſylveſtris vulgaris latifolius B. pin. ☉

Caryophyllus flore tenuiſſimè diſſecto B. pin. Caryophylleus minor Dod. ☉

Idem qui

Caryophyllus plumarius albus Tab.

Caryophyllus omnium humillimus. ♃ ☉

Caryophyllus pratenſis flore laciniato ſimplici .ſ. flos cuculi B. pin. Odontitis Plinii ſimplici flore Cluſ. ☉

Idem flore albo.

Caryophyllus pratenſis flore pleno B. pin. Odontitis pleno flore Cluſ. ☉

Caryophyllus

Caryophyllus ſylveſtris alter flore laciniato odoratiſſimo B. pin. Sylveſtris ſextus Cluſ. ☉

Caryophyllus holoſtius Icon. Lob. arvenſis hirſutus flore majore B. pin. ☉

Caryophyllus holoſtius tomentoſus anguſtifolius B. prodr. ☉

Caryophyllus arvenſis umbellatus folio glabro B. pin. Alſine verna Dal. hiſt. Lugd. ♀

Caryophyllus arvenſis glaber flore majore B. pin. Gramen leucanthemum Dod. ☉

Caryophyllus arvenſis glaber flore minore B. pin. Gramen floridum minus Tab. ☉

Caryophyllus holoſtius Alpinus gramineus B. prodr. ☉

Caryophyllus montanus major flore globoſo B. pin. Statice hiſt. Lugd. ☉

Caryophyllus montanus minor flore globoſo B. pin. Gramen polyanthemum minus Dod. ☉

Caryophyllus minimus flore globoſo. ♃ ☉

Caryophyllus minimus muralis B. pin. Tunica minima hiſt. Lugd. ♀

Caſtanea

Caſtanea Dod.
Caſtanea equina Cluſ. folio multifido B pin

Caucalis maxima ſphondylii aculeato ſemine B. pin. major Cluſ. vide Tordylium. ♀
Caucalis arvenſis echinata latifolia B. pin. echinophora quarta major πλατύφυλλος purpurea Col. Eadem flore albo. ♀
Caucalis arvenſis echinata magno flore B. pin. albo flore Cluſ. ♀
Caucalis arvenſis echinata parvo flore & fructu B. pin. echinophora tertia λεπτόφυλλος purpurea Col. ♀
Caucalis Monſpeliaca echinato magno fructu B. pin. Lappa boaria Plinii hiſt. Lugd. ♀
Caucalis nodoſo echinato ſemine B. prodr. ♀
Caucalis folio Peucedani B. pin. Anglica Tab. ⊙

Cedrus folio Cupreſſi major fructu flavescente B. pin. Oxycedrus Lycia Dod.
* Cedrus folio cupreſſi minor C. B. P.

Centaurium majus folio in lacinias plures diviſo B. pin. magnum Dod. ⊙

Centauri

Centaurium foliis Cinaræ Cornuti. ☉
* Centaurium Rha capitatum fol. Enulæ Lugd. ☉
Centaurium majus luteum Cornuti. Alpinum luteum B. prodr. ☉
Centaurium minus Dod B. pin. Idem quod Centaurium minus album Tab. ♀
Centaurium luteum perfoliatum B. pin. parvum flavo flore Cluſ. ♀
Centaurium luteum puſillum B. pin. luteum novum Col. ♀
Centaurium minimum purp. ♃ ♀

Cepæa Cluſ. ♀

Ceraſus fructu acidulo Dod. deſcr. Ceraſus auſtera Matth. Ed. B.
Ceraſa craſſa carne dura B. pin. Duracina hiſt. Lugd. deſcr.
Ceraſus Dod. major, ac ſylveſtris fructu ſubdulci nigro colore inficiente B. pin.
Ceraſus hortenſis flore roſeo B. pin. multiflora Tab.
Ceraſus folio laurino B. pin. Lauroceraſus Cluſ.
Ceraſus pumila B. pin. Chamæceraſus Dod.

Ceraſus racemoſa ſylveſtris fructu non edu
li B. pin. Ceraſus avium racemoſa Icon
Lob.
Ceraſo affinis B. pin. Mahaleb Matthioli
hiſt. Lugd.

Cerinthe quorundam major verſicolor
flore Cluſ. Cerinthe, ſive Cynogloſſum
montanum majus B. pin. ☿
Cerinthe major quorundam flore ex rubro
purpuraſcente Cluſ. deſcr. flore ex ru-
bro purpuraſcente B. pin. ☿
Cerinthe quorundam major flavo flore
Cluſ. flore flavo aſperior B. pin. ☿

Chærophyllum ſativum B. pin. Cherefoli-
um Dod. ☿
Chærophyllum ſylveſtre B. pin. Anthriſcus
Plinii hiſt. Lugd. ☿

Chamæceraſus alpina fructu rubro gemino
duobus punctis notato B. pin. Xyloſte-
um alterum Dod.
Chamæceraſus dumetorum fructu gemino
rubro B. pin. Xyloſteum Dod.

Chamæciſtus

Chamæciſtus vulgaris flore luteo B. pin. primus Cluſ. ☉

Chamæciſtus foliis minoribus, & incanis B. pin. quintus Cluſ. quoad figuram, quartus deſcr. ☉

Chamæciſtus foliis Myrti minoris incanis B. pin. tertius Cluſ. ☉

Chamæciſtus anguſtifolia B. pin. ſextus Cluſ. ☉

* Chamæciſtus Halimi folio. ☉ ♃

* Chamæciſtus parvo flo. luteo J. B. an Serpilli folio nigricante et hirſuto flo. aureo odorato eidem. ☉

Chamæciſtus annuus. ♃ ♀

Chamædrys repens minor Dod. B. pin. Eadem flore albo. ☉

Chamædrys alpina ciſti flore B. pin. montana fruteſcens durior Ad. Lob. ☉

Chamædrys alpina minima hirſuta B. prodr. ☉

Chamædrys ſpuria major anguſtifolia B. pin. Veronica ſupina facie Teucrii pratenſis Icon. Lob. ☉

Chamædrys ſpuria minor rotundifolia B. pin. Teucrium officinarum Obſ. Lob. ☉

Chamægeniſta

Chamægeniſta foliis Geniſtæ vulgaris B. pin. prima Cluſ. ⊙

Chamægeniſta ſagittalis B. pin. ſecunda Cluſ. ⊙

Chamæiris variegata B. pin. cœruleo, & violaceo colore hort. Eyſt. ⊙

Chamæiris minor flore purpureo B. pin. Iris minor Dod. ⊙

Chamæiris flore pallidè luteo B. pin. ⊙

Chamæiris flore obſoleto pallido B. pin. latifolia minor ſexta Cluſ. ⊙

* Chamæleon niger cortuſi Dod. niger Lob. Obſ. ⊙

Chamæmelum vulgare Dod. vulgare leucanthemum Dioſcoridis B. pin. ⊙

Chamæmelum nobile .ſ. odoratius B. pin. odoratum Dod. ⊙

Chamæmelum nobile flore multiplici B. pin. Romanum flore multiplici hort. Eyſt. ⊙

Chamæmelum nudum capitulo aphyllo B. pin. Anthemis chryſanthemos Penæ & Lobellii hiſt. Lugd. ⊙

Chamæmelum inodorum B. pin. Cotula non

noh fœtida Dod. Gall. ed. Idem flore pleno. ☉

Chamæmelum fœtidum B. pin. Cotula fœtida Dodonæi hiſt. Lugd. ♀

Chamæmeſpilus Geſneri Cluſ. Epimelis hiſt. Lugd.

Chamæpitys moſchata foliis ſerratis B. pin. Spuria prior, ſive Anthyllis altera Dod. ☉

Chamæpitys lutea vulgaris .ſ. folio trifido B. pin. Ajuga .ſ. Chamæpitys mas Dioſcoridis Obſ. & Icon. Lob. ♀

Chamæſyce Dod. B. pin. ♀

Chamelæa tricoccos hiſt. Lugd. B. pin. ☉

Chelidonium majus vulgare B. pin. majus Dod. ☉

Chelidonium majus foliis quernis B. pin. majus laciniato flore Cluſ. ☉

Chelidonium majus foliis tenuiſſimè diſſectis. ♃ ☉

Chelidonium maximum Canadenſe ἄκαυλον Cornuti deſcr. ☉

Chelidonium minus hiſt. Lugd. Cheledonia rotundifolia minor B. pin. ☉

* Chelidonium minus flo. pleno Park. ☉

Chondrilla juncea viſcoſa arvenſis B. pin. viminea viſcoſa Penæ hiſt. Lugd. ☉

Chondrilla viſcoſa humilis B. prodr. ♀

Chondrilla verrucaria foliis intubaceis viridibus B. pin. Cichorium verrucatum, Zacintha Cluſ. ♀

Chondrilla cœrulea altera cichorii ſylveſtris foliis B. pin. cœrulea cichorii ſylveſtris laciniosis foliis Obſ. Lob. ☉

Chondrilla foliis laciniatis ſerratis purpuraſcente flore B. pin. rara purpurea Lobelii hiſt. Lugd. ♀

Chondrilla cœrulea cyani capitulo B. pin. Seſamoïdes parvum Matth. ed. B. ☉

Chryſanthemum flore partim candido partim luteo B. pin. Creticum mixtum hort. Eyſt. ♀

Chryſanthemum majus folio profundiùs laciniato magno flore B. pin. luteum hort. Eyſt. ♀

Chryſanthemum alpinum incanum foliis lacini-

laciniatis B. pin. alpinum primum Cluſ. ☉
Chryſanthemum tenuifolium Hiſpanicum. ♃ ☉
Chryſanthemum alpinum foliis Abrotani multifidis B. pin. Achillea montana Penæ hiſt. Lugd. ☉
* Chryſanthemum Myconi Lugd. Bellis lutea fol. ſubrotundis C. B. P. ♀
* Chryſanthemum tenuifolium Eyſt. Bupthalmum Matthioli Lob. ♀

Cicer arietinum Dod. ſativum B. pin. Idem flore & fructu rubro B. pin. deſcr. ♀
* Cicer Arietinum fructu nigro. ♀
Cicer ſylveſtre herbariorum Obſ. Lob. ſylveſtre foliis oblongis hiſpidis majus B. pin. ♀

Cichorium latioris folii Dod. ſativum B. pin. ♀
Cichorium ſylveſtre Matth. ed. B. ſylveſtre ſ. officinarum B. pin. Idem flore albo & purpureo. ♀
Cichorium montanum anguſtifolium hirſutie aſperum B. pin. Hieracium intybaceum alperum Tab. ☉

Cicuta Dod. major B. pin. ♀
Cicuta minor Petroſelino ſimilis B. pin. Cicutaria fatua Ad. & Icon. Lob. ♀
* Cicutaria latifolia fœtidiſſima Ger. Seſeli Peleponenſe Lugd. ⊙
Cicutaria paluſtris tenuifolia B. pin. Phellandryum Dod. ⊙

Cinara hortenſis foliis non aculeatis B. pin. non aculeata Dodonæi hiſt. Lugd. ♀
Cinara hortenſis non aculeata capite ſubrubente. ♀
Cinara hortenſis aculeata B. pin. Scolymus Dioſcoridis, Cactos Theophraſti Cluſ. ♀
Cinara maxima Anglica Icon. Lob. Scolymus ſ. Cinara maxima hort. Eyſt. ♀
Cinara ſpinoſa cujus pediculi eſitantur B. pin. Carduus aculeatus Matth. ed B. ♀

Cirſium maximum Aſphodeli radice B. pin. maximum montanum incano folio bulboſa radice quintum Cluſ. deſcr. ⊙
Cirſium majus ſingulari capitulo magno, vel incanum variè diſſectum B. pin. Anglicum Obſ. & Icon. Lob. ⊙

Ciſtus mas folio oblongo incano B. pin. mas primus Cluſ. ☉

Ciſtus fœmina folio ſalviæ B. pin. fœmina Cluſ. ☉

Ciſtus folio ſalicis B. pin. humilis annuus folio ſalicis humilis Obſ. Lob. ♀

Ciſtus annuus flore guttato Ponæ deſcr. mont. Bald. flore pallido punicante macula inſignito B. pin. ♀

Idem flore non maculoſo.

Ciſtus ledon foliis laurinis B. pin. Ciſti ledi primi altera ſpecies Cluſ. deſcr. ☉

Ciſtus ledon quintum Cluſ. ledon Narbonenſe Tab. ☉

* Ciſtus mas folio rotundo hirſut. C. B. P. folio rotundiore Matth. Lugd. ☉

* Ciſtus Roſmarini folio. ☉

Clematitis ſylveſtris latifolia B. pin. Atragene Theophraſti Cluſ. ☉

Clematis .ſ. flammula repens B. pin. Flammula Dod. ☉

Clematis .ſ. flammula recta B. pin. Flammula altera ſurrecta Obſ. Lob. ☉

Clematitis cœrulea erecta B. pin. cœrulea pannonica hort. Eyſt. ☉

Clematitis cœrulea vel purpurea repens B. pin. peregrina purpurea ſimplici flore hort. Eyſt. ☉

Clematitis cœrulea flore pleno B. pin. peregrina purpurea flore pleno hort. Eyſt. ☉

* Clematis peregrina flore parvo rubro. ☉

* Clematis peregrina flore parvo albo. ☉

Clematitis trifolia flore roſeo clavato B. pin. Granadilla, Flos paſſionis hiſt. Mex. ☉

Clematis, ſeu flos paſſionis flore viridi. Murucuiæ ſpecies foliis hederæ ſcandentis Georgii Marcgravii. In hiſt. Braſ. ☉

Clematis tetraphyllos Americana. ♃ ☉

Clematis daphnoïdes minor B. pin. Clematis daphnoides Dod. ☉

Clematis daphnoïdes flore purpureo hort. Eyſt. ☉

Clematis daphnoïdes major Dod. B. pin. ☉

Clinopodium Matth. Cluſ. Origano ſimile B. pin. ☉

Clinopodium vulgare Cluſ. arvenſe Ocimi facie B. pin. ☿

* Clinopodium Auſtriacum Ponæ. ☉

Cnecorum Matthioli Cluſ. Thymelææ affinis facie externa B. pin. ☉.

Cne-

Cneoron album folio Oleæ argenteo molli B. pin. Dorycnium Plateau Cluſ. ☉

Cnicus vulgaris Cluſ. ſativus, ſ. Carthamum officinarum B. pin. ♀

Cnicus cœruleus aſperior B. pin. alter Cluſ. cœruleo flore. ☉

Cnicus ſylveſtris hirſutior, ſ. Carduus benedictus B. pin. Carduus benedictus Dod. ♀

Cochlearia Dod. folio ſubrotundo B. pin. ♀

* Cochlearia Armorica flore parvo ſubpurpureo. ♂ ♀ ♀|

* Cochlearia Britannica Lob. Dod. folio ſinuato C. B. P. ☉

Colchicum commune B. pin. vulgare flore purpuraſcente hort. Eyſt. vulgare album ejuſdem. ☉

Colchicum commune folio lineis albis picto. ♂ ☉

Colchicum polyanthes lato hellebori albi folio B. pin Byzantinum πλατύφυλλον Cluſ. ☉

Colchicum candidum multiflorum B. pin. Pannonicum πολύανθες albo flore Cluſ. ☉

Colchicum variegatum Cornuti. ☉

Colchicum pleno flore Cluſ. B. pin. ☉
Colchicum luteum majus B. pin. Narciſſus autumnalis major Cluſ. ☉
* Colchicum foliorum oris luteis. ♃ ☉

Colocynthis pyriformis .ſ. pepo amarus B. pin. pyriformis Obſ. Lob. Pſeudocolocynthis pyri formâ hort. Eyſt. ♀

Colutea veſicaria Matthioli hiſt. Lugd. veſicaria B. pin. ☉
Colutea ſiliquoſa .ſ. ſcorpioïdes major B. pin. Scorpioïdes prima elatior Cluſ. ☉
* Colutea ſcorpioïdes maritima glauco folio B. in prod. ☉
* Colutea humilis Buxi foliis nobis, Anonimos flore coluteæ Cluſ. Pſeudochamabuxus Eyſt. ☉

Conſolida media pratenſis cœrulea B. pin. Bugula Dod. Eadem flore albo & carneo ☉
Conſolida media foliis hirſutis. Eadem flore albo & carneo. ☉

Conſolida regalis hortenſis flore minore B. pin.

pin. Delphinium elatius ſimplici flore Cluſ. Eadem flore albo & carneo. ♀

Conſolida regalis multiplicato violaceo flore hort. Eyſt. ♀

Conſolida regalis multiplicato incarnato flore hort. Eyſt. ♀

Conſolida regalis flore pleno albo hort. Eyſt. ♀

Conſolida regalis flore pleno rubro hort. Eyſt. ♀

Conſolida regalis flore multiplici cinericeo hort. Eyſt. ♀

Conſolida regalis flore pleno variegato. ♃ ♀

Conſolida regalis arvenſis B. pin. Flos regius ſylveſtris Dod. ♀

Conſolida regalis latifolia parvo flore B. prodr. ♀

* Conſolida regalis hortenſis flore minore verſicolori. ♃ ♀

Convolvulus major albus B. pin. Smilax lævis major Dod. ☉

Convolvulus minor arvenſis B. pin. Smilax lævis minor Dod. ☉

* Convolvulus virginianus nobis Battatas cammotes

cammotes Hiſpanorum Cluſ. ſiſarum Peruvianum Ger. Tab. ☉

Convolvulus minor ſemine triangulo B. pin. Helxine ciſſampelos altera Atriplicis effigie Lob. ♀

Convolvulus cœruleus hederaceo angulo-ſo folio B. pin. aſureus .ſ. cœruleus Obſ. Lob. ♀

Convolvulus purpureus folio ſubrotundo B. pin. Indicus flore violaceo hort. Eyſt. ♀

Convolvulus peregrinus cœruleus folio oblongo B. pin. & prodr. ♀

Convolvulus minimus ſpicæfolius Obſ. Lob. Linariæ folio B. pin. ☉

Convolvulus minor argenteus radice repente. ♃ ☉

Convolvulus hederaceus perennis. ♃ ☉

Conyza major vera Ad. Lob. mas Theophraſti, major Dioſcoridis B. pin. ☉

Conyza minor vera Ad. Lob. fœmina Theophraſti, minor Dioſcoridis B. pin. ♀

Conyza major vulgaris B. pin. Baccharis Monſpelienſium Obſ. & Icon. Lob. ☉

Conyza pannonica lanuginoſa B. pin. tertia Auſtriaca Cluſ. ☉

Conyza cœrulea acris B. Pin. Erigeron quartum Dod. ☉

Conyza helenitis pilosa Icon. Lob. alpina pilosissima B. pin. ☉

Conizis affinis B. pin. Britannica Gesneri & Lugdunensium Ad. Lob. ☉

Conyza media vulgaris Clus. media Asteris flore luteo, vel tertia Dioscoridis B. pin. ☉

Conyza minima Dod. major flore globoso B. pin. ♀

Conyza palustris serratifolia B. pin. Lingua major Dal. hist. Lugd. ☉

Conyza marina hist. Lugd. ☉

* Corchoros Plinii Lob. Lugd. melochia s. corchorus Park. ♀

Coriandrum Fuchs. majus B. pin. ♀

* Coriandrum sylvestre fœtidissimum C. B. P. sylvestre Myconi Lugd. ♀

Coris cœrulea maritima B. pin. Coris quorundam Clus. ☉

Cornus mas hist. Lugd. hortensis mas B. pin.

Cor-

Cornus fœmina B. pin. Virga ſanguin
Dod.

Coronopus Matthioli hiſt. Lugd. horten
B. pin. ☿
Coronopus maritima major B. pin. Plant
go marina Obſ. & Icon. Lob. ⊙

Corylus Cluſ. ſativa fructu albo minore
vulgaris B. pin.
Corylus ſativa fructu oblongo rubente
pin. domeſtica fructu oblongo rubr
Cluſ. deſcr.
Corylus ſylveſtris B. pin. Avellana nu
ſylveſtris Fuchſ.

Cotinus Matth. ed. B. Coggygria Cluſ.

Cotonaſter folio oblongo ſerrato B. pi
Cotonaſter forte Geſneri Cluſ. ⊙

Cotyledon Dod. major B. pin. ⊙
Cotyledon radice ſerpente. ♃ ⊙
Cotyledon media foliis oblongis ſerrati
B. pin. minus hort. Eyſt. Palmaria Tab.
Cotyledon minor foliis ſubrotundis ſerrati
B. prodr. ⊙

Coty

Cotyledon ſtellata B. pin. Aizoon peregrinum Cam. ♀

Cratægus Theophraſti hiſt. Lugd. Sorbus torminalis Dod.

Crithmum ſ. fœniculum maritimum minus B. pin. marinum Dod. ⊙

Crithmum chryſanthemum Dod. maritimum flore Aſteris attici B. pin. ⊙

Crithmum ſpinoſum Dod. maritimum ſpinoſum B. pin. ⊙

Crocus ſativus Matthioli hiſt. Ludg. ſativus B. pin. ⊙

* Crocus albus ſativus C. B. P. deſcr. ⊙

Crocus vernus latifolius flore purpureo verſicolore Cluſ. vernus latifolius purpureus variegatus B. pin. ⊙

Crocus vernus latifolius flore purpureo magno B. pin. Cluſ. deſcr. ⊙

Crocus vernus latifolius albo flore Cluſ. ⊙

Crocus flore argenteo lineis violaceis ſtriato Icon. Paſſæi. ⊙

Crocus vernus latifolius flavo flore Cluſ. vernus latifolius flavus B. pin. ⊙

Crocus

Crocus vernus latifolius pallido flore Ch
descr. latifolius pallidus B. pin. ☉
Crocus vernus latifolius flavo varius B. pi
luteus lineis nigris Swert. ☉

Cruciata Dod. hirsuta B. pin. ☉

Cucumis sativus hist. Lugd. sativus vulgar
B. pin. ♀
Cucumis anguinus flexuosusve Obs. Lob
flexuosus B. pin. ♀
Cucumis sylvestris Dod. sylvestris asinin
dictus B. pin. ♀

Cucurbita lagenaria Obs. & Icon. Lob. l
genaria flore albo folio molli B. pin. ♀
Cucurbita longior Dod. oblongo flore alb
folio molli B. pin. ♀
Cucurbita capitata Tab. B. pin. ♀

Cuminum semine longiore B. pin. sativum
Dod. ♀
Cuminum sylvestre capitulis globosis B. pin
sylvestre Dod. ♀

Cupressus Dod.

Cupreſſus fœmina Dod. deſcr.

Cyanus montanus latifolius vel Verbaſculum cyanoïdes B. pin. major Dod. ☉
Cyanus ſegetum B. pin vulgaris Obſ. & Icon. Lob. ♀
Cyanus hortenſis flore ſimplici cœruleo, albo, purpureo. ♀
Cyanus floridus odoratus Tureicus .ſ. Orientalis Park. flore albo & carneo. ♀
Cyanus repens latifolius B. pin. peramarus repens capitulis ſquarroſis Seſamoïdis parvi Ad. Lob. deſcr. ☉

Cyclamen vulgare hort. Eyſt. orbiculato folio infernè purpuraſcente B. pin. Idem flore albo. ☉
Cyclamen vernum hort. Eyſt. folio anguloſo B. pin. ☉
Cyclamen ſerotinum foliis hederaceis hort. Eyſt. hederæ folio B. pin. ☉
Cyclaminum Orientale Cornuti. ☉
* Cyclamen Perſicum odoratum. ☉

Cymbalaria Matthioli hiſt. Lugd. ☉

Cyno-

Cynogloſſum Dod. majus vulgare B. pin. ♀
Cynogloſſum ſylvaticum rubente caule B. pin. Cynogloſſa montana maxima frigidarum regionum Col. ♀
Cynogloſſum Creticum argenteo anguſto folio B. pin. Creticum primum Cluſ. ♀
* Cynogloſſum ſemper virens C. B. Prod. Cynogloſſa altera fol. virente Col. ♀
Cynogloſſum minus B. pin. Lappula ruſticorum, Elatine Tragi hiſt. Lugd. ♀

Cynoſorchis militaris major B. pin. Orchis ſtrateumatica, ſive ſtratiotes major, ſ. militaris Obſ. & Icon. Lob. ⊙
Cynoſorchis militaris pratenſis humilior B. pin. minor flore incarnato hort. Eyſt. ⊙
Cynoſorchis latifolia ſpicâ compactâ B. pin. Cynoſorchis tertia Dod. ⊙

Cyperus rotundus inodorus Germanicus B. prodr. ⊙
Cyperus longus Dod. odoratus radice longâ, ſ. Cyperus officinarum B. pin. ⊙

Cytiſus Maranthæ Matthioli Obſ. Lob. incanus ſiliquis falcatis B. pin. ⊙

Cityſus

Cytiſus incanus Creticus B. pin. Ebenus Cretica Proſp. Alp. exot. ☉

Cytiſus ſupinus inferè, & ſiliquis molli hirſutie pubeſcentibus B. pin. ſeptimus hort. Eyſt. ☉

Cytiſus glabris foliis, ſubrotundis, pediculis breviſſimis B. pin. quintus rotundifolius Tab. ☉

* Cytiſus incanus Auſtriacus folio oblongo C. B. P. 5 Cluſ. hiſt. ☉

* Cytiſus glaber nigricans C. B. P. 4 Cluſ. hiſt. ☉

D.

DAUCUS montanus Apii folio major B. pin. Selinoïdes ſecundus Obſ. & Icon. Lob. ☉

Daucus Alſaticus B. prodr. ☉

Daucus pratenſis Dal. hiſt. Lugd. pratenſis millefolii paluſtris folio B. pin. ☉

Dens caninus purpuraſcente flore Cluſ. latiore rotundioreque folio B. pin. ☉

Dens leonis Dod. latiore folio B. pin. ☉

Dentaria ἑπτάφυλλος Cluſ. heptaphyllos B. pin. ☉

Dentaria baccifera Cluſ. heptaphyllos baccifera B. pin. ☉

Dentaria τριφυλλος Cluſ. triphyllos B. pin. ☉

* Dentaria monophyllos, anapodophyllon quibuſdam. ♃ ☉

* Dentariæ affinis, Echii flore, capſula rotunda. ♃ ☉

Digitalis purpurea Dod. purpureo folio aſpero B. pin. ☉ Eadem flore albo.

Digitalis major lutea, vel pallida parvo flore B. pin. quarta Dod. deſcr. ☉

* Digitalis lutea amplo flore Ponæ lutea magno flore C. B. P. ☉

Digitalis latifolia flore ferrugineo. ♃ ☉

Digitalis anguſtifolia flore ferrugineo B. pin. ferruginea Icon. Lob. ☉

Digitalis foliis maximè ſerratis. ♃ ☉

Digitalis foliis ſubrubentibus Lyſimachiæ facie. ♃ ☉

Dipſacus ſativus Dod. B. pin. ♀

Dipſacus ſylveſtris Dod. ſylveſtris aut virga paſtoris major B. pin. ♀

Dipſacus ſylveſtris capitulo minore, vel virga paſtoris minor B. pin. tertius Dod. ♀

Doronicum latifolium Cluſ. radice ſcorpii B. pin. ☉

Doronicum Plantaginis folio B. pin. minus officinarum Obſ. & Icon. Lob. ☉

Doronicum Plantaginis folio alterum B. pin. Aliſma Matth. ed. B. hort. Eyſt. ☉

Doronicum maximum foliis caulem amplexantibus B. pin. ſeptimum Auſtriacum Cluſ. ☉

Doronicum foliis ſubtus lanuginoſis. ♃ ☉

Doronicum Americanum laciniato folio B. pin. app. Aconitum helianthemum Canadenſe Cornuti. ☉

* Doronicum Americanum minus fol. obſcurius virentibus. ♃ ☉

Draba umbellata, vel Draba major capitulis donata B. pin. prima vulgaris Cluſ. ☉

Draba alba ſiliquoſa repens B. pin. tertia ſucculento folio Cluſ. ☉

Draba lutea ſiliquis ſtrictiſſimis B. pin. lutea Matth. ed. B. ☉

Draba ſiliquoſa floribus violaceis. Fort. Leucoïum marinum alterum latiſolium Obſ. Lob. ♃

Dracunculus hortenſis B. pin. Draco herba Dod. ☉

Dracunculus pratenſis ſerrato folio B. pin. Ptarmica Fuchſii hiſt. Lugd. ☉

Dracunculus pratenſis flore pleno B. pin. Ptarmica vulgaris flore pleno Cluſ. ☉

Dracunculus polyphyllus B. pin. Dracontium majus Dod. ☉

* Dracunculus .ſ. Serpentaria Triphylla Braſſiliana B. prodr. ☉

E.

ECHIUM ſcorpioïdes arvenſe B. pin. Myoſotis hirſuta reptans Obſ. Lob. ♃

Echium ſcorpioïdes paluſtre B. pin. Myoſotis ſcorpioïdes partim repens partim erecta Icon. Lob. Idem flore albo. ☉

Echium vulgare Cluſ. B. pin. ♃

Echium procumbens floſculis atrorubentibus. ♃ ♃

Elatine

Elatine folio ſubrotundo B. pin. Veronica fœmina, Fuchſ. ♀

Elatine folio acuminato in baſi auriculato flore luteo B. pin. altera Dod. ♀

* Elychryſum .ſ. ſtæchas Citrina altera Lob. Icon. Lugd. ☉

* Elychryſum .ſ. ſtæchas Citrina Cretica amplo flore J. B. Creticum Eyſt. ♀

Ephemerum non lethale Matthioli hiſt. Lugd. ☉

Epimedium Dod. ☉

* Equiſetum arvenſe longioribus ſetis C. B. P. Park. ſegetale Ger.

* Equiſetum pratenſe longiſſ. ſetis C. B. P. paluſtre maj. Tab. paluſtre Ger.

* Equiſetum nudum Ger. Junceum Lugd. trag.

Erica vulgaris glabra B. pin. prior Dod. ☉

Erica floribus ex ſummis caulibus pendulis. Eadem flore albo. ☉

Erica major ſcoparia foliis deciduis B. pin. coris folio quarta Cluſ. ☉

Erica pumila calyculato Unedonis flore Icon. Lob. humilis cortice cinericeo Arbuti flore B. pin. Eadem flore albo ☉

Erica ſupina maritima Anglica Park. ☉

Eruca ſativa Fuchſ. latifolia alba ſativa Dioſcorid. B. pin. ♀

Eruca latifolia B. prodr. ♀

Eruca ſylveſtris Dod. ſylveſtris major lutea caule aſpero B. pin. ☉

Eruca paluſtris minor Tab. ſylveſtris minor luteo parvoque flore B. pin. ☉

Eruca vinealis parvo flore. An ſylveſtris minor lutea Burſæ paſtoris folio B. prodr. ♀

Eruca lutea latifolia, ſ. Barbarea B. pin. Barbarea Dod. ♀

Eruca Tanaceti foliis ♃ ☉

* Eruca Monſpeliaca ſiliqua quadrata Echinata C. B. P. ſinapi Echinatum Lugd. ♀

Eruca maritima Italica ſiliquâ haſtæ cuſpidi ſimili B. pin. Cakile Serapionis Obſ. Lob. ♀

* Eruca

* Eruca Maritima Anglica Park. marina Cakile Serapionis Lob. ♃
* Eruca ſ. Barbarea perennis, ſem. craſſiore. ♃
Eryngium marinum Dod. maritimum B. pin. ☉
Eryngium campeſtre Dod. vulgare B. pin. ☉
Eryngium montanum Amethyſtinum B. pin. totum cœruleum hort. Eyſt. ☉
* Eryngium montanum Pannonicum album Cluſ. deſcr. ☉
Eryngium montanum minimum capitulo magno B. pin. Carduncellus montis Lupi Ad. Lob. ☉
Eryngium minimum minus capitulo magno. ♃ ☉
Eryngium ex plani ſemine degener. ♃ ☉
Eryngium arvenſe foliis Sertæ ſimilibus B. pin. quartum Dod. ☉
Eryſimum vulgare B. pin. Irio ſ. Eryſimum Dod. ♃
Eryſimum latifolium majus glabrum B. pin. Irio Apulus altera lævi folio Erucæ Col. ♃
* Eryſimum anguſtifolium majus C. B. P.

Rapistrum sylvestre Irionis folio Col. ♀
* Erysimum Polyceration vel corniculatum C. B. P. Irio alter Matth. Lugd. ♀

Euonymus Dod. vulgaris granis rubentibus B. pin.
Euonymus latifolius B. pin. primus .f. latifolius Clus.
Eupatorium vulgare Matth. ed. B. cannabinum B. pin. ☉
Eupatoria foliis Enulæ Cornuti. ☉
Eupatorium cannabinum chrysanthemum Tab. ♀
Eupatorium cannabinum Americanum flore aureo. ♀
Eupatorium veterum .f. Agrimonia B. pin. ☉
Græcorum .f. Agrimonia Dod. ☉
Eupatorium odoratum B. pin. alterum odoratum, & aromaticum Col. descr. ☉
* Eupatorium odoratum santonicum Lob. Adverf. ☉
* Eupatorium capite nutante C. B. Chrysanthemum J. B. ♀
* Eupatorium Chrysanthemum, canadense prælatum, alato caule nobis. Aster virgineus

gineus luteus alato caule Park. descr. ☉

Euphrasia Dod. officinarum B. pin. ♀

Euphrasia minus ramosa flore ex cœruleo purpurascente hort. Eyst. unicaulis B. pin. descr. ♀

* Euphrasia unicaulis spicata. Trixago apula unicaulis Col. ♀

Euphrasia lutea viscata. ♃ ♀

Euphrasia pratensis rubra B. pin. secunda Dodonæi, sive Cratæogonon alterum quorundam Obs. Lob. ♀

Eufragia major sylvestris purpurea Col. Italica latifolia altera B. pin. ♀

Euphrasia pratensis lutea B. pin. Sideritis pratensis lutea hist. Lugd. ♀

F.

* FABA major fructu rubro C.B.Pin. ♀

Faba Fuchs. major recentiorum Obs. & Icon. Lob. ♀

Faba minor .s. equina B. pin. Bona .s. phaselus minor Dod. descr. ♀

Faba

Faba ſylveſtris Græcorum Obſ. & Icon. Lob. ſylveſtris fructu rotundo atro B. pin. ♀
Vide vicia.

Fagus Dod.

Ferrum equinum ſiliquâ ſingulari B. pin. equinum Obſ. & Icon. Lob. ♀
* Ferrum equinum Polyceraton Col. E. quinum ſiliquâ multiplici C. B. P. ♀
Ferrum equinum Germanicum ſiliquis in ſummitate B. pin. equinum capitatum Col. ☉
Ferrum equinum Gallicum ſiliquis in ſummitate B. pin. Lotus enneaphyllos Dal. hiſt. Lugd. ☉

Ferula galbanifera Obſ. & Icon. Lob. ferulago latiore folio B. pin. ☉

Ficus Dod. communis B. pin. fructu rubro & albo.
Ficus Indica Dod. folio ſpinoſo, fructu majore C. B. Pin. Indica major Park. ☉
* Ficus Indica minor Park. Theat. Indica fol. ſpinoſo fructu minore C. B. P. ☉

Fili-

Filipendula Dod. vulgaris B. pin. ☉
Filix fœmina Dod. ramosa major pinnulis obtusis non dentatis B. pin. ☉
Filix floreſcens Tragi hiſt. Lugd. ramosa non dentata florida B. pin. ☉
Filix mas Dod. non ramosa dentata B. pin. ☉
Filix mas aculeata major B. prodr. ☉
Filix baccifera Cornuti. ☉
Filix non ramosa petiolis tenuiſſimis, & tenuiſſimè dentatis B. pin. Filicula petræa prima Tab. ☉
* Filix arborea Tragi. ☉
* Filix paluſtris aculeata. ☉ ♂

Fœniculum Dod. vulgare Germanicum B. pin. ☉
Fœniculum dulce B. pin. Fœniculum ſ. Marathrum vulgatius dulce Ad. Lob. deſcr. & Icon. ☉

Fœnum Græcum Dod. ſativum B. pin. ☿
Fœnum Græcum ſylveſtre alterum polycration B. pin. Hedyſarum minimum hiſt. Lugd. ☿

Fragaria Fuchſ. vulgaris B. pin. ☉
Fraga candida Dod. deſcr. ☉ Fra-

Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine B. pin. Fraga fructu magno hort. Eyst. ☉
Fragaria flore duplici foliorum serie. ♃ ☉
Fragaria fructu rubro folioso. ♃ ☉
Fragaria sterilis B. pin. sylvestris minime vesca J. sterilis Icon. Lob. ☉
Fragaria sterilis incana. ♃ ☉

Fraxinella Clus. Dictamus albus vulgò J. Fraxinella B. pin. ☉
Fraxinella niveo flore Clus. descr. ☉

Fraxinus Dod. excelsior B. pin.
Fraxinus florifera. ♃

Fritillaria præcox purpurea variegata B. pin. Meleagris Dod. ☉
Fritillaria pyrenæa Clus. hist. app. flore minore B. pin. ☉
* Fritillaria coronæ imperialis facie, pullo flore Hispanica umbellifera swertii umbellifera Park. Parad.
* Fritillaria præcox alba C. B. P. alba Park. Parad.

Frumentum Indicum Maiz dictum B. pin. Turcicum

Turcicum Dod. Idem granis rubis. ♀
Frumentum Sarracenicum Matth. ed. B. Fegopyrum Dod. ♀
Frumentum Indicum ſpicâ articulatâ, perenne. ♃ ☉

Fumaria Dod. officinarum & Dioſcoridis B. pin. Eadem flore albo. ♀
Fumaria minor tenuifolia P. pin. Capnos tenuifolia Cluſ. ♀
Fumaria ſiliquoſa ſempervirens Cornuti. ☉
Fumaria bulboſa radice non cavâ minor B. pin. Radix cava minor Dod. Eadem flore albo. ☉
Fumaria bulboſa radice cava major B. pin. Radix cava major Cluſ. Eadem flore albo. ☉
Fumaria tuberoſa inſipida Cornuti. ☉
* Fumaria tenuifolia ſemine compreſſo lini inſtar. ♃ ♀
* Fumaria Claviculis donata C. B. P. Capnos altera Belgica flore albo Cluſ. ♀

G.

GALEGA Dod. vulgaris B. pin. ☉
Galega flore albo hort. Eyſt. ☉
Galegæ affinis, Sophera dicta B. pin. Sophera Proſp. Alp. de plant. Ægyp. ♀
* Galegæ affinis, Seſban Proſp. Alpini de plantis Ægyp. ♀

Gallium Dod. luteum B. pin. ☉
Gallium paluſtre album B. pin. album Tab. ☉
Gallium album tripetalon. ♃ ☉

Geniſta ſpinoſa major longioribus aculeis B. pin. ſpinoſa Dod. ☉
Geniſta ſpinoſa brevioribus aculeis, an Geniſtella minor aſpalathioïdes B. prodr. ☉
Geniſta ſpinoſa minor Germanica B. pin. Geniſtella Dod. aculeata Obſ. & Icon. Lob. ☉
Geniſtella ſpinoſa Corrudæ ſimilis. Scorpius Theophraſti hiſt. Lugd. Nepa Theophraſti Ad. Lob. ☉

Geniſta

Geniſta anguloſa, & ſcoparia B. pin. anguloſa .ſ. vulgaris hiſt. Lugd. ☉
Geniſta tinctoria Germanica B. pin. tinctoria Dod. ☉
* Geniſta purgans J. B. ☉
* Geniſta Acacia trifolia C. B. Acacia Dioſc. Ger. ☉

Gentiana major lutea B. pin. Gentiana Dod. ☉
Gentiana Aſclepiadis folio B. pin. ſecunda foliis Aſclepiadis Dod. deſcr. ☉
Gentianella Alpina anguſtifolia magno flore B. pin. helvetica Icon. Lob. major verna Cluſ. ☉
Gentiana cruciata B. pin. Cruciata .ſ. Gentiana minor Dod. ☉
Gentiana paluſtris anguſtifolia B. pin. Pneumonanthe Cord. hiſt. ☉

Geranium batrachiodes folio Aconiti B. pin. ſecundum βατραχῶδες minus Cluſ. ☉
Geranium batrachioïdes flore albo hort. Eyſt. ☉
Geranium batrachiodes flore variegato B. pin. Anglicanum variegatum hort. Eyſt. ☉

Gera-

Geranium batrachoïdes alterum longius radicatum Icon. Lob. batrachiodes odoratum B. pin. ☉

Geranium ſanguineum maximo flore B. pin. ſeptimum hæmatodes Cluſ. ☉

Geranium batrachiodes, Gratia Dei Germanorum Lob. B. pin. tertium batrachiodes majus Cluſ. ☉

* Geranium batrachiodes minus annuum purpurocæruleum. ♃ ☿

* Geranium batrachioïdes minus perenne verſicolor. ♃ ☉

Geranium montanum fuſcum B. pin. fuſcum hort. Eyſt. ☉

Geranium tuberoſum Dod. tuberoſum majus B. pin. ☉

Geranium nodoſum B. pin. quintum nodoſum Plateau Cluſ. ☉

Geranium lucidum ſaxatile B. pin. ſaxatile hort. Eyſt. ☿

Geranium folio Malvæ rotundo B. pin. Pes columbinus Dod. ☿

* Geranium Melachoïdes flore albo. ♃ ☿

Geranium folio Malvæ rotundo minus B. pin. deſcr. ☿

Geranium columbinum tenuiùs laciniatum

B.

B. prodr. Idem flore albo. ♀
Geranium folio Althææ B. pin. malacoïdes Obſ. & Icon. Lob. ♀
Granium cicutæ folio moſchatum B. pin. ſupinum Dod. ♀
Geranium Coriandri folio odorum B. pin. Apulum Coriandri folio alterum odorum Col. ♀
Geranium Cicutæ folio minus & ſupinum B. pin. minus vel arvenſe Tab. ♀
Geranium arvenſe album Tab. ♀
Geranium robertianum Dod. robertianum primum B. pin. ♀
*Geranium Rubertianum flore albo. ♂ ♀
Geranium Creticum annuum hæmatodes Icon. Lob. latifolium longiſſimâ acu B. pin. ♀
Geranium triſte Cornuti. ☉
Geranium flore verſicolore. ☉
Geranium fœtidum Park. ☉

Gingidium umbellâ oblongâ B. pin. Viſnaga Matth. ed. B. ♀

Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis major B. pin. Narbonenſis Obſ. & Icon. Lob.

Gladiolus flore albo Swert. ☉
Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis minor B. pin. minimus Lob. Ad. part. alt. ☉

Glaux maritima B. pin. exigua maritima Obſ. & Icon. Lob. ♀
* Glaux major flore herbaceo. ♃ ☉

Glycyrrhiza capite echinato B. pin. echinata Dodonæi hiſt. Lugd. ☉
Glycyrrhiza vulgaris Dod. ſiliquoſa vel Germanica B. pin. ☉
Glycyrrhiza ſylveſtris hiſt. Lugd. ſylveſtris floribus luteopalleſcentibus B. pin. ☉

Gnaphalium maritimum B. pin. marinum tomentoſum hiſt. Lugd. ☉
Gnaphalium Americanum Cluſ. latifolium Americanum B. pin. ☉
Gnaphalium vulgare majus B. pin. Filago .ſ. Impia Dod. ♀
Gnaphalium medium B. pin. Filago minor Dod. ♀
Gnaphalium minus repens B. pin. minimum Icon. Lob. ♀
Gnaphalium roſeum B. prodr. ♀

Gnapha-

Gnaphalium majus lato oblongo folio B. pin. Gnaphalium Plateau fecundum Cluſ. ♃

* Gnaphalium 3 Plateau Cluſ. ♃

Gnaphalium Anglicum vel Belgicum folio longiore Icon. Lob. majus anguſto, oblongo folio alterum B. pin. ☉

Gnaphalium montanum flore rotundiore B. pin. montanum variegatum hort. Eyſt. ☉

Goſſipium ſ. Xylon Dod. Goſſipium fruteſcens ſemine albo B. pin. ♃

Gramen caninum arvenſe ſ. Gramen Dioſcoridis B. pin. caninum medicatum Obſ. Lob. ☉

Gramen caninum vineale B. prodr. ☉

Gramen caninum longiùs radicatum majus & minus B. pin. canarium longiùs radicatum latiore paniculâ Ad. Lob. part. alt. ☉

Gramen caninum ſupinum minus B. pin. caninum ſupinum Icon. Lob. ☉

Gramen nodoſum avenaceâ paniculâ B. pin. nodoſum hiſt. Lugd. ☉

Gramen tremulum Hiſpanicum maximum Park. ♃

Gramen tremulum majus B. pin. leporinum, & tremulum Tab. ♀

Gramen tremulum minus paniculâ parvâ B. prodr. ♀

Gramen filiceum .ſ. polyanthes hiſt. Lugd. paniculis elegantiſſimis, .ſ. Heragroſtis major B. pin. ♀

Gramen minimum Dalechampii hiſt. Lugd. minimum paniculis elegantiſſimis B. pin. ♀

Gramen pratenſe paniculatum molle B. prodr. lanatum Dal. hiſt. Lugd. ☉

Gramen pratenſe vulgatius hiſt. Lugd. pratenſe paniculatum majus latiore folio, πόα Theophraſti B. pin. ☉

Gramen pratenſe paniculatum medium B. pin. pratenſe ſecundum Dod. ☉

Gramen pratenſe paniculatum minus B pin. paniculatum minus album Tab. ☉

Gramen paniculâ multiplici B. prodr. Monſpeſſuli vulgò duriuſculum minus nominatum. ♀

Gramen arvenſe paniculâ criſpâ B. prodr. minimum xerampelinum Narbonenſe Icon. Lob. ♀

Gramen ſegetum paniculâ arundinaceâ B. pin. agrorum venti Spica Icon. Lob. ♀

Gramen

Gramen paniculatum folio variegato B. pin. ſulcatum vel ſtriatum album Icon. Lob. ☉

Gramen paluſtre paniculatum altiſſimum B. pin. aquaticum arundinaceum paniculatum Tab. ☉

Gramen pratenſe criſtatum .ſ. ſpicâ criſtatâ læve B. pin. criſtatum ejuſdem prodr. ☉

Gramen Caryophyllatæ foliis ſpicâ divulsâ B. pin. Caryophylleum Tab. ☉

Gramen typhoïdes maximum ſpicâ longiſſimâ B. prodr. ☉

Gramen typhoïdes ſpicâ multiplici B. pin. typhinum tertium Tab. ☉

Gramen alopecuroïdes ſpicâ aſperâ B. prodr. ♀

Gramen pratenſe tomentoſum paniculâ ſparsâ B. pin. eryophoron Dod. ☉

Gramen ſparteum ſpicatum latifolium B. pin. Spartum noſtras alterum Icon. Lob. ☉

Gramen ſparteum pennatum B. pin. Sparteum Auſtriacum pennatum Cluſ. ☉

Gramen foliolis junceis brevibus minus B. pin. exile durius Icon. Lob. ☉

Gramen junceum folio articulato aquaticum B. pin. aquaticum alterum Icon. Lob. ☉

Gramen juncoïdes junci ſparsâ paniculâ Park. ⊙

Gramen junceum ſpicatum .ſ. triglochin B. pin. Calamagroſtis quarta hiſt. Lugd. ⊙

Gramen cyperoïdes latifolium ſpicâ rutâ .ſ. caule triangulo B. pin. cyperoïdes hiſt. Lugd. ⊙

Gramen cyperoïdes ſpicâ pendulâ breviore B. pin. Pſeudocyperus Dod. ⊙

Gramen cyperoïdes paniculâ ſparsâ majus B. pin. cyperinum majus Tab. ⊙

Gramen cyperoïdes paluſtre majus ſpicâ compactâ B. pin. cyperinum paluſtre Tab. ⊙

Gramen cyperoïdes paluſtre majus ſpicâ divisâ B. pin. cyperoïdes parvum aquaticum Icon. Lob. ⊙

Gramen cyperoïdes maximum foliis & carinâ ſerratis. ⊙

Gramen cyperoïdes maritimum B. pin. maritimum hiſt. Lugd. ⊙

Gramen arundinaceum enode majus montanum B. pin. arundinaceum montanum Tab. ⊙

Gramen nemoroſum caliculis paleaceis B. pin. junceum bufonium Tab. ⊙

Gramen

Gramen hirſutum latifolium majus B. pin. hirſutum nemoroſum Icon. Lob. ♀

Gramen hirſutum anguſtifolium majus B. prodr. ♀

Gramen hirſutum capitulis Pſyllii B. pin. exile hirſutum cyperoïdes Icon. Lob. ♀

Gramen paluſtre aculeatum, vel minus Germanicum B. pin. paluſtre echinatum Icon. Lob. ⊙

Gramen dactylon folio arundinaceo majus B. pin. legitimum Cluſ. ⊙

Gramen dactylon folio latiore B. pin. Iſchæmon Plinii, ſ. dactylon hiſt. Lugd. ⊙

Gramen dactylon ſcoparium B. pin. ſcoparium Iſchæmi paniculis Gallicum Ad. Lob. part. alt. ⊙

Gramen dactylon eſculentum B. pin. Gramen mannæ primum Dod. ♀

Gramen paniceum ſpicâ longis ariſtis armatâ B. pin. Panici effigie gramen ariſtis circumvallatum Icon. Lob. ⊙

Gramen paniceum ſpicâ ſimplici B. pin. Panici effigie gramen ſimplici ſpicâ Icon. Lob. ⊙

Gramen miliaceum Icon. Lob. ſylvaticum paniculâ miliaceâ ſparsâ B. pin. ⊙

Gramen hordeaceum minus & vulgare B. pin. hordeaceum, Holcus Plinii hiſt. Lugd. ♆

Gramen loliaceum ſpicâ longiore B. pin. Lolium Dod. ♆

Gramen loliaceum minus ſpicâ ſimplici B. prodr. ♆

Gramen feſtucarium. Feſtuca graminea glumis hirſutis B. pin. Bromos ſterilis altera Icon. Lob. ♆

Gramen feſtucarium. Feſtuca avenacea ſterilis elatior B. pin. Bromos herba Dod. ♆

Gramen feſtucarium. Feſtuca graminea glumis vacuis B. prodr. ♆

Gramen avenaceum altero alteri innato Park. ♆

Gramen avenaceum ſquammoſâ glumâ Park. ♆

* Gramen Phalaroïdes perenne tuberoſâ radice. ♃ ⊙

* Gramen Feſtucarium capitulis duris, Ægylops Narbonenſis Lob. ♆

* Gramen Miliaceum ſylvaticum. ♆

* Gramen echinatum tribuloïdes Col. ♆

Gramen Parnaſſi Dod. albo ſimplici flore B. pin. ⊙

Grati-

Gratiola Dod. centauroïdes B. pin. ☉

Groſſularia ſimplici acino, vel ſpinoſa ſylveſtris B. pin. Uva criſpa Dod. ☉

* Groſſularia, Uva criſpa, fructu albo & Margaritis ſimili C. B. P. ☉

*Groſſularia Uva criſpa fructu rubro. ☉

Groſſularia rubra hiſt. Lugd. multiplici acino .ſ. non ſpinoſa hortenſis rubra .ſ. Ribes officinarum B. pin. ☉

Groſſularia hortenſis fructu Margaritis ſimili B. pin. Ribes fructu albo hort. Eyſt. ☉

Groſſularia hortenſis majore fructu rubro B. pin. Ribes major fructu rubro hort. Eyſt. ☉

Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro B. pin. Ribeſium fructu nigro Dod. ☉

* Groſſularia ribes fructu rubro, folio Uvæ criſpæ. ♃ ☉

H.

HALIMUS latifolius .ſ. fruticoſus B. pin. primus Cluſ. ⊙

Halimus .ſ. Portulaca marina B. pin. Portulaca marina, an Crithmum Dioſcoridis Icon. Lob. ⊙

Hedera arborea B. pin. corymboſa Obſ. Lob. ⊙

Hedera helix Dod. major ſterilis B. pin. ⊙

Hedera terreſtris vulgaris B. pin. terreſtris Dod. Eadem flore carneo. ⊙

Hedera ſaxatilis magno flore B. pin. Aſarina Lobelii hiſt. Lugd. ⊙

Hedera trifolia Canadenſis Cornuti. ⊙

Hedera quinquefolia Canadenſis Cornuti. ⊙

* Hedera corymboſa fructu luteo, Hedera Dionyſii, & chryſocarpos Lugd. ⊙

* Hedera trifolia Canadenſis folio ſinuato. ♃ ⊙

Hedyſarum triphyllum Canadenſe Cornuti. ⊙

Helenium Dod. vulgare B. pin. ⊙

Helenium

Helenium Indicum maximum B. pin. Flos ſolis major hort. Eyſt. ♀

Helenium Indicum ramoſum B. pin. Flos ſolis prolifer hort. Eyſt. Idem ſemine albo, cinericeo, & ſtriato. ♀

Helenium Indicum tuberoſum. Flos ſolis Farneſianus, Aſter pervanus tuberoſus Col. ☉

Helenium Canadenſe præaltum alato caule. ♃ ☉

Helenium Canadenſe præaltum Voſacan dictum. ♃ ☉

Helenium Canadenſe humilius latifolium ♃ ☉

Helichryſum foliis oblongis Stœchadi citrinæ ſimilibus B. pin. Chryſocome peregrina hort. Eyſt. ☉

Helichryſum ſ. Stœchas citrina auguſtifolia B. pin. Stœchas citrina Dod. ☉

Heliotropium majus Cluſ. majus Dioſcoridis B. pin. ♀

Heliotropium minus tricoccum Cluſ. tricoccum B. pin. ♀

Helleborus

Helleborus niger fœtidus B. pin. Helleboraſter maximus flore & ſemine prægnans Obſ. & Icon. Lob. ☉

Helleborus niger hortenſis flore viridi B. pin. niger adulterinus hortenſis Fuchſ. ☉

Helleborus niger flore roſeo B. pin. niger legitimus Cluſ. ☉

Helleborus niger flore roſeo minor Belgicus. ♃ ☉

Helleborus niger trifolius Ald. hort. Farn. ♀

Helleborus niger Saniculæ folio major B. pin. Aſtrantia nigra Obſ. & Icon. Lob. ☉

Helleborus Saniculæ folio minor B. prodr. ☉

Helleborus Hippocratis Tab. niger tenuifolius Buphtalmi flore B. pin. ☉

Helleborus albus flore ſubviridi B. pin. albus flore herbaceo hort. Eyſt. ☉

Helleborus albus flore atrorubente B. pin. hort. Eyſt. ☉

Helleborine latifolia montana B. pin. Epipactis latifolia hort Eyſt. ☉

Helleborine anguſtifolia paluſtris ſ. pratenſis B. pin. Helleborine, ſive Epipactis recentiorum Obſ. & Icon. Lob. ☉

Helleborine flore albo, vel Damaſonium mon-

montanum latifolium B. pin. Epipactis anguſtis foliis hort. Eyſt. ☉

Helleborine montana anguſtifolia purpuraſcens B. pin. recentiorum ſexta Cluſ. ☉

Helleborine herbaceo flore. ♃ ☉

*Helleborine, ſ. calceolus marianus, vide calceolus mariæ.

Heſperis hortenſis B. pin. Viola matronalis flore albo hort. Eyſt. Eadem flore purpureo quæ

Viola matronalis flore purpureo hort. Eyſt. ☉

Heſperis flore pleno albo. Viola matronalis flore multiplici Cornuti deſcr. ☉

*Heſperis Syriaca Eyſt. peregrina ſiliquis articulatis C. B. P. ♀ ☉

*Heſperis ſylveſtris hirſuta foliis Hieracii B. prodr. ♀

Hieracium majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites B. pin. majus Fuchſ. ☉

Hieracium majus foliis Sonchi ſemine curvo B. pin. Creticum pro Endivia lutea miſſum Cam. deſcr. Sonchus aſper laciniatus Creticus B. prodr. ♀

Hiera-

Hieracium arboreſcens paluſtre B. pin. Sonchus lævior Aſtriacus altiſſimus quintus Cluſ. ☉

Hieracium Apulum flore ſuaverubente Col. dentis leonis folio flore ſuaverubente B. pin. ♀

Hieracium odore Apuli ſuaverubentis. ♂ ♀

Hieracium dentis leonis folio monoclonon B. pin. intybaceum Tab. ☉

Hieracium dentis leonis folio hirſutie aſperum minùs laciniatum B. pin. & prodr. ☉

Hieracium dentis leonis folio hirſutie aſperum magis laciniatum B. pin. ☉

Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro B. pin. Hyoſeris anguſtifolia Tab. ☉

Hieracium minus folio ſubrotundo B. pin. minimum nonum Cluſ. ♀

Hieracium maximum aſperum Chondrillæ folio B. prodr. ♀

Hieracium Chondrillæ folio glabrum B. pin. aphacoïdes Tab. ♀

Hieracium Chondrillæ folio glabro radice ſucciſâ majus B. pin. minus præmorſâ radice Obſ. & Icon. Lob. ☉

Hiera-

Hieracium capitulum inclinans ſemine adunco B. pin. facie Hedypnoïs Icon. Lob. ♀

Hieracium ſiliquâ falcatâ B. pin. Narbonenſe falcatâ ſiliquâ Lobelii hiſt. Lugd. ♀

Hieracium echioïdes capitulis cardui benedicti B. pin. echioïdes, Bugloſſum luteum Tab. ♀

Hieracium octavum folio Hedypnoïdis Cluſ. montanum dentis leonis folio incano, vel laciniatum lanuginoſo folio B. pin. ☉

Hieracium phlomoïdes Tab. Alpinum latifolium hirſutie incanum flore magno B. pin. ☉

Hieracium montanum tomentoſum. An villoſum quintum Cluſ. ☉

Hieracium montanum majus latifolium Tab. montanum latifolium glabrum majus B. pin. ☉

Hieracium murorum folio piloſiſſimo B. pin. Corchorus Dal. hiſt. Lugd. ☉

Hieracium murorum folio non maculato minus piloſo. ♃ ☉

Hieracium fruticoſum latifolium foliis dentatis glabrum B. pin. majus latifolium vel ſecundum

ſecundum Cluſ. deſcr. fruticeſcens lati-
folium polyanthos hort. Eyſt. ⊙
Hieracium Sabaudum Penæ & Lobelii hiſt.
Lugd. fruticoſum anguſtifolium majus B.
pin. ⊙
Hieracium montanum alterum λεπτομακρόκαυ-
λον Col. ♀
* Hieracium foliis & floribus Dentis leonis
bulboſi ſemine curvo. ♃ ♀
* Hieracium anguſtifolium glabrum .ſ.
Piloſilla major glabra. ♃ ⊙
* Hieracium calice barbato Col. prolife-
rum falcatum C. B. P. ♀
* Hieracium ramoſum magno flore B. in
prodr. 14 ♀
* Hieracium Pulmonaria non maculata in-
deſectis foliis. ♃ ♀

Holoſteum hirſutum albicans minus B. pin.
Salmanticenſe minus Cluſ. ⊙
Holoſteum ſtrictiſſimo folio majus B. pin.
Serpentina Matthioli Dod. ⊙
Holoſteum ſtrictiſſimo folio minus B. pin.
Serpentina omnium minima Lobelii hiſt.
Lugd. ⊙
Holoſteum Alſines flore. ♃ ⊙

Holoſteo

Holoſteo affinis, Cauda muris B. pin. Cauda murina Dod. ♀

Hordeum polyſtichum hybernum B. pin. polyſtichum Fuchſ. ♀
Hordeum diſtichon Dod. B. pin. ♀

Horminum Creticum Proſp. Alp. de exot. ſativum B. pin. ♀
Horminum Sclarea dictum B. pin. Sclarea Matth. ed B. Obſ. Lob. ☉
Horminum luteum glutinoſum B. pin. Colus Jovis Obſ. & Ad. Lob. ☉
Horminum ſylveſtre latifolium verticillatum B. pin. ſylveſtre tertium Cluſ. ☉
Horminum pratenſe foliis ſerratis B. pin. ſylveſtre Fuchſ. hiſt. Lugd. Idem flore albo ☉
Horminum anguſtifolium laciniatum flore cœruleo. An ſylveſtris quarti, quinta ſpecies Cluſ. ☉
Horminum Lapathi unctuoſi folio. ♃ ☉
* Horminum flore minore folio integro. ♃ ☉
* Horminum flore minore dilute cœruleo folio ſinuato. ♃ ♀

* Horminum flore majore amplo violaceo Lobis punctis aureis notatis. ♃ ☿
* Horminum flore majore Salviæ folio forte Marum Ægyptiacum Prosp. Alp. ☿
* Hormium flore majore sylvestris 5 altera species Clus. ☉

Hyacinthus comosus major purpureus B. pin. comosus spurius hort. Eyst. Idem flore albo & carneo. ☉
Hyacinthus Sanneſius comâ paniculosâ Col. paniculâ cœruleâ B. pin. ☉
Hyacinthus racemosus cœruleus major B. pin. botryoïdes cœruleus hort. Eyst. ☉
Hyacinthus racemosus cœruleus minor latifolius B. pin. botryoïdes cœruleus hort. Eyst. ☉
Hyacinthus botryoïdes floribus albis hort. Eyst. ☉
Hyacinthus racemosus cœruleus minor juncifolius B. pin. racemosus Dod. comosus minor Obs. Lob. ☉
Hyacinthus racemosus moschatus B. pin. Muscari obsoletiore flore Clus. ☉
Hyacinthus racemosus moschatus luteus B. pin. Muscari flavo flore Clus. ☉

Hyacin-

Hyacinthus oblongo flore cœruleus major B. pin. Anglicus & Belgicus Obſ. & Icon. Lob. ⊙

Hyacinthus Belgicus candidus Icon. Lob. ⊙

Hyacinthus floribus Campanulæ utrinque diſpoſitis B. pin. Neapolitanus Swert. ⊙

Hyacinthus oblongo cœruleo flore minor B. pin. minor Hiſpanicus Cluſ. cur. poſt. deſcr. Ger. Icon. ⊙

Hyacinthus orientalis albus primus B. pin. Orientalis niveus Cluſ. ⊙

Hyacinthus brumalis orientalis Gemmæ ex Lobelio hiſt. Lugd. ⊙

Hyacinthus orientalis maximus B. pin. Orientalis polyanthos Cluſ. ⊙

Hyacinthus orientalis flore duplici hort. Eyſt. B. pin. ⊙

Hyacinthus orientalis flore cœruleo pleno hort. Eyſt. ⊙

Hyacinthus ſtellatus vulgaris Cluſ. ſtellaris trifolius B. pin. ⊙

Hyacinthus ſtellatus albo flore Cluſ. Idem flore carneo. ⊙

Hyacinthus ſtellatus cineracei coloris Cluſ. ſtellaris Sommeri Ger. Stellaris ſpicatus cinereus B. pin. ⊙

Hyacinthus ſtellatus lilifolius Cluſ. Stellaris foliis & radice Lilii B. pin. ☉

Hyacinthus ſtellaris autumnalis minor B. pin. autumnalis minor Dod. ☉

Hyacinthus ſtellatus Perüanus Cluſ. Indicus bulboſus ſtellatus B. pin. Idem flore albo. ☉

Hyacinthus Indicus tuberosâ radice Cluſ. Indicus tuberoſus flore Hyacinthi orientalis B. pin. ☉

Hyoſcyamus vulgaris vel niger B. pin. niger Dod. ♀

Hyoſcyamus albus Dod. albus major vel tertius Dioſcoridis B. pin. ♀

Hyoſcyamus aureus Proſp. Alp. exot. ♀

Hypecoon legitimum Cluſ. Hypecoum B. pin. ♀

Hypericum Dod. vulgare B. pin. ☉

Hypericum minus ſupinum, vel ſupinum glabrum B. pin. minimum ſupinum Septentrionale Icon. Lob. ☉

Hypericum ſupinum tomentoſum alterum Cluſ. ſupinum Dod. ☉

Hype-

Hypericum fruteſcens Americanum flore albo Park. Pruno ſylveſtri affinis Canadenſis B. pin. app. ☉

Hyſſopus vulgaris Dod. officinarum cœrulea .ſ. ſpicata B. pin. ☉
Hyſſopus rubro flore hort. Eyſt. B. pin. ☉
Hyſſopus flore albo hort. Eyſt. vulgaris alba B. pin. ☉
* Hyſſopus hirſuta & ſtriata. ☉
Hyſſopus latifolia B. prodr. ☉
Hyſſopus anguſtifolia ſpicato flore Cluſ. anguſtifolia ſpicata B. pin. ☉

Hyſſopifolia .ſ. Gratiola minor B. prodr. Gratiola minor Matth. ed. B. ☉

I.

Jacea Auſtriaca villoſo capite Cluſ. latifolia capite hirſuto B. pin. ☉
Jacea Luſitanica ſempervirens. ♃ ☉
Jacea nigra Dod. nigra laciniata B. pin. ☉
Jacea lutea capite ſpinoſo B. pin. luteo flore Cluſ. ☉

Jacea cyanoïdes echinato capite B. pin. Stœbe Salmantica ſecunda Cluſ. Cyanoïdes flos Dod. ☉

Jacea latifolia purpurea capitulo ſpinoſo B. prodr. ☉

Jacea capite longis aculeis ſpinoſo B. prodr. ☉

Jacea montana incana capite Pini B. pin. ♀

Jacea Oleæ folio capitulis ſimplicibus B. pin. Ptarmica Auſtriaca Dod. Cluſ. ♀

Jacea Oleæ folio minore flore B. pin. Ptarmicæ Auſtriacæ ſpecies Cluſ. cur. poſt. ♀

* Jacea Babylonica B. prodr. ☉

* Jacea fruticans Pini folio C. B Stœbe capitata Roriſmarini folio Ponæ. ☉

* Jacea integri-folia humilis C. B. ☉

* Jacea pumila Adv. Lob. ☉

Jacobæa Dod. vulgaris laciniata B. pin. ☉

Jacobæa foliis amplioribus incanis. ☉

Jacobæa maritima B. pin. Cineraria hiſt. Lugd. ☉

* Jacobæa Crithmi litorei foliis. ♃ ☉

* Jacobæa Senecionis folio. ♃ ♀

Jaſminum Dod. vulgatius flore albo B. pin. ☉

Jaſmi-

Jaſminum humilius magno flore B. pin. Gelſeminum Catalonicum hort. Eyſt. ☉
Jaſminum humile luteum B. pin. flore luteo hort. Eyſt. ☉
Jaſminum luteum vulgò dictum bacciferum B. pin. Polemonium Monſpelienſium Icon. Lob. ☉
Jaſminum flavum odoratum. Gelſiminum Indicum flavum odoratiſſimum Bapt. Ferr. ☉
Jaſminum purpureum prælongis ſiliquis. Gelſeminum hederaceum Indicum Cornuti. Indicum flore phœniceo Bapt. Ferr. ☉

Iberis Cardamantica Obſ. Lob. Iberis latiore folio B. pin. ☉
* Iberis Naſturtii folio Matth. ed. B. ♃
* Iberis virginiana latifolia ramoſa. ♄ ♃

Ilex major glandifera Dod. folio rotundiore molli modicéque ſinuato B. pin.
Ilex minor coccigera Dod. aculeata cocciglandifera B. pin.

Imperatoria Matthioli hiſt. Lugd. major B. pin. ☉

Intybus ſativa latifolia, ſ. Endivia vulgaris B. pin. Intybum ſativum Dod. ♆

Intybus ſativa anguſtifolia B. pin. minor Matth. ed. B. ♆

Intybus criſpa B. pin. Intubum criſpum hiſt. Lugd. ♆

Iris noſtras vulgaris Icon. Lob. vulgaris Obſ. ejuſdem vulgaris Germanica ſ. ſylveſtris B. pin. ☉

Iris alba florentina B. pin. florentina hort. Eyſt. ☉

Iris latifolia major ſ. Suſiana Cluſ. Suſiana flore maximo ex albo nigricante B. pin. ☉

Iris Dalmatica major hiſt. Lugd. Aſiatica cœrulea polyanthos B. pin. Eadem flore violaceo, & dilutius violaceo. ☉

Iris exotica Cam. major latifolia 14ª Cluſ. latifolia odore Oxyacanthæ B. pin. ☉

Iris latifolia pannonica colore multiplici B. pin. major latifolia 15ª Cluſ. ☉

Iris paluſtris lutea Tab. Acorus adulterinus B. pin. ☉

Iris Tripolitana Cluſ. deſcr. media longiſſimis foliis lutea B. pin. ☉

Iris ſylveſtris Byzantina peramœna Icon. Lob.

Lob. pratenſis anguſtifolia non fœtida altior B. pin. ⊙

Iris anguſtifolia prunum redolens minor B. pin. perpuſilla ſylveſtris anguſtifolia Obſ. Lob. ⊙

Iris bulboſa latifolia .ſ. prima Cluſ. bulboſa latifolia acaulos odora B. pin. Eadem flore albo. ⊙

Iris Perſica variegata præcox Bapt. Ferr. ⊙

Iris bulboſa Anglicana flore cœruleo hort. Eyſt. ⊙

Iris bulboſa Anglicana major flore candido hort. Eyſt. ⊙

Iris bulboſa violaceo flore Cluſ. foliis cepaceis maculatis flore purpureo inodoro B. pin. ⊙

Iris bulboſa latifolia vulgò dicta Iris l' Abbé. ♃ ⊙

Iris alba oris cœruleis Swert. & Rob. in horto Valet. ⊙

Iris bulboſa lutea verſicolor B. pin. ⊙

Iris tuberoſa Belgarum Icon. Lob. tuberoſa folio anguloſo B. pin. ⊙

* Iris tuberoſa matitima C. B. P. ⊙

* Iris bulboſa lutea major. ♃ ⊙

Isatis sativa, vel latifolia B. pin. Glastum sativum Obs. & Icon. Lob. ☿

Jujubæ majores oblongæ B. pin. Ziziphus rutila Clus.

Juncus acutus paniculâ sparsâ B. pin. acutus Dod. ⊙

Juncus maximus .s. Scirpus major B. pin. Holoschœnos Dod. ⊙

Juncus lævis paniculâ sparsâ major B. pin. lævis Dod. ⊙

Juncus lævis paniculâ non sparsâ B. pin. lævis glomerato flore Icon. Lob. ⊙

Juncellus omnium minimus Ad. Lob. descr. ⊙

Juncus capitulis Equiseti major B. pin. clavatus Dalechampii hist. Lugd. ⊙

Juncus Lithospermi semine. ♃ ⊙

* Juncus acutus caule triangulo B. in prodr. ⊙

* Juncus acutis Sorghi capitulis. ♃ ⊙

Juniperus Dod. vulgaris fruticosa B. pin.

K.

KALI geniculatum majus B. pin. Salicornia Dod. ☿

Kali ſpinoſo affinis B. pin. Tragum Matth. ed. B. ☿

* Kali ſempervirens grandius perpetuum B. prodr. deſcr. ☉

* Kali minus Geſn. hort. album Ger. ☿

L.

LACTUCA ſativa B. pin. ſativa folio Scariolæ Obſ. & Icon. Lob. ☿

Lactuca Romana dulcior nigriore, & Scariolæ hortenſis folio, ſemine nigro Ad. Lob. folio obſcurius virente, ſemine nigro B. pin. ☿

Lactuca maculoſa B. pin. fuſci ac veluti purpurei coloris, ſ. ex albido rubicunda Dod. deſcr. ☿

Lactuca capitata Dod. B. pin. ☿

Lactuca Italica laciniata B. prodr. ♀
Lactuca crispa Dod. B. pin. ♀
Lactuca crispa secunda Tab. ♀
Lactuca sylvestris costâ spinosâ B. pin. sy
vestris Dod. ♀
Lactuca sylvestris odore viroso B. pin.
grestis Ad. & Icon. Lob. ♀
Lactuca montana purpurocœrulea major
pin. Sonchus montanus purpureus πλε
πίπλου Col. ☉

Lamium purpureum fœtidum folio subro
tundo B. pin. Urtica iners altera Do
Idem flore albo. ♀
Lamium purpureum, vel album non fœte
folio oblongo B. pin. Urtica iners
Lamium primum Dod. Idem flore l
teo. ☉
Lamium folio oblongo luteum B. pin. lut
um Icon. Lob. ☉
Lamium maculatum, & albâ lineâ notatu
B. pin. Lamium Plinii Campoclarense
montanum Col. ☉
Lamium foliis caulem ambientibus maj
B. pin. Ballote crispa major hist Lugd.
Lamium maximum sylvaticum B. pin. U
tic

tica herculea Tragi hiſt. Lugd. Galeopſis legitima Cluſ. ☉

Lamium maximum ſylvaticum alterum B. pin. Galeopſis maxima pannonica Cluſ. ☉

Lamium montanum Meliſſæ folio B. pin. Meliſſophyllum verum Fuchſ. Idem flore albo quod

Lamium pannonicum primum albo flore Cluſ. ☉

Lamium peregrinum .ſ. Scutellaria B. pin. Lamium aſtragaloïdes Cornuti. Caſſida Col. ☉

*Lamium Parietariæ facie. ♃ ☉

Lapathum ſativum Dod. utr. ed. Hippolapathum hortenſe hiſt. Lugd. ☉

Lapathum hortenſe .ſ. Spinacia ſemine ſpinoſo B. pin. Spinacia hiſt. Lugd. ♀

Lapathum hortenſe ſ. ſpinacia ſemine ſpinoſo B. pin. Spinachia ſemine non ſpinoſo Matth. ed. B. ♀

Lapathum folio acuto plano B. pin. ſylveſtre .ſ. Oxylapathum Dod. ☉

Lapathum folio acuto criſpo B. pin. acutum criſpum Tab. ☉

Lapathum ſanguineum Obſ. Lob. folio acuto rubente B. pin. ♀

La-

Lapathum acutum minimum Icon. Lob. minimum B. pin. ☉

Lapathum unctuoſum B. pin. Bonus hemicus Matth. ed. B. ♃

Lapathum folio ſubrotundo B. pin. folio minus acuto Icon. Lob. fidium inſtar. J. ♃ ☉ nobis.

Lapathum rotundifolium Cam. Hippolapathum rotundifolium montanum B. pin. ☉

Lapathum aquaticum folio cubitali B. pin. Hydrolapathum majus Obſ. Lob. ☉

Lappa major, Arcium Dioſcoridis B. pin. Bardana, ſive Lappa major Dod. ♀

Lappa minor, Xanthium Dioſcoridis B. pin. Xanthium Fuchſ. ♀

Larix Dod.

Laſerpitium Gallicum B. pin. è regione Maſſiliæ repertum Ad. Lob. ☉

Laſerpitium alterum. ♃ ☉

* Laſerpitium fol. Lobatis auguſtis. ♃ ☉

* Laſerpitium fol. Lobatis latioribus ſem. criſpo, coſtus amara ſem. criſpo J. B. ☉

Lathy-

Lathyris major B. pin. Cataputia vulgaris hort. Eyſt. ♀

Lathyrus ſativus flore fructúque albo B. pin. Aracus .ſ. Cicera Dod. Idem flore purpureo. ♀

Lathyrus ſylveſtris minor B. pin. Catanance Dodonæi hiſt. Lugd. ♀

Lathyrus latifolius B. pin. Clymenum Matthioli Cluſ. ☉

Lathyrus latifolius annuus ſiliquâ hirſutâ. ♂ ♀

Lathyrus ſylveſtris luteus foliis viciæ B. pin. Legumen terræ glandibus ſimile Dod. ☉

Lathyrus arvenſis repens tuberoſus B. pin. Terræ glandes Dod. ☉

Lathyrus flore obſoleto, ſiliquâ piſi minoris. ♂ ♀

Lathyrus Bæticus flore luteo Park. ♀

* Lathyrus Narbonenſis anguſtifol. major J. B. ☉

* Lathyrus anguſtifol. Bæticus elegans ſiliquis Orobi Park. ♀

* Lathyrus πολύλοβος, ſiliquâ breviori, fol. tenuiori, flore rubro. J. B. ♀

* Lathyrus πολύλοβος, ſiliquâ piſi minoris flore rubro. ♂ ♀

* La-

* Lathyrus λεπτόλοβος, ſem. hexedro, flore cœruleo. ♃ ♀
* Lathyrus λεπτόλοβος, ſem. rotundo, flore rubello. ♃ ♀

Lavandula latifolia B. pin. Nardus Italica Matth. ed. B. ☉
Lavandula anguſtifolia B. pin. altera Dod. Eadem flore albo quæ Lavandula alba Icon. Lob. ☉
Lavandula folio diſſecto B. pin. Lavendula multifido folio Cluſ. ♀

Laureola Dod. ſempervirens flore viridi, quibuſdam Laureola mas B. pin. ☉
Laureola folio deciduo, flore purpureo B. pin. Mezereum Germanicum Obſ. Lob. Idem flore albo B. pin. deſcr. ☉

Laurus vulgaris B. pin. Laurus Matth. ed. B.
Laurus tinus cœruleâ baccâ Icon. Lob. ſylveſtris Corni fœminæ foliis ſubhirſutis B. pin,
* Laurus Indica hort. Ferneſiani.
Laurus Alexandrina fructu pediculo inſidente B. pin. Hippogloſſum Dod. ☉

Laurus

Laurus Alexandrina fructu folio insidente B. pin. Alexandrina vera hist. Lugd. ☉
Laurus Alexandrina fructu longis pediculis caulibus alligato. ♄ ☉

Lenticula palustris quadrifolia B. pin. Lemna Theophrasti hist. Lugd. ♀

Lens vulgaris B. pin. minor Dod. ♀
Lens major Tab. B. pin. ♀

Lentiscus Dod. vulgaris B. pin.

Leontopetalon Dod. ☉

Lepidium Plinii Dod latifolium B. pin. ☉
Lepidium annuum Lobelii hist. Lugd. glastifolium B. pin. ♀
Lepidium, Dentellaria dictum B. pin. Plumbago quorundam Clus. ☉

Leucoium bulbosum vulgare B. pin. bulbosum hexaphyllum Dod. ☉
Leucoium bulbosum trifolium minus B. pin. bulbosum triphyllum Dod. ☉
Leucoium incanum majus B pin. candidum majus Dod. ☉

Leucoium purpureum vel rubrum B. pin. flore rubro ſimplici hort. Eyſt. Idem, quod violaceum Tab. ☉

Leucoium incanum majus variegatum ſimplici flore B. pin. ☉

Leucoium incanum majus multiplex B. pin. flore pleno albo, rubro pleno hort. Eyſt. Idem flore pleno violaceo. ☉

Leucoium incanum majus variegatum pleno flore B. pin. purpureum variegatum flore pleno hort. Eyſt. ☉

Leucoium maritimum ſinuato folio B. pin. marinum majus Cluſ. ☉

Leucoium maritimum anguſtifolium B. pin. marinum minus Cluſ. ☉

Leucoium alyſſoïdes clypeatum majus B. pin. Alyſſon Dioſcoridis Dod. ♃

Leucoium incanum ſiliquis rotundis B. pin. marinum Patavinum Obſ. & Icon. Lob. Eruca peregrina Cluſ. ☉

Leucoium album odoratiſſimum folio viridi B. prodr. ☉

Leucoium luteum magno flore B. pin. flos Keiri ſimplex medius hort. Eyſt. ☉

Leucoium luteum vulgare B. pin. luteum Dod. ☉

Leucoium luteum ſylveſtre anguſtifolium B. pin. ſylveſtre Cluſ. ⊙
Leucoium flore luteo pleno majus hort. Eyſt. B. pin.
Idem flore pleno variegato. ⊙
Leucoium flore luteo pleno minus hort. Eyſt. ⊙
*Leucoium montanum flore pedato Col. ⊙

Libanotis latifolia altera .ſ. vulgatior B. pin. Seſeli Æthiopicum herba Dod. ⊙
Libanotis latifolia Aquilegiæ folio B. prodr. ⊙
Libanotis Ferulæ folio, ſemine anguloſo B. pin. Cachrys verior, Libanotis Galeno Obſ. Lob. ⊙
Libanotis Ferulæ folio & ſemine B. pin. Panaces Aſclepium Dod. ⊙

Liguſticum vulgare, An Libanotis fertilis Theophraſti B. pin. Leviſticum vulgare Dod. ⊙
Liguſticum, quod Seſeli officinarum B. pin. Siler montanum Dod. ⊙
Liguſticum .ſ. Siler montanum anguſtifolium B. prodr. ⊙

Liguſtrum Matth. ed. B. Germanicum B. pin.

Liguſtrum foliis laciniatis B. pin. nigrum Proſp. Alp. de exot. Agem Lilag Perſarum Cornuti.

Lilium candidum Dod. album flore erecto & vulgare B. pin.

Lilium album inodorum flore pleno. ⊙

Lilium purpurocroceum majus B. pin. Hemerocallis Matth. ed. B. ⊙

Lilium floribus reflexis montanum B. pin. montanum flore purpuraſcente punctatum hort. Eyſt. ⊙

Lilium floribus reflexis alterum lanugine hirſutum B. pin. flore purpuraſcente non punctatum hort. Eyſt. ⊙

Lilium floribus reflexis albis non punctatis B. pin. montanum minus album non punctatum hort. Eyſt. ⊙

Lilium purpuro-ſanguineum flore reflexo B. pin. Hemerocallis Chalcedonica purpuro-ſanguinea polyanthos Obſ. Lob. ⊙

Lilium flavum anguſtifolium B. pin. montanum flavo flore Lobel. Ad. part 2ª. ⊙

Lilium ſ. Corona imperialis B. pin. Corona imperialis Dod. ⊙

Li-

Lilium .ſ. Corona imperialis flore luteo B. pin. deſcr. & Cluſ. deſcr. ⊙

Lilium .ſ. Corona imperialis duplici coronâ B. pin. Corona imperialis florum claſſe duplici hort. Eyſt. ⊙

* Lilium .ſ. Corona imperialis fol. vario ♃ ⊙

Lilium Perſicum Dod. ⊙

Lilium luteum Aſphodeli radice B. pin. Liliaſphodelus luteo flore Cluſ. ⊙ Anguſtifolius flore luteo.

Lilium rubrum Aſphodeli radice B. pin. Liliaſphodelus puniceus Cluſ. deſcr. ⊙

* Liliaſphodelus latifolius flore luteo. ♃ ⊙

* Lilium .ſ. Martagon Canadenſe. ♃ ⊙

Lilionarciſſus Indicus Bapt. Ferr. ⊙

Lilium convallium Matth. ed B. album B. pin. ⊙

Lilium convallium flore rubente B. pin. flore ſuaverubente Icon. Lob. ⊙

Lilium convallium minus B. pin. Monophyllon Matth. ed. B. ⊙

Limonium Matth. ed. B. maritimum majus B. pin. ⊙

Limonium parvum Bellidis minoris folio B. pin. pumilum Cluſ. deſcr. ☉

Limonium Rauwolfii .ſ. peregrinum Cluſ. cur. poſt. peregrinum foliis Aſplenii B. pin. ♆

Linaria latifolia Dalmatica magno flore B. prodr. ♆

Linaria Bellidis folio B. prodr. purpurea odorata Obſ. & Icon. Lob. ☉

Linaria ſcoparia B. pin. Oſyris Dod. ♆

Linaria vulgaris lutea flore majore B. pin. prima Dod. ☉

Linaria lutea flore minimo B. pin. ♆

Linaria aurea Tragi Obſ. & Icon. Lob. folioſo capitulo luteo major B. pin. ☉

Linaria folioſo capitulo luteo minor B. pin. aurea minor Tab. ☉

Linaria purpurea major odorata B. pin. altera purpurea Dod. ☉

Linaria arvenſis cœrulea erecta B. prodr. ♆

Linaria montana floſculis albicantibus B. pin. Anthyllis montana hiſt. Lugd. ☉

Linaria quadrifolia lutea B. pin. tetraphylla lutea Col. ♆

Linaria cœrulea repens B. pin. Oſyris purpurocœrulea

purocœrulea repens Icon. Lob. Eadem flore albo. ☉

Linaria minima hirſuta flore obſoleto. ♃ ♀

Linaria minor cœrulea recta Park. ♀

* Linaria minor viſcoſa flore luteo. ♃ ♀

* Linaria Armoriaca flore ſaturate violaceo. ♃ ♀

* Linaria major anguſtifolia glabra flore luteo maj. ♃ ♀

Lingua cervina officinarum B. pin. Phyllitis Dod. ☉

Lingua cervina multifido folio B. pin. Phillitis laciniata Dod. ☉

Linum ſativum Dod. B. pin. ♀

Linum ſylveſtre luteum foliis ſubrotundis B. pin. Campanula lutea linifolia Penæ hiſt. Lugd. ☉

Linum maritimum luteum B. pin. marinum luteum Narbonenſe Obſ. & Icon. Lob. ☉

Linum ſylveſtre anguſtifolium floribus dilutè purpuraſcentibus, vel carneis B. pin. ſylveſtre ſextum anguſtifolium Cluſ. deſcr. ☉

Linum ſylveſtre minus B. pin. Chamælinum

.ſ. Linum ſylveſtre perpuſillum Obſ. & Icon. Lob. ♆

Linum pratenſe floſculis exiguis B. pin. ſylveſtre catharticum Ger. Linocarpos Thal. ♆

* Linum annuum luteum folio latiore. ♃ ♆

* Linum annuum luteum folio anguſtiore. ♃ ♆

* Linum perenne cœruleum ſativo æmulum. ♃ ☉

* Linum minimum ſtellatum B. prodr. ♆

Lithoſpermum arundinaceum Dal. hiſt. Lugd. arundinaceum forte Dioſcoridis & Plinii B. pin. ♆

Lithoſpermum majus erectum B. pin. minus Dod. ☉

Lithoſpermum minus repens latifolium B. pin repens majus Cluſ. ☉

Lithoſpermum arvenſe radice rubra B pin. nigrum Dal. hiſt. Lugd. ♆

Lithoſpermum Linariæ folio Germanicum B. pin. Linaria altera botryoïdes montana Col. ♆

Lonchitis aſpera Dod. minor B. pin. ☉

Lotus hortenſis odora B. pin. Trifolium odoratum alterum ſ. Lotus ſativa Dod. ♃

Lotus ſ. Melilotus pentaphyllos minor glabra B. pin. Trifolium corniculatum primum Dod. ☉

Lotus pentaphyllos minor hirſutus ſiliquâ anguſtiſſimâ B. pin. Trifolium corniculatum minus piloſum ejuſdem prodr. deſcr. ☉

Lotus pentaphyllos ſiliquoſus villoſus B. pin. hæmorrhoïdalis major ſ. Trifolium hæmorrhoïdale majus Park. ☉

Lotus ſiliquoſus glaber flore rotundo B. pin. Lybica Dal. hiſt. Lugd. ☉

Lotus fruticoſus incanus ſiliquoſus B. pin. aſperior fruticoſa ſ. Narbonenſis incana Obſ. & Icon. Lob. ☉

Lotus pratenſis ſiliquoſus luteus B. pin. trifolia pratenſis ſiliquoſa Monſpelienſium Icon. Lob. ☉

Lotus ruber ſiliquâ angulosâ B. pin. tetragonolobus Camerarii hort. Eyſt. ♃

Lotus ſiliquis Ornithopodii B. pin. peculiaris ſiliquis Ornithopodii Cam. ♃

Lotus

Lotus pentaphyllos veſicaria B. pin. Trifolium halicacabum Cam. ♃

* Lotus ſiliquis ſingularibus, binis Terniſ… J. B. ♃

Loto affinis vulneraria pratenſis B. pin. Anthyllis leguminoſa Belgarum Obſ. & Icon. Lob. ☉

Loto affinis hirſuta flore ſubrubente B. pin. Anthyllis leguminoſa purpuraſcente flore Cluſ. deſcr. ☉

Lotus arbor Obſ. Lob. Lotus fructu Ceraſ… B. pin.

Lotus latifolia Africana B. pin. Guajacum Patavinum Obſ. & Icon. Lob.

Lupinus ſativus Dod. ſativus flore albo B. pin. ♃

Lupinus ſylveſtris flore cœruleo B. pin. ſylveſtris Dod. ♃

Lupinus flavo flore Cluſ. ſylveſtris flore luteo B. pin. ♃

Lupinus Indicus Cornuti peregrinus major vel villoſus cœruleus major B. pin. Sativus major hort. Eyſt. ♃

* Lupinus medius cœruleus Park. ♃

Lupulus

Lupulus Dod. Lupulus mas B. pin. ☉

Luteola Obſ. & Icon. Lob. Luteola herba ſalicis folio B. pin. ♀

Lychnis hirſuta flore coccineo major B. pin. Flos Conſtantinopolitanus miniatus hort. Eyſt. Eadem quæ
Flos Conſtantinopolitanus incarnatus hort. Eyſt.
Flos Conſtantinopolitanus albus hort. Eyſt. ☉

Lychnis Chalcedonica flore pleno miniato. ☉

Lychnis coronaria Dod. coronaria flore rubro ſimplici hort. Eyſt. coronaria Dioſcoridis ſativa B. pin. ☉

Lychnis coronaria flore albo ſimplici hort. Eyſt. ☉

Lychnis coronaria flore incarnato punctato hort. Eyſt. ☉

Lychnis coronaria flore rubro pleno hort. Eyſt. ☉

Lychnis ſylveſtris alba ~~multiplex~~ Nim B. pin. Ocimoïdes majus Matthioli hiſt. Lugd. ☉

Lychnis ſylveſtris alba multiplex B. pin.

ſylveſtris flore pleno albo hort. Eyſt.

Lychnis ſylveſtris, ſeu aquatica purpur
ſimplex B. pin. ſylveſtris rubello flo
Obſ. Lob. ☉

Lychnis ſegetum major B. pin. Pſeudon
lanthium Matth. ed. B. ♀

Lychnis ſegetum rubra foliis Perfoliata
pin. Vaccaria Dod. Eadem flore albo

Lychnis ſylveſtris quæ Been album vulg
B. pin. Behen album, ſ. Polemonium Do
☉

* Lychnis, Papaver ſpumeum anguſtifo
lium glabrum flore purpureo. ♂ ☉

* Lychnis Papaver ſpumeum latifoliu
vulgare hirſutum. ♂ ☉

Lychnis ſylveſtris latifolia calyculis turg
dis ſtriatis B. pin. ſylveſtris ſecunda Clu
Eadem flore albo. ♀

Lychnis noctiflora B. pin. Ocimoïdes n
ctiflora Cam. Ocimaſtrum noctiflor
flore albo hort. Eyſt. ☉

Lychnis maritima repens B. pin. marina An
glica Ad. Et Icon. Lob. ☉

Lychnis montana viſcoſa alba latifolia
pin. ſylveſtris nona Cluſ. ☉

Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra angu
foli

ſolia B. pin. viſcoſa ſylveſtris flore incarnato hort. Eyſt. ♃

Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra altera B. pin. ſylveſtris tertia Cluſ. ♃

Lychnis viſcoſa purpurea latifolia lævis B. pin. Muſcipula flore rubro hort. Eyſt. Eadem flore albo, quæ

Muſcipula flore albo hort. Eyſt. ♃

Lychnis viſcoſa flore muſcoſo B. pin. Seſamoïdes magnum Salmanticum Cluſ. ☉

Lychnis plumaria Tab. ☉

Lychnis ſylveſtris lanuginoſa minor B. pin. ſylveſtris hirta minima Obſ. & Icon. Lob. ♃

Lychnis, vel Ocimoïdes repens montanum B. pin. Ocimoïdes repens Polygoni folio Ad. Lob. ☉

Lychnis Alpina glabra Caryophylli holoſtii flore. ♂ ☉

Lychnis viſcoſa minor ſaxatilis. ♂ ☉

Lychnis Alpina pumila folio gramineo .ſ. Muſcus Alpinus Lychnidis flore B. pin. Ocimoïdes muſcoſus Ponæ deſcr. mont. Bald. ☉

* Lychnis flore muſcoſo capillaceo. ♂ ♃

* Lychnis maritima repens ſtrictiſſimis foliis. ♂ ☉

* Lychnis minor Alpina glabra foliis l
gis, an Caryophylli minima ſpecies fl
albo J. B. ☉
* Lychnis minor Alpina hirſuta petalis n
bifidis latiori fol. ♃ ☉
* Lychnis minor Alpina hirſuta petalis n
bifidis juniperinis fol. .ſ. auricula m
ris pulchro flore, fol. tenuiſſimo J. B.

Lycium facie Pruni ſylveſtris .ſ. Italicum
pin. Spina infectoria pumila ſecun
Cluſ.

Lycopſis B. pin. altera Anglica Obſ. & Ico
Lob. ♀
Lycopſis Monſpeliaca floribus dilutè pu
pureis. ♀
Lycopſis Monſpeliaca floribus albis. ♃

Lyſimachia lutea Fuchſ. lutea major qu
Dioſcoridis B. pin. ☉
Lyſimachia lutea corniculata B. pin. app.
* Lyſimachia corniculata minor lutea C
nadenſis. ♃ ♀
* Lyſimachia lutea flore globoſo Park
Ger. ☉

Lyſima

Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta magno flore B. pin. purpurea Fuchſ. ☉

Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta parvo flore B. pin. ſiliquoſa ſecunda Tab. ☉

Lyſimachia ſiliquoſa glabra major B. pin. ſiliquoſa Obſ. & Icon. Lob. ☉

Lyſimachia ſiliquoſa glabra minor B. pin. minor Tab. ☉

Lyſimachia Chamænerion dicta latifolia B. pin. Chamænerion hort. Eyſt. Onagra hiſt. Lugd. ☉

Lyſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia B. pin. Pſeudolyſimachium purpureum minus Dod. ☉

Lyſimachia ſpicata purpurea B. pin. purpurea communis major Cluſ. ☉

Lyſimachia purpurea ſpicata lanuginoſa: ♃ ☉

Lyſimachia ſpicata cœrulea B. pin. cœruleo flore Cluſ. ☉

Lyſimachia cœrulea galericulata, vel gratiola cœrulea B. pin. galericulata Obſ. & Icon. Lob. ☉

Lyſimachia galeata minor purpurea. Gratiola latifolia Ger. ☉

M.

MAjorana vulgaris B. pin. Majorana ſ. Marum Dod. ☉

Malva ſylveſtris folio rotundo B. pin. ſylveſtris pumila Dod. ☉

Malva ſylveſtris folio ſinuato B. pin. ſylveſtris procerior Dod. Eadem flore albo. ☉

Malva foliis criſpis B. pin. criſpa Dod. ♀

Malva trimeſtris Cluſ. ♀

Malva folio vario B. prodr. ♀

Malva roſea folio ſubrotundo B. pin. hortenſis flore ſimplici rubro, incarnato, & albo hort. Eyſt. ☉

Malva roſea folio ſubrotundo flore pleno B. pin. hortenſis flore pleno rubro, atrorubente hort. Eyſt. ☉

Malva roſea multiplex flore albo incarnato hort. Eyſt. ☉

Malva hortenſis flore luteo ſimplici. Eadem flore pleno. ☉

Malva roſea folio ficus B. pin. roſea ſimplex peregrina Tab. ☉

Malva Hiſpanica. ♃ ♀ ☉

*Malva Betonicæ folio. ♃ ♀

*Malva marina arborea noſtras Park. ♀

Malus Dod. hiſt. Lugd.

Malus cydonia fructu oblongo; cydonia fœmina Rob. Steph. præd. ruſt.

Malus cydonia fructu rotundo. Cotonea Dod.

Malus medica B. pin. citria malus Cluſ.

Malus Limonia Dod. Limonia acida B. pin.

Malus aurantia Dod. arantia major B. pin.

Malus arantia humilis B. pin. Poma aurantia nana dicta hort. Eyſt.

Malus Adami B pin Aſſyria Dod.

Malus punica Dod. punica ſativa B. pin.

Malus punica flore pleno. Balauſtia hort. Eyſt.

Malus Perſica Dod. Perſica molli carne, & vulgaris & alba B. pin.

Malus Perſica ſucco quaſi ſanguineo B. pin.

Malus Perſica dura carne candida aliquando ex albo ſubrubente B. pin. Perſica duracina alba Tab.

Malus Armenia major hiſt. Lugd. Mala Armeniaca majora B. pin.

Malus Armenia minor hiſt. Lugd. Armeniaca minor B. pin.

Mandragora mas Fuchſ. fructu rotundo B. pin. ☉

Mandragora fœmina Cluſ. fructu pyri B. pin. ☉

Marum, Maſtic Gallorum, & Anglorum Ad. Lob. Sampſuchus, ſ. Marum Maſtichen redolens B. pin. ☉

* Marum Proſp. Alpini. ☉

Marrubium Cardiaca dictum B. pin. Cardiaca Dod. ☉

Marrubium aquatile Dod. paluſtre glabrum B. pin. ☉

Marrubium nigrum fœtidum, Ballote Dioſcoridis B. pin. Ballote ſ. Marrubium nigrum Dod. Idem flore albo. ☉

Marrubium nigrum rotundifolium B. pin. Ocimaſtrum Valentinum Cluſ. ☉

Marrubium nigrum longifolium B. pin. Herba venti, Parietaria Cordi hiſt. Lugd. ☉

Marrubium album vulgare B. pin. album Obſ. & Icon. Lob.

Marrubium album villosum B. prodr. ☉
Marrubium album latifolium peregrinum B. pin. candidum alterum Hispanicum Obs. & Icon. Lob. ☉
* Marrubium aquatile foliis tenuius dissectis. ♃ ☉
* Marrubium album angustifolium peregrinum C. B. P. rectum Dod. Ger. ☉

Matricaria Dod. vulgaris B. pin. ☉
Matricaria flore pleno B. pin. dupliei flore Icon. Lob. ☉
Matricaria maritima B. pin. Parthenium maritimum minimum hist. Lugd. ☉
* Matricaria nuda nobis, bullatis foliis Park. descr. ☉

Melampyrum purpurascente coma B. pin. Melampyrum Triticum vaccinum Obs. & Icon. Lob. ♀
Melampyrum cristatum flore purpureo. J. B. ♀
Melampyrum luteum latifolium B. pin. Crateogonon Obs. & Icon. Lob. ♀
Melampyrum perpusillum luteum Ad. Lob. luteum minimum B. pin. ♀ Vide Ranunculus.

Melilotus officinarum Germaniæ B. pin. Germanica Obſ. & Icon. Lob. ♃
Melilotus procera ſiliquis longioribus. An meliloti tertium genus Dod. deſcr. ♃
Melilotus major candida Tragi B. pin. ♃
Melilotus Italica folliculis rotundis B. pin. Italica Cam. ♃

Meliſſa Dod. hortenſis B. pin. ☉
* Meliſſa Romana hirſutior. ♋ ☉
Meliſſa peregrina folio oblongo B. pin. Moldavica flore cœruleo, albo hort. Eyſt. ♃
Meliſſa Moluccana odorata B. pin. Conſtantinopolitana Matth. ed. B. ♃
* Meliſſa Moluccana ſpinoſior Lob. Ad. ♃
Meliſſa Bætica. ♋ ♃

Melo hiſt. Lugd. vulgaris B. pin. ♃
Melo rotundus parvus B. pin. ſaccharatus Icon. Lob. ♃

Melopepo clypeiformis B. pin. Cucurbita laciniata hiſt. Lugd. ♃
Melopepo compreſſus B. pin. compreſſus alter Tab. ♃

Mentha

Mentha hortenſis corymbifera B. pin. Coſtus hortenſis hiſt. Lugd. ☉

Mentha hortenſis verticillata Ocimi odore B. pin. Romana anguſtifolia .ſ. Mentha cardiaca Ad. & Icon. Lob. ☉

Mentha criſpa verticillata B. pin. ſativa Dodonæi prima hiſt. Lugd. ☉

Mentha rotundifolia criſpa ſpicata B. pin. altera Dod. ☉

Mentha criſpa Danica, aut Germanica ſpecioſa Park. ☉

Mentha rotundifolia ſpicata altera B. pin. Siſymbrium hortenſe Matth. ed. B. ☉

Mentha ſpicata folio variegato B. pin. Menthaſtrum niveum Anglicum Penæ & Lobelii hiſt. Lugd. ☉

Mentha ſylveſtris longiore folio B. pin. Menthraſtum Dod. ☉

Mentha montana verticillata B. pin. Menthaſtrum ſecundum montanum Cluſ. ☉

Mentha tuberoſâ radice B. pin. Menthaſtrum tertium tuberoſâ radice Cluſ. ☉

* Menthaſtrum tuberoſâ radice flore violaceo majus. ♃ ☉

* Menthaſtrum tuberoſâ radice flore violaceo minus. ♃ ☉

Menthaſtrum glabrum floribus violaceis ♃ ☉

Mentha rotundifolia paluſtris .ſ. aquatica major B. pin. Siſymbrium Dod. ☉

Mentha cataria vulgaris & major B. pin. Cattaria herba Dod. ☉

Mentha cataria minor B. prodr. ☉

* Mentha cataria folio longiori Dod. ☉

* Mentha cataria media tenuifolia Hiſpanica Cluſ. ☉

Mercurialis mas Dod. teſticulata .ſ. mas Dioſcoridis & Plinii B. pin. ♆

Mercurialis fœmina Dod. ſpicata .ſ. fœmina Dioſcoridis & Plinii B. pin. ♆

Mercurialis montana teſticulata B. pin. Cynocrambe, Mercurialis ſylveſtris Dod. ☉

Mercurialis montana ſpicata B. pin. Cynocrambe fœmina Matth. ed. B. ☉

Meſpilus Dod. Germanica folio laurino non ſerrato B. pin.

Meſpilus aronia Dod. Apii folio laciniato B. pin.

Meſpilus Apii folio ſylveſtris ſpinoſa .ſ. Oxyacantha B. pin. Spina acuta Dod.

Meum

Meum Dod. foliis Anethi B. pin. ☉

Meum adulterinum Matth. ed. B. latifolium adulterinum B. pin. ☉

Milium Dod. ſemine albo B. pin. ♀

Milium ſemine luteo B. pin. ♀

Milium ſemine nigro B. pin. nigrum Dod. ♀

Milium arundinaceum ſubrotundo ſemine Sorgo nominatum B. pin. Melica ſ. Sorgum Dod. ♀

Millefolium vulgare album B. pin. militaris ſ. Millefolium terreſtre vulgare Obſ. Lob. ☉

Millefolium vulgare purpureum minus B. pin. terreſtre purpureis floribus Obſ. & Icon. Lob. ☉

Millefolium rubro flore Cluſ. purpureum majus B. pin. ☉

Millefolium odoratum minus Monſpelienſium. ♃ ☉

Millefolium album foliis minus diſſectis. ♃ ☉

Millefolium tomentoſum luteum B. pin. luteum Obſ. Lob. ☉

* Millefolium Taneceti foliis flore purpureo. ♃ ☉

* Milleſolium Tanaceti foliis flore albo. ♃ ☉

Mollugo Dod. montana anguſtifolia, vel Gallium album latifolium B. pin. ☉

Moly latifolium lilifiorum B. pin. Moly Theophraſti Cluſ. Idem flore albo. ☉
Moly latifolium Indicum B. pin. Indicum Cluſ. ☉
Moly montanum latifolium flavo flore Cluſ. hiſt. app. alt. latifolium luteum odore Allii primum B. pin. ☉
Moly Dioſcoridis Cluſ. anguſtifolium umbellatum B. pin. ☉
Moly moſchatum capillaceo folio B. pin. & prodr. ☉
* Moly Indicum Dod. caucaphon vocatum Lob.

Morus Dod. fructu nigro B. pin.
Morus candida Dod. fructu albo B. pin.

Myagrum ſiliquâ longâ B. pin. alterum Thlaſpi effigie Obſ. Lob. ♀
Myagrum ſativum Matth. ed. B. ejuſdem pin. ♀ * Mya-

* Myagrum ſylveſtre minus B. pin. ♆
Myagrum monoſpermon latifolium B. pin. & prodr. ♆
Myagro ſimilis ſiliquâ rotundâ B. prodr. ♆
Myrrhis Dod. major, vel Cicutaria odorata B. pin. ☉
Myrrhis ſylveſtris ſeminibus lævibus B. pin. Myrrhis Fuchſ. hiſt. Lugd. ☉
* Myrrhis perennis alba fol. hirſutis. ♃ ☉
* Myrrhis perennis alba foliis hirſutioribus. ♃ ☉
* Myrrhis perennis alba foliis hirſutiſſimis. ♃ ☉
* Myrrhis perennis lutea Daucoïdes. ♃ ♆
* Myrrhis annua nodoſa ſemine aſpero. ♃ ♆
Myrrhis ſylveſtris ſeminibus aſperis B. pin. ſylveſtris nova Æquicclorum Col. ♆
Myrtus latifolia Romana B. pin. Romana Matth. ed. B. ☉
Myrtus flore pleno Cornuti. ☉
Myrtus minor vulgaris B. pin. Tarentina hiſt. Lugd. ☉
* Myrtus latifolia maxima Park. Cluſii hiſt. fol. confertim naſcentibus Laurinis.

N.

NAPUS Dod. ſativa B. pin. ♀

Narciſſus mediopurpureus Dod. albus circulo purpureo B. pin. ⊙

Narciſſus Orientalis medius totus albus polyanthos hort. Eyſt. Orientalis medius albus B. pin. ⊙

Narciſſus totus albus major B. pin. Orientalis polyanthos minor totus albus hort. Eyſt. ⊙

Narciſſus medioluteus Dod. pallidus circulo luteo B. pin. ⊙

Narciſſus medioluteus Donas Narbonenſium Icon. Lob. medioluteus copioſo flore odore gravi B. pin. ⊙

Narciſſus de Argiers polyanthos totus luteus hort. Eyſt. luteus polyanthos Luſitanicus B. pin. ⊙

Narciſſus latifolius flore prorſus flavo Cluſ. luteus Conſtantinopolitanus B. pin. ⊙

Narciſſus anguſtifolius flavus magno calice B. pin. juncifolius primus amplo calice Cluſ. ⊙

Narciſſus juncifolius major Dod juncifolius oblongo calice luteus major B. pin. ⊙

Narciſſus juncifolius flore rotundo roſeo B. pin. juncifolius flore rotundo circinato Swert. ⊙

Narciſſus maximus pallidus amplo calice flavo Cluſ. cur. poſt. deſcr. latifolius pallidus calice amplo alter B. pin. ⊙

Narciſſus latifolius ſulphureus, vel albus brevi calice B. pin. ſulphurei coloris brevi calice Swert. ⊙

Narciſſus luteus ſylveſtris Dod. ſylveſtris pallidus calice luteo B. pin. ⊙

Narciſſus major totus luteus calice prælongo B. pin. Pſeudonarciſſus major Hiſpanicus Cluſ. ⊙

Narciſſus totus luteus florum foliis reflexis B. pin. totus luteus oblongo calice, & reflexis foliis hort. Eyſt. ⊙

Narciſſus oblongâ tubâ totus albus Swert. albus oblongo calice B. pin. ⊙

Narciſſus montanus alter flore fimbriato B. pin. montanus juncifolius minimus alter flore luteo fimbriato Mutoni Icon. Lob. ⊙

Narciſſus nobilis Orientalis polyanth
mixtus hort. Eyſt. Orientalis flore mu
tiplici, & pleno albo luteo B. pin. ⊙
Narciſſus incomparabilis flore pleno parti
flavo, partim croceo. ⊙
Narciſſus exoticus .ſ. Conſtantinopolitan
Cam. major flore multiplici hort. Eyſ
latifolius albus medioluteus B. pin. ⊙
Narciſſus totus niveus multiplex B. pi
albus pleno flore Swert. ⊙
Narciſſus ſylveſtris ſtellatus hort. Eyſt. ſy
veſtris multiplex calice carens B. pin. ⊙
Narciſſus Septentrionalis flore pleno lute
hort. Eyſt. flore pleno variegato B. pin. ⊙
Narciſſus juncifolius luteus flore plen
hort. Eyſt. juncifolius aureus multiple
Anemones formâ B. pin. ⊙
Narciſſus maritimus B. pin. Pancratium hi
Lugd. ⊙
Narciſſus Conſtantinopolitanus tertius Ma
ed. B. Illyricus Liliaceus B. pin. ⊙
* Narciſſus Indicus puniceus gemino lat
ore folio Bap. Ferr. ⊙
* Narciſſus Indicus ſphæricus flore Lili
ceo Bap. Ferr.

Nardu

Nardus montana radice olivari B. pin. montana Matth. ed. B. ☉

Nardus montana radice oblongâ B. pin. montana altera Matth. ed. B. ☉

Naſturtium hortenſe vulgatum B. pin. hortenſe Dod. ♀

Naſturtium hortenſe criſpum B. prodr. ♀

Naſturtium pratenſe magno flore B. pin. Cardamine altera ſimplici flore Cluſ. ☉

Naſturtium pratenſe flore pleno B. pin. Cardamine altera flore pleno Cluſ. ☉

Naſturtium pratenſe floſculis minimis. ♃ ♀

Naſturtium aquaticum ſupinum B. pin. aquaticum Dod. ☉

Naſturtium aquaticum minus B. pin. Cardamine quarta Dal. hiſt. Lugd. ☉

Naſturtium Alpinum trifolium B. pin. Cardamine Alpina trifolia Cluſ. ☉

Naſturtium Alpinum Bellidis folio minus B. pin. Plantula Cardamines alterius æmula Cluſ. ☉

Naſturtium ſylveſtre tenuiſſimè diviſum B. pin. Sophia Chirurgorum Obſ. & Icon. Lob. ♀

Naſturtium Indicum Dod. Indicum majus B. pin. ♀

* Naſturtium hortenſe latifolium prodr. ♀
* Naſturtium Alpinum inſipidum Ge Tab. Cardamine Alpina inſipida Col.
* Naſturtium ſylveſtre minus B. prodr.

Nerion floribus rubeſcentibus B. pin. flo rubro hort. Eyſt.
Nerion floribus albis B. pin. Nerion .ſ. Rho dodendron flore albo hort. Eyſt.

Nicotiana major latifolia B. pin. Nicotian .ſ. Tabacum hiſt. Lugd. ♀
Nicotiana major anguſtifolia hort. Eyſt. B pin. ♀
Nicotiana minor B. pin. minor .ſ. Hyoſcya mus luteus hort. Eyſt. ♀

Nigella arvenſis cornuta B. pin. Melanthi um ſylveſtre Dod. ♀
Nigella latifolia flore majore ſimplici cœ ruleo B. pin. Melanthium Hiſpanicum majus hort. Eyſt. ♀
Nigella flore majore pleno cœruleo B. pin. Melanthium Damaſcenum flore pleno hort. Eyſt. ♀

Nigella

Nigella flore minore pleno & albo B. pin. citrina Ad. Lob. descr. Eadem flore simplici semine nigro. ♃

* Nigella sylvestris flore luteo pallido. ♃

Nummularia Dod. major lutea B. pin. ☉

Nummularia flore purpurascente B. prodr. ☉

Nux juglans Dod. Nux juglans s. Regia vulgaris B. pin.

* Nux juglans putamine fragili & fructu tenero C. B. P.

* Nymphæa maj. alba C. B. Pin. alba Matth. Dod. candida Fuchs.

* Nymphæa maj. lutea C. B. P. lutea Dod. Fuchs.

* Nymphæa minima alba C. B. P. morsus Ranæ Dod. Lob. Icon.

O.

O.

OChrus folio integro capreolos emittente B. pin. Ervilia ſylveſtris Dod. ♀

Ocimum caryophyllatum maximum B. pin. latifolium magnum hort. Eyſt. ♀

Ocimum Citri odore B. pin. Citratum .ſ. Citri odore hort. Eyſt. ♀

Ocymum vulgatius B. pin. Baſilicum .ſ. Ocimum medium vulgatius hort. Eyſt. ♀

Ocimum medium foliis ex nigro vireſcentibus flore albo & violaceo. ♀

Ocimum Aniſi odore B. pin. hort. Eyſt. ♀

Ocimum minimum B. pin. minimum caryophyllatum hort Eyſt. ♀

Ocimum minimum foliis rubeſcentibus. ♃ ♀

* Ocimum rubrum pleno flore. ♃ ♀

Oenanthe Apii folio B. pin. ſecunda Matth. ed. B. hiſt. Lugd. ☉

Oenanthe anguſtifolia Obſ. & Icon. Lob. ☉

Oenanthe

Oenanthe aquatica B. pin. Juncus odoratus aquatilis Dod. ☉

* Oenanthe Chærophylli foliis C. B. P. Cicutæ facie Ad. Lob. Succo viroſo cicutæ facie Lobelio J. B. ☉

Olea Dod. ſativa B. pin.

Olea ſylveſtris folio duro ſubtus incano B. pin. ſylveſtris Cluſ.

Olea Bohemica ſ. Elæagnos Matth. ed. B. ſylveſtris folio molli incano B. pin.

Onobrychis Dod. foliis Viciæ, fructu echinato major B. pin. Caput gallinaceum Belgarum Obſ. & Icon. Lob. ☉

Onobrychis fructu echinato minor B. pin. Caput gallinaceum minus ejuſdem prod. deſcr. ♃

* Onobrychis flore ſaturate rubro. ☉

Onobrychis ſemine clypeato aſpero major B. pin. Hedyſarum clypeatum flore ſuaviter rubente hort. Eyſt. ♀

Onobrychis arvenſis, vel Campanula arvenſis erecta B. pin. Viola pentagonia, Pentagonium Tab. ♀

* Onobrychis viola pentagonia perfoliata. ♃ ♀

* Onobrychis viola pentagonia latiori folio oblongo. ♃ ♀

Ophioglossum Dod. vulgatum B. pin. ☉

Ophrys Plin. Ophris Fuchs. bifolia B. pin. ☉

Orchis morio mas foliis maculatis B. pin. Testiculus morionis mas Dod. ☉

Orchis morio fœmina B. pin. Testiculus morionis fœmina Dod. Eadem flore roseo & albo. ☉

Orchis flore simiam referens B. pin. altera oreades cercopithecophora Col. ☉

Orchis odore hirci longiore, angustioréque folio B. pin. saurodes, vel scincophora lacertarum æmulatione Gemmæ Obs. & Icon. Lob. ☉

Orchis hermaphroditica secunda Gemmæ s. psychodes diphylla Obs. & Icon. Lob. bifolia altera B. pin. ☉

Orchis hermaphroditica flore flavescente. Forte, Serapias batrachites vel myodes Icon. Lob. ☉

Orchis s. Testiculus minor violaceis floribus Cord. fucum referens major foliolis superioribus

perioribus candidis & purpuraſcentibus B. pin. ⊙

Orchis melitias, ſ. Apis cadaverulum exprimens Obſ. & Icon. Lob. fucum referens flore ſubvirente B. pin. ⊙

Orchis muſcæ corpus referens minor, vel galeâ & alis herbidis B. pin. Orchis Serapias tertius Dod. ⊙

Orchis ornithopora, vel ornithes folio lævi Obſ. & Icon. Lob. papilionem expanſum herbacei coloris referens B. pin. ⊙

Orchis ſpiralis major. Tetrorchis, vel Triorchis alba Gemmæ hiſt. Lugd. Triorchis, vel Tetrorchis alba odorata major B. pin. ⊙

Orchis ſpiralis minor ſ. Teſticulus odoratus Obſ. & Icon. Lob. Triorchis alba odorata minor B. pin. ⊙

Orchis palmata pratenſis latifolia longis calcaribus B. pin. Satyrium baſilicum mas Dod. ⊙

Orchis palmata pratenſis maculata B. pin. Satyrium baſilicum fœmina Dod. Eadem flore candido Dod. deſcr. ⊙

Orchis palmata minor calcaribus oblongis B. pin. Palma Chriſti minor mas Tab. Eadem flore albo. ⊙

Orchis palmata paluſtris latifolia B. pin. Satyrium baſilicum folioſum Dod. ☉

* Orchis hermaphroditica flore luteo pallido. ☉

* Orchis palmata flore Fuſco. ♃ ☉

Origanum ſylveſtre .f. vulgare Dod. ſylveſtre, Cunila bubula Plinii B. pin. Idem flore albo, quod

Origanum album Tab. ſylveſtre album B. pin. ☉

Origanum heracleoticum Matth. ed. B. hiſt. Lugd. heracleoticum, Cunila gallinacea Plinii B. pin. Idem flore albo. ☉

Origanum fiſtuloſum Canadenſe Cornuti. ☉

Origano cognata Zatarendi B. pin. Zatarhendi. Origanum Indicum Veſl. Obſ. in Proſp. Alp. ☉

* Origanum ſylveſtre humile B. prodr. ☉

Ornithogalum umbellatum medium anguſtifolium B. pin. Bulbus leucanthemus minor .f. Ornithogalum Dod. ☉

Ornithogalum anguſtifolium majus floribus ex albo vireſcentibus B. pin. Aſphodelus bulboſus Galeni Dod. ☉

Ornithogalum

Ornithogalum ſpicatum flore viridi lacteſcente B. pin, pannonicum albo flore Cluſ. ⊙

Ornithogalum Neapolitanum Cluſ.app.alt. exoticum magno flore, minore innato B. pin. ⊙

* Ornithogalum Arrabicum Cluſ. Eyſt. ⊙

Ornithogalum anguſtifolium bulbiferum B. pin. anguſtifolium campeſtre luteum minimum bulbiferum Col. ⊙

Ornithopodium Dod. majus B. pin. ☿

* Ornithopodium αἰγοκέρατον nobis, ſcorpioïdes leguminoſa Lob. ☿

* Ornithopodium δικέρατον minus nobis, ſcorpioïdes altera leguminoſa J. B. ☿

* Orobanche planta clandeſtina Lugd. app. ⊙

* Orobanche radice dentata maj C. B. P. Dentaria ἄφυλλος ⅔ Cluſ. ⊙

* Orobanche radice dentata minor C.B.P. Dentaria ἄφυλλος ⅔ Cluſ. ⊙

Orobus ſiliquis articulatis ſemine majore B. pin, receptus herbariorum Obſ. & Icon. Lob. ☿

Orobus pannonicus primus Cluſ. Sylvaticus purpureus vernus B. pin. ☉

Orobus ſylvaticus foliis Viciæ B. pin. Aſtragaloides altera herbariorum Icon. Lob. ☉

Oxyacantha Dioſcoridis .ſ. Spina acuta pyri folio B. pin. Pyracantha Ad. Lob.

P.

PÆONIA mas Dod. folio nucis Cæſ. hort. folio nigricante ſplendido quæ mas B. pin. ☉

Pæonia communis vel fœmina B. pin. rubra flore ſimplici hort. Eyſt. ☉

Pæonia promiſcua .ſ. neutra Obſ. Lob. fœmina altera B. pin. ☉

Pæonia folio ſubtus incano flore albo, vel pallido B. pin. mas flore albo hort. Eyſt. ☉

Pæonia polyanthos flore rubro hort. Eyſt. fœmina flore pleno rubro majore B. pin. ☉

Pæonia

Pæonia pleno flore albescente, minor Clus. flore exalbido pleno, major & minor B. pin. ☉

Palma minor B. pin. Camæriphes Dod. ☉

Panaces carpinon .ſ. racemoſa Canadenſis Cornuti. ☉

Panax Paſtinacæ folio, An Syriacum Theophraſti B. pin. Panaces peregrinum Dod. ☉

Panicum Dod. Germanicum, .ſ. paniculâ minore B. pin. ☿

Panicum Italicum, .ſ. paniculâ majore B. pin. ſativum hiſt. Lugd. ☿

Papaver hortenſe ſemine albo B. pin. album ſativum Icon. Lob. ☿

Papaver hortenſe nigro ſemine B. pin. nigrum ſativum Dod. ☿

Papaver criſtatum floribus & ſemine album B. pin. fimbriatum, aut criſtatum album Icon. Lob. ☿

Papaver criſtatum floribus rubris ſemine nigro B. pin. ſativum rubrum fimbriatum Dal. hiſt. Lugd. ☿

Papaver laciniatum rubrum unguibus purpureis hort. Eyſt.

Papaver hortenſe flore ſimplici dilutiſſimè violaceo. ♀

Papaver hortenſe flore ſimplici placidè rubro unguibus plumbeis. ♀

Papaver flore multiplici purpuraſcente hort. Eyſt. ♀

Papaver flore miniato pleno hort. Eyſt. ♀

Papaver flore pleno violaceo. ♀

Papaver flore pleno, argentei coloris hort. Eyſt. ♀

Papaver flore pleno album B. pin. polyanthos Tab. ♀

Papaver flore pleno incarnato hort. Eyſt ♀

Papaver flore pleno rubro hort. Eyſt. ♀

Papaver flore pleno dilutè violaceo. ♀

Papaver erraticum majus B. pin. erraticum Dod. ♀

Papaver erraticum flore pleno B. pin. Idem flore pleno igneo, flore pleno rubro, & criſpo. ♀

*Papaver erraticum Pyrennium flore flavo C.B.P. Argemone Cambrobritannica Park. ☉

Papaver corniculatum luteum B. pin. corniculatum majus Dod. ☉ *Pa-

*Papaver corniculatum phœniceum hirſutum C. B. flore phœniceo Cluſ. ♀

*Papaver corniculatum violaceum C. B. Lob. ♀

Papaver ſpinoſum B. prodr. ♀

Parietaria Dod. officinarum, & Dioſcoridis B. pin. ☉

Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris Dioſcoridis, vel Daucus officinarum B. pin. Daucus vulgaris Cluſ. ♀

Paſtinaca ſylveſtris hirſuta echinato fructu B. pin. Daucus λαπίθυλος Thal. ♀

*Paſtinaca tenuifolia lucida. ♃ ♀

Paſtinaca tenuifolia ſativa, radice lutea, vel alba B. pin. tenuifolia ſativa Dod. ♀

Paſtinaca tenuifolia ſativa, radice atrorubente B. pin. ſativa rubens Dod. ♀

Paſtinaca tenuifolia radice & umbellâ luteâ. ♃ ♀

Paſtinaca ſativa latifolia Dod. B. pin. ♀

Paſtinaca ſylveſtris latifolia Dod. Elaphoboſcum Matth. ed. B. ♀

Pedicularis Alpina Filicis folio minor B. pin.

pin. Alectorolophos ſecunda Cluſ. deſcr. ☉

Pedicularis pratenſis purpurea B. pin. Fiſtularia Dod. ♀

Pedicularis pratenſis lutea, vel criſta Galli B. pin. Criſta Galli Dod. ♀

* Pentaphylloïdes fragariæ folio. ♃ ☉

Peplus Dod. Peplus .ſ. Eſula rotunda B. pin. ♀

* Peplis Cluſ. hiſt. maritima folio obtuſo C. B. P. ♀

Pepo major oblongus Dod. oblongus B. pin. ♀

Pepo rotundus major Dod. compreſſus major B. pin. ♀

Pepo rotundus minor Dod. compreſſus minor B. pin. ♀

Pepo rotundus Melonis effigie B. pin. Indicus minor rotundus Tab. ♀

Pepo rotundus Aurantii formâ B. pin. Cucurbita Aurantii formâ hort. Eyſt. ♀

Pepo minor clypeatus B. pin. Indicus minor clypeatus Tab. ♀

Pepo

Pepo minor angulosus B. pin. Indicus minor angulosus Tab. ♀

Perfoliata Dod. vulgatissima .s. arvensis B. pin. ☉

Perfoliata montana Cam. montana latifolia B. pin. ☉

Perfoliata minor angustifolia Bupleuri folio B. pin. minima Bupleuri folio Col. descr. ♀

Periclymenum non perfoliatum Septentrionalium Obs. & Icon. Lob. non perfoliatum Germanicum B. pin. ☉

Periclymenum perfoliatum serotinum flore rubro. ☉

Periclymenum perfoliatum B. pin. perfoliatum calidarum regionum Obs. & Icon. Lob. ☉

Persicaria Dod. mitis maculosa, & non maculosa B. pin. Eadem flore albo. ♀

Persicaria urens .s. hydropiper B. pin. Hydropiperi Dod. ♀

Persicaria pusilla repens Obs. & Icon. Lob. minor B. pin. ♀

Peta-

Petasites Dod. major & vulgaris B pin. ⊙
Petasites flore albo hort. Eyst. minor B. pin. ⊙
Petasites minor folio Tussilaginis. ♃ ⊙

Peucedanum majus Italicum Lobelii hist. Lugd. B. pin. ⊙
Peucedanum Dod. Germanicum B. pin. ⊙
* Peucedanum minus fol. Lobatis angustis. ♃ ⊙
* Peucedanum minus C. B. Pin. selinum montanum pumilum Clus.

Phalangium parvo flore non ramosum B. pin. non ramosum Dod. ⊙
Phalangium parvo flore ramosum B. pin. ramosum Dod. ⊙
* Phalangium Allobrogicum. ⊙
Phalangium Virginianum Tradescanti Ger. Idem flore albo. ⊙
* Phalangium Virginianum amplo flore rubro. ⊙
* Phalangium Virginianum amplo flore cœruleo .s. Azureo. ⊙

Phalaris Dod. major semine albo B. pin. ♀
* Phalaris

*Phalaris minore ſemine nigro. ♃ ♀

Phaſeolus vulgaris Obſ. & Icon. Lob. Dolichus .ſ. Phaſeolus Dod. fructu albo, cœruleo, nigro, flavo, obſoleto, amethyſtino, cineraceo, albo nigris lituris diſtincto, purpureo nigris lituris variegato. ♀

Phaſeolus flore puniceo Cornuti. Idem fructu albo, & variegato. ♀

Phaſeolus minimus fructu viridi ovato. ♃ ♀

*Phaſeolus minor Coloſſinus ſiliquis longiſſimis. ♃ ♀

*Phaſeolus minor albus, macula nigra umbilico notato J. B. ♀

Phillyrea Cluſ. latifolia ſpinoſa B. pin.

Phillyrea folio leviter ſerrato B. pin. ſecunda Cluſ.

Phillyrea folio Liguſtri B. pin. tertia Cluſ.

Phillyrea anguſtifolia prima B. pin. quarta Cluſ.

Phyllum marificum Cluſ. teſticulatum B. pin. ☉

Phyllum

Phyllum fœminificum Cluſ. ſpicatum B. pin. ☉

Picea hiſt. Lugd. major prima, ſ. Abies rubra B. pin.

Piloſella major Dod. major repens hirſuta B. pin. ☉

Eadem folio variegato. ☉

Piloſella major repens minus hirſuta B. pin. Lactucella ſylveſtris repens Cam. deſcr. ☉

Piloſella Indica Cornuti deſcr. Hieracium peregrinum hort. Eyſt. ☉

* Piloſella umbelifera Macrocaulos Col. ☉

* Piloſella major glabra. ♃ ☉

Pimpinella, Saxifraga major umbellâ candidâ B. pin. major Fuchſ. ☉

Pimpinella, Saxifraga major altera B. pin. minor Fuchſ. ☉

Pimpinella, Saxifraga minor B. pin. criſpa ſ. petræa Tab. ☉

Pimpinella ſylveſtris, Sanguiſorba major Dod. Pimpinella, Sanguiſorba major B. pin. ☉

Pimpi-

Pimpinella maxima Canadenſis Cornuti. ☉
Pimpinella maxima Canadenſis ſpicâ longâ rubrâ. ♃ ☉
Pimpinella maxima Canadenſis ſpicâ rubrâ glomeratâ. ♃ ☉
Pimpinella, Sanguiſorba minor hirſuta B. pin. Pimpinella, Sanguiſorba Dod. ☉
Pimpinella, Sanguiſorba minor lævis B. pin. ☉
Pimpinella agrimonoïdes. ♃ ☉

Pinus domeſtica Matth. ed. B. ſativa B. pin.
Pinus ſylveſtris montana Matth. ed. B. ſylveſtris B. pin.

Piper Indicum vulgatiſſimum B. pin. Indicum medium hort. Eyſt. Capſicum, Piper Indicum Obſ. Lob. ♀
Piper Indicum propendentibus ſiliquis oblongis recurvis B. pin. Capſicum recurvis ſiliquis Dod. ♀
Piper Indicum ſiliquis flavis hort. Eyſt. ♀
Piper Indicum propendentibus ſiliquis rotundis B. pin. Indicum cordatum hort. Eyſt. ♀
Piper Indicum ſiliquis ſurrectis, & oblongis

B. pin. Indicum medium longum erectum hort. Eyst. Idem fructu flavo. ♀

Piper Indicum minimum erectum hort. Eyst. ♀

Piper Indicum siliquis surrectis Cerasi formâ B. pin. Capsicum minimis siliquis Dod. ♀

Pistacia Matth. ed. B. peregrina fructu racemoso s. Terebinthus Indica Theophrasti B. pin.

Pistacia sylvestris B. pin. Staphylodendron Matth. ed. B. ☉

Pistacia Virginea sylvestris trifolia. ♃ ☉

Pisum majus quadratum B. pin. majus Dod. ♀

Pisum umbellatum B. pin. proliferum Tab. ♀

Pisum hortense majus B. pin. ramulare hist. Lugd. Idem fructu rubro variegato B. pin. descr. ♀

Pisum arvense B. pin. minus Dod. ♀

Pisa sine cortice duriore B. pin. leptoloba Cam. ♀

Pisa nana rotunda. ♃ ♀

* Piſum ſylveſtre Viciæ fructu. ♃ ♀
Piſum repens perenne, aliud maritimum Britannicum Park. ☉
Piſum veſicarium fructu nigro alba macula notato B. pin. cordatum Ad. & Icon. Lob. ♀

Plantago maxima tota glabra B. prodr. maxima Hiſpanica Cornuti. ☉
Plantago latifolia ſinuata B. pin. major Dod. ☉
Plantago latifolia incana B. pin. media Dod. ☉
Plantago latifolia roſea flore expanſo B. pin. roſea hort. Eyſt. ☉
Plantago latifolia roſea floribus quaſi in ſpica diſpoſitis B. pin. roſea ſpicata hort. Eyſt. ☉
Plantago latifolia incana ſpicis variis B. pin. peregrina latifolia Gareti Cluſ. ☉
Plantago quinquinervia Obſ. & Icon. Lob. anguſtifolia major B. pin. ☉
* Plantago marina, quinquenervia incana ♃ ☉
Plantago aquatica latifolia B. pin. aquatica Dod. ☉

Plantago aquatica anguſtifolia B. pin. aquatica humilis anguſtifolia, & longifolia Icon. Lob. ☉

Plantago aquatica ſtellata B. pin. Damaſonium ſtellatum hiſt. Lugd. ♀

Platanus Dod. Cluſ.

* Platanus Virginiana Park. ☉

Polium Lavendulæ folio B. pin. recentiorum fœmina Lavendulæ folio Obſ. & Icon. Lob. ☉

Polium montanum luteum B. pin. luteum Dal. hiſt. Lugd. ☉

Polium montanum album B. pin. montanum primum Cluſ. ☉

Polium montanum ſecundum flore albo Cluſ. deſcr. ☉

* Polium rubrum majus flore dilutiori. ♃ ☉

* Polium rubrum minus, montanum 5 purpureum Cluſ. hiſt. ☉

Polygala vulgaris B. pin. Flos ambarvalis Dod. Eadem quæ

Polygala cœrulea Tab.

Polygala alba Tab. ♀

Polygala repens nivea B. pin. repens nuperorum Obſ. & Icon. Lob. ♆
Polygala Valentina Cluſ. altera B. pin. ☉

Polygonatum Dod. latifolium vulgare B. pin ☉
Polygonatum latifolium flore majore odoro B. pin. latifolium Fuchſ. Dod. ☉
Polygonatum latifolium hellebori albi foliis B. pin. tertium latiore folio Cluſ. deſcr. ☉
Polygonatum latifolium ramoſum B. pin. ramoſum Dod. ☉
Polygonatum anguſtifolium non ramoſum B. pin. anguſtifolium Fuchſ. hiſt. Lugd. ☉
Polygonatum ſpicatum ſterile Cornuti. ☉
Polygonatum ramoſum flore luteo majus Cornuti. ☉

Polygonum latifolium B. pin. Polygonum mas Dod. ♆
Polygonum maritimum latifolium B. pin. marinum prius Dal. hiſt. Lugd. ♆
Polygonum floſculis herbaceis ex alis prodeuntibus. Polycarpum hiſt. Lugd. ♆

Polygonum floſculis albis in ſummitate. Saxifraga Anglica Ad. Lob. ♀

Polygonum Caryophylli holoſtii flore. ♂ ♀

Polygonum paluſtre alſinefolium. Saxifraga paluſtris alſinefolia Ger. ♀

Polygonum montanum minimum niveum Obſ. Lob. minus candicans B. pin. ♀

Polygonum littoreum minus floſculis ſpadiceo-albicantibus B. prodr. deſcr. ♀

Polygonum minus .ſ. Millegrana major B. pin. Herniaria Dod. ♀

Polygonum minus .ſ. Millegrana major foliis glabris B. pin. deſcr. ♀

Polygonum minus maritimum incanum. ♂ ♀

Polygonum minimum .ſ. Millegrana minima B. pin. Millegrana minima Icon. Lob. ♀

* Polygonum marinum minus Serpilli fol. C. B. P. ♀

Polypodium majus Dod. vulgare B. pin. ☉

Populus alba Dod. B. pin.

Populus nigra Dod. B. pin.

Populus tremula B. pin. Lybica Dod.

Porrum commune capitatum B. pin. capitatum Fuchſ. ♀

Porrum folio latiſſimo B. pin. Syriacum Tab. ♀

* Porrum ſylveſtre Vinearum C. B. P. Ampelopraſum Lugd. ♀

Porrum ſectivum juncifolium B. pin. Sehœnopraſum Dod. ☉

Portulaca hortenſis Fuchſ. latifolia .ſ. ſativa B. pin. ♀

Portulaca hortenſis folio flavo. ♃ ♀

Portulaca ſylveſtris Dod. anguſtifolia .ſ. ſylveſtris B. pin. ♀

* Portulaca minima alba. ♃ ♀

* Potamogeton ſalicis fol. C. B. Pin. potamogeiton Dod. ☉

Potentilla Fuchſ. Argentina .ſ. Potentilla Dod. ☉

Poterion Obſ. & Icon. Lob. Poterio affinis, foliis Pimpinellæ, ſpinoſa B. pin. ☉

Prunus Dod.

Prunus fructu rotundo nigropurpureo dulci B. pin. Prunus myrobalanus Cluſ.
Prunus ſylveſtris Obſ. & Icon. Lob. B. pin.

Pſeudodictamnus verticillatus inodorus B. pin. Pſeudodictamnum Dod. ☉

Pſyllium Plinianum forte, radice perenni ſupinum Obſ & Icon. Lob. majus ſupinum B. pin. ☉
Pſyllium Dod. majus erectum B. pin. ♀

* Ptarmica Virginiana folio Helenii. ♃ ☉
* Ptarmica foliis ſcabioſæ B. prodr. ☉
Vide dracunculus.

Pulegium latifolium B. pin. regium hiſt. Lugd. Idem flore albo. ☉
Pulegium anguſtifolium B. pin. cervinum hiſt. Lugd. Idem flore albo. ☉
* Pulegium denſi ſpicatis Park. ☉

Pulſatilla Dod. folio craſſiore, & majore flore B. pin. ☉
Pulſatilla flore albo B pin. albo Lobelii hiſt. Lugd. ☉

Py-

Pyrola Dod. rotundifolia major B. pin. ☉

Pyrus Dod. ſativa B. pin.
Pyrus ſylveſtris B. pin. Pyra ſylveſtria Tab.

Q.

* QUADRIFOLIUM albo flore phæum Fuchſ. Lugd. ☉ A luxuriante natura à Trifolio in quadrifolium maculatum, degenerans.

Quercus cum longo pediculo B. pin. Hemeris etymodrys hiſt. Lugd.
* Quercus vulgaris brevi pediculo.
* Quercus, incanis ſubtûs foliis, pediculo brevi.
* Quercus incanis ſubtûs foliis, longo pediculo.
* Quercus calyce echinato, glande majore.

Quinquefolium majus repens B. pin. majus luteum Fuchſ. ☉

Quinquefolium minus repens lanuginoſum luteum B. pin. Pentaphyllum .ſ. Quinquefolium minus Tab. ☉

Quinquefolium folio argenteo B. pin. erectum incanum Matth. ed. B. ☉

Quinquefolium rectum luteum B. pin. Pentaphyllum majus Obſ. Lob. ☉

Quinquefolium montanum erectum hirſutum luteum B. prodr. ☉

* Quinquefolium ſiliquoſum Proſp. Alp ♀

* Quinquefolium Alpinum repens ſerotinum. ♃ ☉

* Quinquefolium Canadenſe erectum. ♃ ☉

Quinquefolium fragiferum B. pin. fragiferum quintum Cluſ. ☉

Quinquefolium fragiferum repens Tab. Pentaphyllum ſupinum Potentillæ facie Cluſ. Quinquefolio fragifero affinis B. pin. ☉

Quinquefolium paluſtre rubrum B. pin. rubrum Dodonæi hiſt. Lugd. ☉

R.

Ranunculus ſylvarum Cluſ. nemoroſus Obſ. Lob. Anemone nemoroſa flore majore B. pin. Idem flore roſeo. ⊙

* Ranunculus nemoroſus flore pleno albo. ⊙

Ranunculus nemoroſus luteus B. pin. Icon. Lob. ⊙

Ranunculus auricomus dulcis Tragi Icon. Lob. nemoroſus vel ſylvaticus folio rotundo B. pin. ⊙

Ranunculus nemoroſus Thalictri folio B. pin. præcox ſecundus Thalictri folio Cluſ. ⊙

Ranunculus Thalictri folio minor Aſphodeli radicibus Park. Oenanthe Myconi hiſt. Lugd. malè à B. pin. Oenanthe hederæ foliis. ⊙

Ranunculus nemoroſus Muſcatellina dictus B. pin. Moſchatella Cord. hiſt. ⊙

Ranunculus pratenſis ſurrectis cauliculis Obſ. & Icon. Lob. pratenſis erectus acris B. pin. ⊙

Ranun-

Ranunculus pratenſis erectus dulcis B. pin. hortenſis erectus flore ſimplici luteo hort. Eyſt. ☉

Ranunculus pratenſis reptante cauliculo Obſ. & Icon. Lob. pratenſis repens hirſutus B. pin. ☉

Ranunculus pratenſis repens hirſutus maculatus. ♃ ☉

Ranunculus bulboſus Obſ. & Icon. Lob. pratenſis radice verticilli modo rotundâ B. pin. ☉

Ranunculus hortenſis erectus flore pleno B. pin. erectus hortenſis flore pleno luteo hort. Eyſt. ☉

Ranunculus pratenſis reptante cauliculo flore pleno. An Ranunculus hortenſis inclinans B. pin. ☉

Ranunculus dulcis flore pleno B. pin. dulcis multiflorus Tab. ☉

Ranunculus tuberoſus flore multiplici Dod. radice tuberosâ flore pleno, & prolifero B. pin. ☉

Ranunculus folio Aconiti flore albo multiplici B. pin. niveus polyanthes Lobelii hiſt. Lugd. ☉

Ranunculus arvenſis echinatus B. pin. arvorum Icon. Lob. ♀

Ranunculus Creticus echinatus latifolius Prosp. Alp. de exot. Stellatus echinatus Creticus B. pin. ♃

Ranunculus paluſtris Apii folio lævis B. pin. paluſtris rotundiori folio Obſ. & Icon. Lob. ♃

Ranunculus longifolius paluſtris major B. pin. lanceatus major Tab. ☉

Ranunculus longifolius paluſtris minor B. pin. flammeus aquaticus anguſtifolius Obſ. & Icon. Lob. ☉

Ranunculus paluſtris ſerratus B. pin. aquatilis anguſtifolius ſerratus Obſ. & Icon. Lob. ☉

Ranunculus montanus folio gramineo B. pin. pumilus gramineis foliis Icon. Lob. ☉

Ranunculus Illyricus major Cluſ. deſcr. lanuginoſus anguſtifolius grumoſa radice major B. pin. ☉

Ranunculus Illyricus Dod. lanuginoſus anguſtifolius grumoſa radice minor B. pin. ☉

Ranunculus lanuginoſus Apii folio, Aſphodeli radice B. pin. alter ſaxatilis Aſphodeli radice Col. Idem flore pleno. ☉

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore phœniceo ruberrimo hort. Eyst. Idem flore flavo, subalbido. ⊙

Ranunculus Creticus grumosa radice flore niveo hort. Eyst. ⊙

Ranunculus creticus latifolius Clus. Asphodeli radice Creticus B. pin. ⊙

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore flavo rubris venis distincto Clus. cur. post. ⊙

Ranunculus Asiaticus flore albo colore suaviter rubente per oras mixto B. pin. descr. ⊙

Ranunculus Asiaticus grumosa radice, flore pleno Clus. Asphodeli radice flore pleno sanguineo B. pin. ⊙

Ranunculus flore pleno ruberrimo hort. Eyst. Asphodeli radice flore subphœniceo rubente B. pin. ⊙

Ranunculus Asiaticus grumosa radice, flore pleno sanguineo prolifero hort Eyst. Asphodeli radice prolifer miniatus B. pin. ⊙

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore ex flavo, & rubro mixto pleno. ⊙

Ranunculus Constantinopolitanus gigas flore coccineo. ♃ ⊙ Ra-

Ranunculus Conſtantinopolitanus gigas flore byſſino. ♃ ☉

Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore B. pin. albus flore ſimplici Icon. Lob. ☉

Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore minore B. pin. Aconitum batrachioïdes Ad. & Icon. Lob. ☉

Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoſo B. pin. Ranunculus flore globoſo Dod. ☉

* Ranunculus annuus arvenſis flore minimo luteo. ♃ ♀

* Ranunculus grumoſa radice ſ. pthora valdenſium Cluſ. ☉

* Ranunculus præcox rutæ folio i. Cluſ. ♀ ☉

* Ranunculus ferulaceus ſpica falcata nobis perperâm, Melampyrum perpuſillum Lob. ♀

* Raphanus ſylveſtris major flore luteo. ♃ ☉

* Raphanus aquaticus minimus luteus. ♃ ☉

Raphanus niger B. pin. Icon. Lob. ♀

Raphanus minor oblongus B. pin. Radicula ſativa minor Dod. ♀

Raphanus ruſticanus .ſ. vulgaris Matth. ed. B. ruſticanus B. pin. ☉

Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias diviſis B. pin. & prodr. ☉

Raphanus aquaticus alter B. pin. & prodr. Rapiſtrum aquaticum Tab. ☉

* Rapiſtrum monoſpermum B. prodr. ♀

Rapiſtrum arvorum Obſ. & Icon. Lob. flore luteo B. pin. ♀

Rapiſtrum flore albo, ſiliquâ articulatâ B. pin. flore albo Eruceæ foliis Icon. Lob. ♀

Rapiſtrum flore albo, ſiliquis in rotundum articulatis, alterum arvorum Park. ♀

Rapiſtrum maximum monoſpermon Cornuti. ♀

* Rapum vulgare album rotundum. ♀

* Rapum vulgare album oblongum. ♀

* Rapum luteum. ♃ ♀

Rapunculus eſculentus B. pin. Rapunculum Dod. ♀

Rapunculus minor foliis inciſis B. pin. Erini .ſ. Rapunculi minimum genus Col. phytob. ♀

Rapunculus

Rapunculus ſpicatus B. pin. alopecuroïdes longiori ſpicâ Cluſ. Idem flore albo. ☉

Rapunculus folio oblongo ſpicâ orbiculari B. pin. Rapuntium corniculatum montanum Col. ☉

Rapunculus ſcabioſæ capitulo cœruleo B. pin. Rapuntium montanum capitatum Col. ♆

Rapunculus perſicifolius magno flore B. pin. Campanula perſicifolia noſtras Obſ. & Icon. Lob. Idem flore albo. ☉

Rapunculus nemoroſus anguſtifolius magno flore, major B. pin. ſylveſtris major hort. Eyſt. ♆

Rapunculus hortenſis latiore folio .ſ. Pyramidalis B. pin. lacteſcens campanula major Lobelii hiſt. Lugd. ☉

*Rapunculus Creticus campanula Pyramidalis altera C. B. P. Petromarula Cretica J. B. ☉

Rapuntium maximum coccineo ſpicato flore Col. in hiſt. Mex. .ſ. Flos Cardinalis Barberini. Trachelium Americanum flore rubro Bapt. Ferr. ☉

Rapuntium urens Solonienſe violaceo flore. ♃ ☉

Reſeda

Reſeda vulgaris B. pin. Plinii neotericorum Belgis, Eruca peregrina vel Cantabrica Icon. Lob. ♀

Reſeda latifolia flore flavo. ♃ ♀

Reſeda foliis Calcitrapæ flore albo. ♃ ♀

Reſedæ affinis, Phyteuma B. pin. Phyteuma Monſpelienſium Icon. Lob. ♀

Reſeda alba minor B. pin. Seſamoïdes parvum Salmanticum Cluſ. ☉

Rhamnus ſpinis oblongis flore candicante B. pin. primus Cluſ.

Rhamnus Salicis folio anguſto fructu flaveſcente B. pin. Germanicus Matth. ed. B.

Rhamnus folio ſubrotundo fructu compreſſo B. pin. Paliurus Dod.

Rhamnus catharticus B. pin. hiſt. Lugd. ſolutivus Dod.

Rhamnus catharticus minor B. pin. Spina infectoria pumila prima Cluſ.

Rhaponticum Proſp. Alp. de exot. folio lapathi majoris glabro B. pin. ☉

Rhodia radix Dod. Cluſ. ☉

Rhus folio ulmi B. pin. Rhus Obſoniorum & Coriariorum Cluſ. ☉

Rhus Virginianum B. pin. app. ☉

Rhus myrtifolia Monſpeliaca B. pin. myrtifolia Monſpelienſium Ad. & Icon. Lob. ☉

Rhus myrtifolia Belgica B. pin. Chamælæagnus Dod. ☉

Ricinus Dod. vulgaris B. pin. ♆

Ricinus Americanus major ſemine nigro B. pin. Syriacus Cam. deſcr. ♆

* Ricinus minimus Americanus minor C. B. P. ♆

Roſa rubra B. pin. provincialis Dod. deſcr. ☉

Roſa rubra pallidior B. pin. Damaſcena rubra hiſt. Lugd. deſcr. ☉

Roſa purpurea B. pin. pallida Ad. Lob. ☉

Roſa verſicolor B. pin. prænestina verſicolor Cluſ. deſcr. ☉

Roſa maxima multiplex B. pin. centifolia Batavica Cluſ. ☉

Roſa alba vulgaris major B. pin. alba flore ſimplici hort. Eyſt. ☉

Roſa flore pleno albo hort. Eyſt. ⊙

Roſa moſchata ſimplici flore B. pin. muſcata alba Tab. ⊙

Roſa moſcata flore pleno B. pin. muſcata alba multiplex Tab. ⊙

Roſa ſpinis carens flore majore B. pin. ſine ſpinis Cluſ. ⊙

Roſa ſylveſtris vulgaris flore odorato incarnato B. pin. ſylveſtris Dod. ⊙

Roſa ſylveſtris flore pleno B. pin. ſylveſtris odorata flore multiplici Icon. Lob. ⊙

Roſa ſylveſtris foliis odoratis B. pin. Eglenteria hort. Eyſt. ⊙

Roſa odore Cinamomi flore pleno B. pin. Cinamomea pleno flore Cluſ. ⊙

Roſa lutea ſimplex B. pin. lutea hiſt. Lugd. ⊙

Roſa lutea multiplex B. pin. lutea maxima flore pleno hort. Eyſt. ⊙

Roſa punicea Cornuti deſcr. ⊙

Roſa ſylveſtris pomifera minor B. pin. pimpinellæ folio Ger. ⊙

* Roſa verſicolor .ſ. Striata omnium minima. ♃ ⊙

Roſmarinus hortenſis anguſtiore folio B. pin.

pin Roſmarinum coronarium Dod. ☉
Roſmarinus hortenſis folio aureo. ♃ ☉
*Roſmarinum latifolium Park. ☉

Rubia tinctorum ſativa B. pin. Rubia major Cluſ. ☉
Rubia ſylveſtris hiſt. Lugd. ſylveſtris aſpera, quæ ſylveſtris Dioſcoridis B. pin. ☉
Rubia cynanchica B. pin. Gallium tetraphyllon montanum cruciatum Col. ☉
Rubia anguſtifolia ſpicata B. prodr. ♀
*Rubia ſpicata Cretica Cluſ. ♀

Rubeola arvenſis cœrulea repens B. prod. ♀
Rubeola repens lutea foliis ſpinoſis B. pin. Rubia minima Obſ. & Icon. Lob. ♀
*Rubeola maritima lutea. ♃ ☉
*Rubeola minima alba. ♃ ♀

Rubus Dod. vulgaris, ſ. Rubus fructu nigro B. pin. ☉
Rubus vulgaris ſpinis carens. ♃ ☉
Rubus repens fructu cæſio B. pin. reptans Ad. Lob. ☉
Rubus idæus ſpinoſus B. pin. Rubus idæus Dod. Idem fructu albo Cluſ. deſcr. ☉

Rubus idæus lævis B. pin. Rubus idæus Placæ Cluſ. ☉
Rubus odoratus Cornuti. ☉

Ruſcus Matth. ed. B. Ruſcum Dod. ☉

Ruta hortenſis latifolia B. pin. graveolens hortenſis Dod. ☉
Ruta ſylveſtris major B. pin. ſylveſtris graveolens Dod. ☉
Ruta ſylveſtris minor B. pin. montana legitima Cluſ. app. alt. Peganion Narbonenſium .ſ. Rutula Ad. Lob. ☉
* Ruta Syriaca Adv. Lob. Harmala Dod. ♀

Ruta muraria Dod. B. pin. ☉

S.

SABINA Dod. folio Tamariſci Dioſcoridis B. pin. ☉

Salix vulgaris alba arboreſcens B. pin. alba perticalis vulgaris hiſt. Lugd.
* Salix latifolia inferne incana J. B.
* Salix latifolia pumila folio rotundo J. B.
* Salix anguſtifolia hirſuta alba J. B.
* Salix anguſtifolia fol. criſpis ſubtûs albicantibus J. B.
* Salix anguſtifolia Amygdalinis fol. J. B.
* Salix anguſtifolia lutea rubrave J. B.
* Salix anguſtifolia humilis repens.

Salvia major Matth. ed. B. Dod. major, An ſphacelus Theophraſti B. pin. Eadem foliis ex luteo variegatis, ex purpureo & albo variegatis. ☉
Salvia minor aurita, & non aurita B. pin. minor Dod. Eadem foliis ex albo vireſcentibus. ☉
Salvia Cretica non pomifera Cluſ. ☉

* Salvia ſerrata criſpa J.B. latifolia ſerrata B. prodr. ☉

Sambucus Fuchſ. fructu in umbella nigro B. pin. ☉
Sambucus fructu in umbella viridi B. pin. Sambuci altera ſpecies Dod. deſcr. ☉
Sambucus racemoſa rubra B. pin. montana racemoſa Ad. & Icon. Lob. ☉
Sambucus folio laciniato B. pin. lacinioſo folio Dod. ☉
Sambucus aquatica flore ſimplici B. pin. aquatica hiſt. Lugd. ☉
Sambucus aquatica flore globoſo pleno B. pin. roſea hort Eyſt. ☉
Sambucus humilis .i. Ebulus B pin. Ebulus Dod. ☉

Sanicula Dod. officinarum B. pin. ☉
Sanicula Alpina lutea B. pin. Auricula urſi Dod. Eadem flore pallido & aureo. ☉
Sanicula Alpina purpurea B. pin. Auricula urſi flore purpureo Icon. Lob. Eadem flore atropurpureo, albo. ☉
Sanicula Alpina flore variegato B pin. Auricula urſi tertia Cluſ. deſcr. ☉

* Sanicula montana flore calcari donato C. B. P. pinguicula Cluſ. hiſt.
Sanicula Alpina foliis Borraginis villoſa B. pin. Auricula urſi Myconi hiſt. Lugd. ☉
Sanicula montana latifolia laciniata B. pin. Cortuſa Matthioli hiſt. Lugd. ☉
Sanicula montana Americana .ſ. Cortuſa Americana ſtapelii in Theoph. ♃ ☉
Sanicula montana rotundifolia major B. pin. montana ſecunda Cluſ. guttata Cam. ☉
Sanicula montana crenata umbilico pallido. ♃ ☉
Sanicula montana crenata umbilico rubro. Sedum montanum ſerratum guttato flore Park. ☉

Saponaria Dod. major lævis B. pin. ☉
Saponaria flore pleno Cornuti deſcr. ☉
Saponaria concava Anglica B. prodr. ☉

Satureia Dod. domeſtica hort. Eyſt. hortenſis .ſ. Cunila ſativa Plinii B. pin. ♀
Satureia montana B. pin. Thymbra Dod. perenni radice. ☉

Saxifraga rotundifolia alba B. pin. alba Chelidonides Obſ. & Icon. Lob. ☉

Saxifraga aurea Dod. rotundifolia aurea B. pin. ☉

* Saxifraga aurea longifolia humilior. ♃ ☉

Scabioſa vulgaris major Dod. pratenſis hirſuta quæ officinarum B. pin. Eadem flore albo. ☉

Scabioſa montana calidarum regionum Obſ. & Icon. Lob. frutícans anguſtifolia alba B. pin. ☉

Scabioſa prolifero flore Cluſ. prolifera B. prodr. prolifera folio latiore ejuſdem pin. ♀

Scabioſa Alpina centauroïdes hort Eyſt. Alpina foliis Centaurii majoris B. pin. ☉

Scabioſa latifolia rubra non laciniata ſecunda B. pin. rubra Auſtriaca Icon Lob. ☉

Scabioſa argentea anguſtifolia B. prodr. ☉

Scabioſa peregrina rubra capitulo oblongo B. pin. Indica flore ſaturatè rubro hort. Eyſt. Eadem quæ

Scabioſa Indica flore dilutè rubro hort Eyſt. ♀

Sca-

Scabiosa capitulo globoso major B. pin. minor .s. Columbaria Obs. & Icon. Lob. ☉

Scabiosa capitulo globoso minor B. pin. angustifolia flore subcœruleo hort. Eyst. Eadem flore albo, & roseo. ☉

Scabiosa stellata folio laciniato major B. pin. major Hispanica, .s. prima Clus. ♀

Scabiosa stellata folio non dissecto B. pin. arborea Prosp. Alp. de exot. ☉

*Scabiosa gramineis foliis glabris. ♃ ☉

*Scabiosa dissectis fol. flore amplo semine lanuginoso. ♃ ☉

*Scabiosa 2 Hispanica Clus. ♀

*Scabiosa minima annua semine anguloso. ♃ ♀

Scammonia Syriaca B. pin. Scammonium Dod. ☉

Scammonia Monspeliaca foliis rotundioribus B. pin. Scammonium Monspelienſe Ad. & Icon. Lob. ☉

Scandix semine rostrato vulgaris B. pin. Scandix, Pecten Veneris Dod. ♀

Scilla

Scilla Dod. vulgaris radice rubra B. pin. ☉

Scolymus Theophrasti, Eryngium luteum Monspelienſium Obſ. & Icon. Lob. Scolymus chryſanthemos B. pin. ☉
Scolymus chryſanthemos annuus. ♃ ♀

Scordium Dod. B. pin. ☉
Scordium alterum .ſ. ſalvia agreſtis B. pin. Salvia ſylveſtris Bock. ☉
Scordium ſemine talari, flore cœruleo. Idem flore roſeo. ♃ ☉

Scorpioïdes Bupleuri folio B. pin. repens Bupleuri folio Obſ. & Icon. Lob. ♀
Scorpioïdes ſiliquâ craſsâ Boëlii Ger. app. ♀
Scorpioïdes ſiliquâ ſtriatâ minus hirſutâ. ♃ ♀
Scorpioïdes Matthioli Dod. portulacæ folio. B. pin. ♀

Scorzonera latifolia ſinuata B. pin. major Hiſpanica prima Cluſ. ☉
Scorzonera foliis nervoſis B. pin. Germanica anguſtifolia Tab. ☉

Scor-

Scorzonera pulverifera. ♃ ☉

Scorzonera latifolia humilis nervosa B. pin. humilis latifolia pannonica secunda Clus. ☉

Scorzonera angustifolia prima B. pin. humilis angustifolia pannonica tertia Clus. ☉

*Scorzonera angustifolia subcœrulea C. B.P. angustifolia elatior pannonica quarta Clus. ☉

*Scorzonera sem. lanuginoso nobis, Tragopogon hirsutum Apulum humile Col. ☉

Scrophularia Dod. nodosa fœtida B.pin. ☉

Scrophularia aquatica major B. pin. Betonica aquatilis Dod. ☉

Scrophularia folio Urticæ B.pin. peregrina Cam. ♀

Scrophularia flore luteo B. pin. Lamium pannonicum secundum exoticum Clus. ♀

Scrophularia foliis & caule hirsutis. ♃ ☉

Scrophularia ruta canina dicta vulgaris B. pin. Ruta canina Clus. ☉

*Scrophularia Sambuci fol. Park. ☉

* Scutellaria Americana Malvæ folio. ♃ ☉

Secale Fuchſ. hybernum vel majus B. pin.

Securidaca lutea major B. pin. vera Cluſ. ♀
Securidaca dumetorum major flore vario ſiliquis articulatis B. pin. Hedyſarum purpureum Tab. ☉
Securidaca minor lutea ſiliquis articulatis. ♃ ♀

Sedum majus arboreſcens floſculis candidis B. pin. Sempervivum ſ. Sedum arboreſcens majus Dod. ☉
Sedum majus Fuchſ. majus vulgare B. pin. ☉
Sedum minus teretifolium album B. pin. Sempervivum minus alterum Dod. ☉
* Sedum longifolium Citrino flore. ♃ ☉
* Sedum arvenſe flore rubente B. prodr. ♀
* Sedum teretifolium majus album. ♃ ☉
Sedum minus teretifolium album alterum Sempervivum minus æſtivum Obſ. & Icon. Lob. ♀

Sedum

Sedum minus folio circinato B. pin. Aizoon daſyphyllum Dal. hiſt. Lugd. ☉

Sedum minus luteum folio acuto B. pin. Aizoon hæmatoïdes Icon. Lob. Idem flore albo. ☉

Sedum minus luteum ramulis reflexis B. pin. Aizoon ſcorpioïdes Icon. Lob. ☉

Sedum minus cauſticum hort Eyſt. Sempervivum minus vermiculatum acre B. pin. ☉

Sedum minus .ſ. Vermicularis inſipida hort. Eyſt. Sempervivum minus vermiculatum inſipidum B. pin. ☉

Sedum minus fruticoſum B. pin. minimum arboreſcens vermiculatum Obſ. & Icon. Lob. ☉

Sedum Alpinum hirſutum luteum B. pin. Phyllum thelygonon hiſt. Lugd. ☉

Sedum Alpinum foliolis crenatis aſperis B. prodr. ☉

Sedum Pyrenæum ſerratum longifolium. ♃ ☉

Sedum Pyrenæum ſerratum flore albo punctis purpureis conſperſo. ♃ ☉

Sedum montanum tomentoſum B. pin. Sempervivum rubrum montanum γναφαλῶδες Col. ☉

Sedum

Sedum tridactylites Alpinum majus album B. pin. Saxifraga alba petræa Pon. descr. mont. Bald. ☉

Sedum tridactylites tectorum B. pin. Paronychia altera rutaceo folio Obſ. & Icon. Lob. ♀

Selinum Sii foliis Ger. Park. ♀

Senecio minor vulgaris B. pin. Erigerum minus Dod. ♀

Senecio incanus pinguis B. pin. Erigerum majus Dod. ♀

* Senecio Jacobææ fol. nobis, fortê folio non laciniato J. B. ♀

* Senecio Canadenſis acris alba. ♃ ♀

Serpyllum vulgare majus B. pin. album primum vel ſecundum Tab. ☉

Serpyllum foliis citri odore B. pin. citratum hort. Eyſt. ☉

Serpyllum vulgare minus B. pin. vulgare Dod. Idem flore albo, quod Serpillum minus flore albo Tab. ☉

Serpyllum latifolium hirſutum B. prodr. ☉

Serpyllum anguſtifolium hirſutum B. pin. pannonicum tertium Cluſ. ☉

Ser-

Serratula Matth. ed. B. Dod. ☉
Serratula foliis non inciſis. Tinctoria prima Tab. ☉

Seſeli montanum Cicutæ folio glabrum B. pin. primum montanum pannonicum Cluſ. ☉
Seſeli Creticum Dod. Creticum minus B. pin. Vide tordylium. ♀
Seſeli Æthiopicum frutex Dod. Æthiopicum Salicis folio B. pin. ☉
Seſeli Maſſilienſe fœniculi folio B pin. Maſſilienſe fœniculi folio craſſiore Icon. Lob. ☉
Seſeli foliis tenuioribus. Fœniculus tortuoſus Dal. hiſt. Lugd. ☉
Seſeli paluſtre lacteſcens B. prodr. & pin. ☉
Seſeli pratenſe Lobelii hiſt Lugd. pratenſe, Silaus forte Plinii B. pin. ☉

Sideritis foliis hirſutis profundè crenatis B. pin. Monſpeliaca ſcordioïdes floribus luteis Ad. & Icon Lob. ☉
Sideritis vulgaris prima Cluſ. ☉
Sideritis Alpina hyſſopifolia B. pin. montana Icon. Lob. ☉

Sideritis

Sideritis Alſines trixaginis foilo B. pin. & prodr. ♀

Sideritis arvenſis latifolia glabra B. pin. Alyſſum majus Tab. ♀

Sideritis arvenſis anguſtifolia rubra B. pin. Ladanum ſegetum hiſt. Lugd. Eadem flore albo. ♀

Sideritis glutinoſa odorata. ♃ ☉

* Sideritis ſalviæ folio noſtras donato Park. ☉

* Sideritis verticillis ſpinoſis J. B. ♀

Siliqua edulis B. pin. Ceratonia Dod. Carobe vulgò.

Siliqua ſylveſtris rotundifolia B. pin. Arbor Judæ Dod.

Sinapi Rapi folio B. pin. ſativum Erucæ aut Rapi folio Obſ. & Icon. Lob. ♀

Sinapi Erucæ folio B. pin. ſylveſtre Dod. ♀

Sinapi ſiliquâ hirſutâ B. pin. ſativum alterum Icon. Lob. app. ♀

* Sinapi ſiliquâ hirſutâ, ſemine rubro. ♃ ♀

Siſarum Dod. Germanorum B. pin. ☉

Siſon .ſ. Petroſelinum Macedonicum Dodonæi hiſt. Lugd. Siſon quod Amomum officinis noſtris B. pin. ♀

Sium Dod. Sion .ſ. Apium paluſtre foliis oblongis B. pin. ☉
Sium alterum Oluſatri facie Obſ. & Icon. Lob. Sium erucæ folio B. pin. ☉
Sium repens umbellis ad geniculos diſpoſitis. ♃ ☉
* Sium minimum ferulaceis foliis. ♃ ☉

Smilax aſpera rutilo fructu Cluſ. aſpera fructu rubente B. pin. ☉
Smilax aſpera nigro fructu Cluſ. aſpera minûs ſpinoſa fructu nigro B. pin. ☉

Smyrnium Fuchſ. Hippoſelinum Theophraſti, vel Smyrnium Dioſcoridis B. pin. ☉
Smyrnium Creticum Matth. ed. B. Amani montis Dod. peregrinum rotundo folio B. pin. ♀

Solanum officinarum B. pin. hortenſe Fuchſ. Dod. Idem baccis nigris. ♀
Solanum veſicarium Dod. B. pin. Idem foliis variegatis. ☉

Solanum veſicarium Indicum B. pin. halicacabum, ſive Solanum Indicum Cam. hort. Eyſt. ♀

Solanum Virginianum veſicarium fructu luteo. Virginianum .ſ. halicacabum, .ſ. Alkekengi Virginenſe Park. ♀

Solanum lethale, Belladonna Cluſ. Solanum μανικὸν ☉ B. pin. ☉

Solanum ſomniferum Cluſ. ſomniferum verticillatum B. pin. ☉

Solanum fruticoſum bacciferum B. pin. Amomum Plinii Obſ. Lob. ☉

Solanum quadrifolium bacciferum B. pin. Herba Paris Dod. ☉

Solanum ſcandens .ſ. Dulcamara B. pin. Dulcamara Dod. Idem flore albo quod Dulcis amara flore albo hort. Eyſt. ☉

Solanum ſcandens foliis ex albo variegatis. ♃ ☉

* Solanum Virginianum flore cœruleo. ♃ ☉

* Solanum Virginianum flore albo. ♃ ☉

* Solanum marinum humile flore cœruleo. ♃ ☉

* Solanum marinum humile flore albo. ♃ ☉

Solanum tuberoſum eſculentum Matth ed. B. Arachidna Theophraſti forte, Pappas Peruanorum Cluſ. ☉

Solanum racemoſum Indicum. Magnum Virginianum rubrum Park. ☉

Solanum foliis & caule ſpinoſis. ♃ ☉

Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato molli B. pin. Pomum amoris hiſt. Lugd. ♀

*Solanum Pomum amoris fructu ſtriato molli aureo. ♃ ♀

Solanum pomiferum fructu rotundo parvo molli. ♃ ♀

Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato duro B. pin. Mala Æthiopica Dod. ♀

Solanum pomiferum fructu oblongo B. pin. Mala inſana Dod. ♀

Solanum pomo ſpinoſo rotundo longo flore B. pin. Strammonia Fuchſ. Dod. ♀

Solanum fœtidum pomo ſpinoſo oblongo B. pin. Datura Turcarum hort. Eyſt. Idem flore violaceo. ♀

Solanum fœtidum pomo grandibus aculeis donato. ♃ ♀

Solanum fœtidum pomo ſpinoſo rotundo ſemine pallido B. pin. Datura Ægyptia

Veſl. Obſ. in proſp. Alp. Idem triplici calice. ♀

Solanifolia Circæi dicta major B. pin. Circæa lutetiana Obſ. & Icon. Lob. ☉

Solanum Mexiocanum flore magno B. pin. Admirabilis Perüana rubro flore Cluſ. Idem flore luteo, luteo ex rubro mixto, albo rubris lineis diſtincto. ♀

Soldanella Dod. maritima minor B. pin. ☉

Soldanella Alpina minor Cluſ. Alpina rotundifolia B. pin. ☉

Sonchus aſper non laciniatus B. pin. aſperior Lobelii hiſt. Lugd. ♀

Sonchus aſper laciniatus & non laciniatus B. pin. aſper Dod. ♀

Sonchus lævis laciniatus latifolius B. pin. lævis Dod. ♀

Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus B. pin. alter folio, profundis laciniis ſinuato hederaceo Obſ. & Icon. Lob. ☉

Sonchus anguſtifolius maritimus B. prodr. ♀

Sonchus lanatus Dal. hiſt. Lugd. villoſus luteus major B. pin. ♀

* Sonchus

* Sonchus Auſtriacus lævis tertius cœruleo flore Cluſ. hiſt. ☉

Soncho affinis, Lampſana domeſtica B. pin. Lampſana Dod. ♀

Sorbus Dod. ſativa B. pin.

Sorbus ſylveſtris foliis domeſticæ ſimilis B. pin. Ornus Dod.

* Sparganium ramoſum, & non ramoſum C. B. P. platanaria Dod. ☉

Spartium arboreſcens ſeminibus lenti ſimilibus B. pin. Geniſta Italica Dod. ☉

* Spartum 2 Cluſ. hiſt. Spartum Monoſpermon Hiſpanicum flore luteo Park. ☉

Sphondylium Dod. vulgare hirſutum B. pin. ♀

* Sphondylium hirſutum fol. anguſtioribus B. pin. ♀

* Spiræa Theophr. fortè Cluſ. frutex ſpicatus foliis Salignis ſerratis C. B. Pin.

Stachys Fuchſ. Dod. major Germanica B. pin. ☉

Stachys Cretica B. pin. Pſeudoſtachys Cretica ejuſdem prodr. ☉

* Stachys Cretica anguſtifolia nobis. Pſeudoſtachys B. prodr.

* Stachys fol. obſcure virenti flore ferrugineo. ♃ ☉

Stachys paluſtris fœtida B. pin. Clymenum minus Dal. hiſt. Lugd. ☉

Staphiſagria Fuchſ. Dod. ☿

Stœbe major foliis cichoraceis, mollibus lanuginoſis B. pin. Salmantica prima Cluſ. Eadem flore albo. ☉

Stœbe caliculis argenteis B. pin. Salmantica tertia Cluſ. argentea Salamantica minor Obſ. & Icon Lob. Eadem flore albo. ☉

Stœbe incana Cyano ſimilis tenuifolia B. pin. Auſtriaca humilis Cluſ. deſcr. ☉

* Stœbe humilis Cluſ. incana tenuifolia cyano ſimilis C. B. P. ☉

Stœchas Arabica Cord. hiſt. brevioribus ligulis Cluſ. purpurea B. pin. ☉

* Stœchas folio ſerrato Ger. Dod. folio criſpo Cluſ. hiſt. ☉

Styrax

Styrax hiſt. Lugd. folio mali cotoneæ B. pin.

Suber latiſolium perpetuo virens B. pin. Phellos .ſ. ſuber Dod.

Succiſa Fuchſ. glabra B. pin. Eadem flore albo, roſeo. ☉

Symphytum, Conſolida major B. pin. majus .ſ. Conſolida major Matth. ed. B. Idem flore purpureo, pallido. ☉

Symphytum tuberoſum majus Cluſ. majus tuberoſa radice B. pin. ☉

Symphytum maculoſum .ſ. Pulmonaria latifolia B. pin. Pulmonaria vulgaris maculoſo folio Cluſ. Idem flore albo. ☉

Symphytum .ſ. Pulmonaria anguſtifolia rubente cœruleo flore B. pin. Pulmonaria foliis Echii Icon. Lob. ☉

Syringa cœrulea B. pin. flore cœruleo hort. Eyſt. Lillach Dod. Eadem flore albo quæ Syringa flore lacteo hort. Eyſt.

Syringa Italica flore ſimplici albo hort. Eyſt. alba .ſ. Philadelphus Athenæi B. pin.

T.

TAMARIX Narbonenſis hiſt. Lugd. altera folio tenuiore .ſ. Gallica B. pin.

Tanacetum Dod. vulgare luteum B. pin. ☉

Tanacetum criſpum Dod. foliis criſpis B. pin. ☉

Tanacetum minus album odore Camphoræ B. pin. minus Dod. Achillea .ſ. millefolium nobile Tab. ☉

Tanacetum montanum purpureum. Vide Millefolium. ☉

Tanacetum montanum inodorum minore flore B. pin. inodorum Dod. ☉

Tanacetum inodorum flore majore B. pin. inodorum primum Cluſ. Vide bellis. ☉

Tanacetum .ſ. flos Africanus major flore pleno B. pin. Othonna major polyanthos Obſ. & Icon. Lob. ♀

Tanacetum Africanum majus ſimplici flore B. pin. Flos Africanus major ſimplici flore luteo Icon. Lob. ♀

Tanacetum Africanum .ſ. flos Africanus minor

nor B. pin. Caryophyllus Indicus flore luteo rubeſcente ſimplici minor hort. Eyſt. Idem flore pleno qui Caryophyllus Indicus plenus flore luteo rubeſcente minor hort. Eyſt. ♆

Tanacetum .ſ. flos Mexicanus flore fiſtuloſo ſimplici B. pin. Caryophyllus Mexicanus fiſtuloſo flore, ſimplex Col. ♆

Tanacetum .ſ. flos Mexicanus flore fiſtuloſo pleno B. pin. Caryophyllus Mexicanus alter polyanthos fiſtuloſo flore Col. ♆

Taxus Dod.

Telephium vulgare B. pin. album Fuchſ. ☉

Telephium purpureum majus B. pin. purpuraſcens Fuchſ. ☉

Telephium purpureum minus B. prodr. ☉

Telephium latifolium peregrinum B. pin. primum Hiſpanicum Cluſ. ☉

Telephium repens folio deciduo B. pin. Sextum, Cepæa Pancii Cluſ. ☉

*Telephium Portulacæ folio. ♃ ☉

*Telephium peregrinum rubens. ♃ ☉

Telephium repens folio non deciduo B. pin. legitimum Imperati ſeptimum Cluſ. ☉

Tere-

Terebinthus Dod. vulgaris B. pin.

Teucrium B. pin. vulgare fruticans .f. primum Cluſ. Chamædrys aſſurgens Dod. ☉

* Teucrium fruticans flore purpureo. ♃ ☉

* Teucrium Bæticum fruticans Cluſ. hiſt. Bæticum Ger. Tab. ☉

Thalictrum majus ſiliquâ angulosâ, aut ſtriatâ B. pin. Ruta pratenſis herbariorum Obſ. & Icon. Lob. ☉

Thalictrum pratenſe maximum Monſpelienſium aſperioribus foliis, ♃ ☉

Thalictrum majus florum ſtaminibus purpuraſcentibus B. pin. quartum Dod. deſcr. ☉

Thalictrum Canadenſe Cornuti. ☉

Thalictrum minus Dod. B. pin. Hypecoum hiſt. Lugd. ☉

Thalictrum minimum fœtidiſſimum B. prodr. ☉

Thapſia latifolia villoſa B. pin. prima Cluſ. ☉

Thapſia

Thapſia Carotæ ſolio B. pin. vulgaris Carotæ effigie Obſ. & Icon. Lob. ☉

Thlaſpi arvenſe ſiliquis latis B. pin. latius Dod. ♀

Thlaſpi vulgatum ſerrato folio Matth. ed. B. ♀

Thlaſpi arvenſe perfoliatum majus B. pin. Oleraceum Tab. ♀

Thlaſpi umbellatum arvenſe Iberidis folio B. pin. amarum Tab. ♀

Thlaſpi Iberidis folio tenuiſſimè diviſo. ♀

Thlaſpi umbellatum Creticum Iberidis folio B. pin. Candiæ umbellatum Iberidis folio Obſ. & Icon. Lob. ♀

Idem flore albo, quod Cappadocicum flore albo hort. Eyſt. ♀

Thlaſpi Alpinum Bellidis cœruleæ folio B. pin. montanum Burſæ paſtoris fructu Col. ☉

Thlaſpi montanum ſempervirens B. pin. montanum candidum hiſt. Lugd. ☉

Thlaſpi parvum ſaxatile flore rubente B. pin. Lithothlaſpi quartum carnoſo rotundo folio Col. ☉

Thlaſpi montanum incanum luteum B. prodr. Supinum luteum Icon. Lob. ☉

Thlaſpi, Alyſſum dictum campeſtre minus B. pin. Alyſſum minus Dal. hiſt. Lugd. ♀

* Thlaſpi Alyſſum minimum. ♃ ♀

Thlaſpi maritimum Dal. hiſt. Lugd. Thlaſpi Alyſſon dictum maritimum B. pin. ♀

Thlaſpi clypeatum Cluſ. biſcutatum aſperum hieracifolium & majus B. pin. ☉

Thlaſpi biſcutatum annuum. Leucoïum Alyſſoïdes umbellatum montanum Col. ♀

Thlaſpi clypeatum Serpylli folio B. pin. Ionthlaſpi minimum ſpicatum lunatum Col. ♀

Thlaſpi fruticoſum ſpinoſum B. pin. fruticoſum ſpinoſum Narbonenſe Obſ. & Icon. Lob. ☉

Thlaſpi incanum Machlinienſe Cluſ. fruticoſum incanum B. pin. ☉

Thuya Theophraſti B. pin. Arbor vitæ Dod.

Thymelæa Dod. foliis lini B. pin. ☉

Thymelæa foliis candicantibus ſerici inſtar mollibus B. pin. Tartonraire Gallo-provinciæ

vinciæ Maſſilienſium Ad. & Icon. Lob. ☉

Thymus Fuchſ. vulgaris folio tenuiore B. pin. ☉

Thymus vulgaris latiore folio B. pin. Thymum durius Dod. ☉

Thymum cephaloton Dod. Thymus capitatus qui Dioſcoridis B. pin. ☉

Thymum Creticum fruteſcens. Marum forte Matth. ed. B. hiſt. Lugd. ☉

Tilia Dod. fœmina folio majore B. pin.

Tithymalus characias amygdaloïdes Obſ. & Icon. Lob. B. pin. ☉

Tithymalus characias rubens peregrinus B. pin. characias Monſpelienſis Cluſii & Matthioli Icon. Lob. ☉

Tithymalus characias folio lanuginoſo B. pin. characias ſecundus Cluſ. deſcr. ☉

Tithymalus characias anguſtifolius B. pin. myrſinites tertius anguſtifolius Tab. ☉

Tithymalus characias radice repente. ♃ ☉

Tithymalus myrtifolius arboreus B. pin. arboreus Proſp. Alp. de exot. dendroïdes Matth. ed. B. ☉

Ti-

Tithymalus myrſinites Dod. myrſinites latifolius B. pin. ☉

Tithymalus myrſinites fructu verrucæ ſimili B. pin. verrucoſus Dalechampii hiſt. Lugd. ☉

Tithymalus maritimus B. pin. paralius ex locis maritimis Dod. ☉

Tithymalus maritimus .ſ. Eſula rara Venetorum flore albo. ☉

Tithymalus latifolius Hiſpanicus B. pin. platyphyllos Cluſ. ☉

Tithymalus helioſcopius Dod. B. pin. ☿

Tithymalus cyparifſias Fuchſ. Dod. B. pin. Idem capitulo rubente. ☉

Tithymalus leptophyllos Matth. ed. B. hiſt. Lugd. Tithymalus .ſ. Eſula exigua B. pin. ☿

Tithymalus foliis Pini ſorte Dioſcoridis Pityuſa B. pin. Eſula minor Dod. ☉

Tithymalus paluſtris fruticoſus B. pin. Eſula major Dod. ☉

Tithymalus montanus non acris B. pin. Eſula dulcis Tragi hiſt. Lugd. ☉

Tithymalus foliis brevibus aculeatis B. pin. Pityuſa Matth. ed. B. ☿

Tithymalus Epithymi fructu Col. Peplios altera ſpecies B. pin. ☉

* Tithymalus linariæ fol. flore lunato Col. ☉
* Tithymalus ſalicis fol. ♃ ☉
* Tithymalus caracias pyriformi radice. ♃ ☉
* Tithymalus Eſula exigua fol. obtuſis B. in prodr. ♀

* Tordylion majus vide Caucalis major Cluſ. ♀
* Tordylion minimum Apulum Col. vide Seſeli Creticum minus. ♀
* Tordylion Syriacum ſem. Granulato nobis, Gyngidium 1. Dod. Gyngidium latifolium Syriacum Park. Caucalis Syriaca cum maximo ſem. J. B. ♀

Tormentilla Dod. ſylveſtris B. pin. ☉
Tormentilla Alpina folio ſericeo B. pin. candida Dal. hiſt. Lugd. Heptaphyllon Cluſ. ☉

Trachelium umbelliferum cœruleum Pon. Cervicaria Valerianoïdes cœrulea B. pin. ☉

Tragacantha

Tragacantha Matth. ed. B. hiſt. Lugd. B. pin. ☉

Tragopogon pratenſe luteum majus B. pin. luteum Obſ. & Icon. Lob. ♀

* Tragopogon pratenſe minus Park. deſcr. ♀

* Tragopogon laciniatum luteum C. B. P. ♀

* Tragopogon Coronopi folio minus, B. pin. ♀

Tragopogon Coronopi folio B. pin. ♀

Tragopogon gramineo folio radice villoſa B. pin. Barbula hirci minor Tab. ♀

Tragopogon purpurocœruleum Porri folio B. pin. purpureum hort. Eyſt. Idem flore dilutiore. ♀

Tragopogon gramineis foliis hirſutis B. pin. alter gramineo folio ſuaverubente flore Col. ♀

Tragoriganum Proſp. Alp. exot. ☉

Tribulus terreſtris Dod. terreſtris Ciceris folio fructu aculeato B. pin. ♀

Trichomanes

Trichomanes Fuchſ. Dod. Trichomanes .ſ. polytrichum officinarum B. pin. ☉

* Trichomanes ramoſum C. B. P. ☉

Trichomanes minus & tenerius B. pin. minor mas Tab. candidum Thal. ☉

Trifolium bituminoſum Dod. bitumen redolens B. pin. ☉

Trifolium pratenſe purpureum B. pin. pratenſe Dod. ☉

Trifolium pratenſe album Fuchſ. B. pin. ☉

Trifolium pratenſe luteum capitulo breviore B. pin. pratenſe luteum Fuchſ. ☉

Trifolium pratenſe luteum capitulo Lupuli vel agrarium B. pin. luteum minimum Penæ & Lobelii hiſt. Lugd. ♀

Trifolium pratenſe majus caule fiſtuloſo foliis ſubtùs punctatim nigris. ♃ ♀

Trifolium montanum purpureum majus B. pin. majus ſecundum Cluſ. deſcr. ☉

Trifolium montanum purpureum folio acuto crenato B. prodr. ♀

Trifolium montanum album B. pin. majus primum Cluſ. ☉

Trifolium Alpinum flore magno radiçe ſubamarâ. Anguſtifolium Alpinum Pon.

descr. mont. Bald. ☉

Trifolium spicâ subrotundâ rubrâ B. pin. Lagopus major folio Trifolii Dod. ♃

Trifolium spicâ oblongâ rubrâ B. pin. majus tertium Clus. ☉

Trifolium montanum spicâ longissimâ rubente B. pin. Lagopus altera folio pinnato Obs. & Icon. Lob. ☉

Trifolium lagopoïdes flore pallidè luteo. ♃ ☉

Trifolium montanum angustissimum spicatum B. pin. Lagopus altera angustifolia Ad. & Icon. Lob. ♃

Trifolium arvense humile spicatum, s. Lagopus B. pin. Lagopus, s. Pes leporis Matth. ed. B. Obs. & Icon Lob. ♃

Trifolium stellatum B. phytop. ♃

Trifolium Salmanticense affine. ♃ ♃

Trifolium fragiferum Clus. cur. post. Idem flore albo. ☉

Trifolium album angustifolium floribus velut in capitulum congestis B. pin. Dorycnium Monspelliensium Icon. Lob. ☉

Trifolium nodiflorum. ♃ ♃

Trifolium cochleatum fructu latiore B. pin. cochleatum primum Dod. ♃

Trifolium

Trifolium cochleatum turbinatum .f. fructu compreſſo oblongo B. pin. Medicæ ſpecies ſecunda Ad. Lob. ♆

Trifolium cochleatum fructu globoſo plano. ♃ ♆

* Trifolium cochleatum ſpinoſum majus ſpinis ſurſum, & deorſum tendentibus. ♃ ♆

* Trifolium cochleatum ſpinoſum minus nigrum ciliare. ♃ ☉

* Trifolium cochleatum ſpinoſum minus, polycarpon minus hiſpidum. ♃ ♆

* Trifolium cochleatum ſpinoſum minus coronatum Cherleri J. B. ♆

Trifolium cochleatum maritimum tomentoſum B. pin. Medica marina Cluſ. ☉

Trifolium cochleatum fructu nigro hiſpido B. pin. cochleatum alterum Dod. ♆

Trifolium cochleatum folio cordato maculato B. pin. Medica Arabica Cam. ♆

Trifolium cochleatum echinatum minus B. prodr. ♆

Trifolium cochleatum glomerulis Perſonatæ Cherleri J. B. ♆

Trifolium echinatum arvenſe B. pin. Tribulus terreſtris minor repens hiſt. Lugd. ♆

Trifolium ſubterraneum Tricoccon. ♃ ♀
Trifolium filiquâ cornutâ .ſ. Medica B. pin. Medica Dod. ☉
Trifolium ſylveſtre luteum filiquâ cornutâ, vel Medica fruteſcens B. pin. Medica flavo flore Cluſ. flore albo, cinereo, violaceo nigricante, herbaceo, purpureo. ☉
* Trifolium veſicarium rubello flore. ♃ ♀
* Trifolium capitulo glomerato rigido J. B. ♀
* Trifolium corniculatum luſitanicum flore rubro Park. in app. ad Theatr. ♀
Trifolium acetoſum vulgare B. pin. acetoſum Dod. Idem flore purpuraſcente. ☉
Trifolium acetoſum corniculatum B. pin. Oxys flavo flore Cluſ. ♀
* Trifolium acetoſum corniculatum Indicum erectum. ♃ ♀
Trifolium hepaticum flore ſimplici B. pin. Hepatica trifolia cœruleo flore Cluſ. rubro flore ejuſdem flore albo hort. Eyſt. ☉
Trifolium hepaticum flore pleno B. pin. Hepatica trifolia cœruleo pleno flore Cluſ. ☉

Tripolium Dod. majus cœruleum B. pin. ☉

Triticum Hyberum ariſtis carens B. pin. Triticum Dod. ♀

Triticum ſpicâ multiplici B. pin. Icon. Lob. ♀

Triticum ariſtis longioribus ſpicâ albâ B. pin. Typhinum quartum Tab. ♀

Tulipa Dod. Tulipa Turcarum Geſn. app. ad Cord. hiſt. ☉

Tulipa ſerotina πολυκλάδης major Cluſ. ſerotina ramoſa major B. pin. ☉

Tulipa ſerotina flore pleno B. pin. ☉

Tulipa dubia pumilio Cluſ. pumilio latifolia rubra B. pin. ☉

Tulipa Apenninea Cluſ. minor lutea Italica P. pin. vulgò Bononienſis. ☉

Tulipa Perſica hort. Eyſt. variegata Perſica B. pin. ☉

Tuſſilago Fuchſ. vulgaris B. pin. ☉

V.

VALERIANA hortenſis Dod. hortenſis, Phu folio Oluſatri Dioſcoridis B. pin. ☉

Valeriana foliis calcitrapæ B. pin. annua ſ. æſtiva Cluſ. ♀

Valeriana ſylveſtris major B. pin. ſylveſtris Dod. ☉

Valeriana Græca Dod, cœrulea B. pin. Eadem flore albo quæ

Valeriana Græca flore albo hort. Eyſt. ☉

Valeriana paluſtris minor B. pin. Phu minimum Matth. ed. B. ☉

* Valeriana Urticæ folia flore albo Corn.

* Valeriana Alpina ſylveſtris prima latifolia Cluſ. ☉

Valeriana rubra Dod. B. pin. Eadem flore albo. ☉

Valeriana rubra anguſtifolia B. prodr. ☉

Valeriana campeſtris inodora major B. pin. album olus Dod. ♀

Valerianellá

Valerianella altera nudo umbilicato, & brevi ſemine Col. ♀

Valerianella cornucopioïdes echinata Col. echinata B. pin. ♀

Valerianella altera tenuifolia ſemine ſcabioſæ ſtellato Col. ſemine ſtellato B. pin. ♀

* Valerianella noſtras major ſcabioſæ ſemine. ☌ ♀

* Valerianella ſemine hirſuto minore rotundo. ☌ ♀

* Valerianella Indica Cluſ ♀

* Valerianella vulgaris major ſerotina. ☌ ♀

* Valerianella umbilicato nudo ſemine oblongo. ☌ ♀

Valerianella ſemine, acinis uvarum ſimili .ſ. hirſuto, extremo umbilicato. ☌ ♀

Verbaſcum mas latifolium luteum B. pin. mas & candela regia Obſ. Lob. ♀

Verbaſcum fœmina flore luteo magno B. pin. album fœmina luteo flore Dod. Gall. ed. ♀

Verbaſcum ramoſum floribus luteis parvis. Candidum fœmina Fuchſ. ♀

Verbaſcum ramoſum floribus parvis albis. ☌ ♀

Verbaſcum nigrum Dod. nigrum flore ex luteo purpuraſcente B. pin. ♀

Verbaſcum perenne nigrum floribus albis. ♃ ☉

*Verbaſcum nigrum Papaveris corniculati folio C. B. P. laciniatum Lugd. ♀

Verbaſcum ſalviſolium fruticoſum luteo flore Ad. & Obſ. Lob. latis Salviæ foliis B. pin. ☉

Verbaſcum ſalviſolium fruticoſum flore purpureo. ♃ ☉

Verbaſcum anguſtis Salviæ foliis B. pin. Phlomis Lychnitis Cluſ. ☉

Verbaſculum pratenſe odoratum B. pin. Primula veris flavo flore elatior Cluſ. ☉

Verbaſculum pratenſe, vel ſylvaticum inodorum B. pin. Primula veris pratenſis inodora luteo-pallida Obſ. & Icon. Lob. ☉

Verbaſculum ſylvarum majus ſingulari flore B. pin. Primula veris pallido flore humilis Cluſ. ☉

Verbaſculum Conſtantinopolitanum. Carchichec Turcarum Cornuti. Idem flore albo, ſulphureo, dilutè violaceo ☉

Verbaſculum ſylveſtre magno, plenoque flore

flore B. pin. Primula veris flore pleno hort. Eyst. ☉

Verbasculum proliferum B. pin. Primula veris gemino flore hort. Eyst. ☉

*Verbasculum majus umbellatum purpureum. ☉

*Verbasculum majus umbellatum album. ☉

*Verbasculum proliferum C. P. B. flore alteri, altero innato purpureo. ☉

*Verbasculum proliferum C. P. B. flore alteri, altero innato luteo. ☉

*Verbasculum minus Alpinum umbellatum purpureum. ☉

*Verbasculum minus Alpinum umbellatum album. ☉

Verbena communis flore cœruleo B. pin. Verbenaca recta Dod. ☉

Verbena Urticæ folio. ♃ ☉

*Verbena nodiflora Matth. ed. B. repens nodiflora Park. ☉

Veronica mas supina & vulgatissima B. pin. mas serpens Dod. ☉

*Veronica spicata angustifolia flore carneo. ♃ ☉

Vero-

Veronica ſpicata minor B. pin. recta minima Cluſ. Eadem ſpicâ roſeâ. ☉
Veronica pratenſis ſerpyllifolia B. pin. minor ſerpyllifolia Obſ. & Icon. Lob. ☉

Viburnum Matth. ed. B. Lantana Dod. ☉

10 Vicia Dod. ſativa vulgaris ſemine nigro B. pin. ♀
Vicia maxima dumetorum B. pin. Cracca major Tab. Eadem flore albo. ☉
Vicia Sepium folio rotundiore acuto B. pin. Aphace Fuchſ. ♀
Vicia multiflora B. pin. Aracus Tab. ☉
Vicia ſylveſtris lutea ſiliquâ hirſutâ B. pin. ♀
Vicia lutea foliis Convolvuli minoris B. pin. Orobanche legumen hiſt. Lugd. ♀
Vicia ſemine rotundo nigro B. pin. Craccæ primum genus Dod. ♀
Vicia ſegetum cum ſiliquis plurimis hirſutis B. pin. Aracus, ſ. Cracca minima Obſ. & Icon. Lob. ♀
Vicia ſiliquis glabris flore violaceo. Minima cum ſiliquis Glab. J. B. ♀
Vicia minima præcox Solonienſis. ♂ ♀

Vicia

Vicia Seſamacea Apula Col. ♃
*Vicia maxima annua foliis ſerratis perperàm authoribus, faba Græcorum. ♃

Viola martia purpurea flore ſimplici odoro B. pin. nigra .ſ. purpurea Dod. ☉
Viola martia alba B. pin. candida Dod. deſcr. martia flore albo hort. Eyſt. ☉
Viola martia inodora ſylveſtris B. pin. ſylveſtris inodora Dod. ☉
Viola martia multiplici flore B. pin. Viola flore multiplici Dod. Eadem flore pleno cinereo. ☉
Viola Alpina rotundifolia lutea B. pin. montana prima Cluſ. ☉
*Viola Granadillæ folio. ♃ ☉
*Viola longifolia montana lutea grandiflora Cam. C. P. B. Violæ montanæ 3. alterum Genus Cluſ. hiſt. ☉
Viola tricolor erecta B. pin. aſſurgens tricolor Dod. ☉
Viola tricolor Dod. tricolor hortenſis repens B. pin. ♃
Viola bicolor arvenſis B. pin. Sylveſtris Icon Lob. ♃

Viola

Viola lunaria major ſiliquâ rotundâ B. pin. Lunaria Græca annua hort. Eyſt. ☿
Viola lunaria major ſiliquâ oblongâ B. pin. Lunaria Græca perennis hort. Eyſt. ⊙

Virga aurea major vel Doria B. pin. Herba Doria Dod. ⊙
Virga aurea latifolia ſerrata B. pin. aurea margine crenato Dod. ⊙
Virga aurea foliis lævibus non ſerratis. ♃ ⊙
Virga aurea anguſtifolia ſerrata B. pin. Solidago Sarracenica Dod. ⊙
Virga aurea Americana foliis ſerratis ſubtus nervoſis. ♃ ⊙
Virga aurea Americana hirſuta. ♃ ⊙
Virga aurea Limonii folio paniculâ uno verſu diſpoſitâ. Mexicana B. pin. app. ⊙
Virga aurea humilis. ♃ ⊙
* Virga aurea longis glabris foliis nervoſis. ♃ ⊙
* Virga aurea ſerratis foliis hirſutis. ♃ ⊙
* Virga aurea Solidago aurea foliis minùs ſpiſſis. ♃ ⊙

Vitex

Vitex Dod. foliis anguſtioribus Cannabis modo diſpoſitis B. pin. Eadem flore albo. ☉

Vitis vinifera Fuchſ.
Vitis Corinthiaca.
Vitis laciniatis foliis Cornuti.
Vitis ſylveſtris, Labruſca B. pin. Labruſca Tragi hiſt. Lugd.

Vitis idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante B. pin. Vaccinia nigra Dod. ☉
Vitis idæa foliis ſubrotundis non crenatis baccis rubris B. pin. Vaccinia rubra Dod. ☉

Ulmus Dod. campeſtris & Theophraſti B. pin.
Ulmus montana B. pin. ſecunda Dod. deſcr. latifolia.

U.

Urtica urens maxima B. pin. ſylveſtris aſperior Obſ. Lob. ☉
Urtica urens minor B. pin. minor acrior Obſ. & Icon. Lob. ☿
Urtica urens pillulas ferens B. pin. Romana Fuchſ. ☿

Ur-

Urtica racemoſa Canadenſis. ♃ ☉

Urtica aculeata foliis ſerratis B. pin. Cannabis ſylveſtris hiſt. Lugd. ♀
Urtica aculeata foliis ſerratis altera B. pin. ſylveſtris ſpuria tertia Icon. Lob. ♀

X.

XYRIS Matth. ed. B. Spatula fœtida Fuchſ. ☉

Y.

YUCA foliis Aloës B. pin. Yuca Ad. Lob. part. alt. ☉

Z.

ZEA, Brisa dicta vel monococcos Germanica B. pin. Monococcon Dod. ♀

*Zea Amylea, vel Zeopyrum Amyleum C. B. P. Triticum trimestre Cordi. ♀

Zeopyron Dod. Zeopyrum, s. Triticospeltum B. pin. ♀

PLAN-

Z.

ZEA, Bella dicta vel monococcos Germanica B. pin. Monococcon Dod. ♃

Zea Amylaceae vel Zeopyrum Amylcum C. B. P. Triticum trimestre Cordi. ♃

Zeopyron Dod. Zeopyrum f. Triticospelum B. pin. ♃

PLAN-

PLANTARUM
IN
HORTO REGIO
BLESENSI

Auctò, Contentarum:

Nemini hucusque Scriptarum:

Brevis & succincta Delineatio.

A.

ACANTHIUM lusitanicum: Vulgari Acanthio simile, nisi quod folia habeat, magis incana, albidiora, densioreque lanugine obdu-

cta; caules emittit altiores, aliquandò quinos, ſenoſve pedes altos. Capita habet minora, cœterâ vulgari ſimile.

♃ Acanthium Illyrico accedens capitibus minoribus, flexuoſis: Illyrico adeo accedit, ut niſi propiùs intuenti, non animadvertitur differentia, caules emittit, non, tam ſpinis armatos: Capita habet minora, quaſique, cernua & flexuoſa.

♃ Aconitum, ſpica florum Pyramidali: Quoad folia & radices; aliorum Aconitorum more, provenit. Solummodò ſpicam fert, florum cœruleorum cucullatorum, ad baſin latiorem; quæ tandem, in Mucronem deſinit Pyramidalem; atque hac notâ quam facillime à cœteris ſuæ ſortis diſtinguitur.

♃ Ageratum purpureum villoſum: Ab Agerato purpureo Dalechampii hiſt. Lugd. neutiquam diſcrepat, niſi quod folia & caules ejus, villis obducuntur; vulgaris autem purpurei Dalechampii, folia ſunt viridia glabra.

♃ Alaternus, foliis ex albo variegatis: Folia habet partìm alba partìm viridia.

♃

☞ Alaternus, foliis ex luteo variegatis: Hujus folia, partìm ſunt lutea, partìm viridia. Utriuſque folia ſic ſunt variegata, ex calce radici ſuppoſita, aut pari mixtura calcis cum terra ruderoſa, ita plurimæ aliæ plantæ, ex hac, aut ſimili mixtura, variegantur in foliis; ut ſolanum lignoſum ſeu dulcamara, clematis daphnoïdes, Ilex baccifera, liguſtrum, Hyſſopus, Roſmarinum, piloſella & cæteræ ludente ſic natura: inſuper nota ex ſeminibus prædictarum, ſatis; provenire plantas, quæ priſtinum recuperant ſtatum, viridémque induunt colorem; éſtque quaſi morbus ſuperveniens foliis, à ſucco, radicibus attracto; qui pangendo, in perennibus durat; ſatione euaneſcit.

☞ Alcea veſicaria capitis bonæ ſpei: A vulgari Alcea venetorum, in paucis differt, niſi quod caulem producat rectum, firmum, pedalem aut ſeſquipedalem; folia habet firmiora rotundiora & Glabriora florémque majorem, elegantioriſque coloris, cæterâ ei par.

♃ Alchimilla minor: Vulgari Cluſ. in omnibus accedit, niſi partium parvitate. Eſt enim triplo vulgari, in omnibus minor, ejuſque folia dilutius virent.

♃ Alſine inaperto flore .ſ. unicaulis noctiflora: Caules producit triunciales, quorum nodis apponuntur bina foliola, è regione diſpoſita, mucronata, linguæ paſſerinæ ſimilia, in caulium ſummis naſcuntur flores, ſinguli, quinis petalis albis, ad medium bifidis (aliarum Lychnidum & alſinarum more) conſtantes. Qui vix interdiu, lucente ſole conſpiciuntur: propter tenuitatem partium: hoc valde familiare eſt, pluribus Lychnidum. Creſcit in arvis, ſylvoſis humidis & udis.

♃ Alſine ſpergula, ſemine foliaceo nigro; circulo membranaceo albo, cincto: Vulgari ſpergulæ, quoad reliquas omnes partes, adeò eſt ſimilis, ut paſſim in agris arenoſis conſpicere licet, nec diſtingui à vulgari poterit niſi ſemine, quod eſt compreſſum foliaceum ſeu membranaceum, album exteriùs, circularitèr cingens in medio, ſemen nigrum.

nigrum. Reperitur & alia, prope rupellam: cujus ſemen in medio eſt compreſſum fuſcum, circulo paritèr foliaceo albo cinctum; vulgaris autem ſpergulæ ſemen eſt rotundum, Alſines vulgaris modo.

♃ Althæa peregrina, ſemine roſtrato, flore luteo minimo: Hujus folia ſunt quaſi carpini foliorum æmula, bina è regione, caulem ambientia, rotundum, ſeſquipedalem, in cujus ſummis faſtigiis, innaſcuntur floſculi lutei, minores, quibus deciduis ſuccedunt, arctè in circulum diſpoſita, ſemina, aculeis pungentia; Unde roſtrati ei nomen impoſuimus.

♃ Amaranthus ſpica erecta: Eſt flore obſoletè rubro, viridique, cujus utriuſque ſemen eſt nigrum; vel ſpica eſt erecta, cujus ſemen eſt album.

♃ Amaranthus auriculatus: Species eſt Amaranthi; quinquageſimo ſeptimo anno, ſupra milleſimum, ſexcenteſimum, detecta; & ex Americæ inſulis adjacentibus, in Angliam delata. Cujus ſingula folia, ad appoſitionem, bina habent foliola Lobata, ſ. auriculata, qua nota, ab

omnibus aliis (multos ante annos) detectis, differt éſtque à flore .ſ.ſpica florum, aut luteus, aut ſtramineus, ruber aut phœniceus, ſpicatus vel criſtatus.

☞ Amygdalus pumila: Bipedalem habet altitudinem, vix pollicarem craſſitiem, obtinent ejus caudices, in quorum ſummis alis, ſub exitum hyemis proveniunt floſculi Coloſſini coloris, minores; Amygdali majoris more; quibus ſuccedunt paritèr fructus parvi triplo minores, Amygdali vulgaris fructu.

☞ Anagallis omnium minima: Planta eſt in humidis proveniens, vix biuncialis, floſculos gerit cœruleos, vulgaris Anagallidis triplò minores; capſulas ſeminales paritèr minores.

☞ Anonis purpurea non ſpinoſa: A vulgari nulla nota differt niſi quod ſpinis Careat.

☞ Anonis montana præcox, purpurea fruteſcens: Suffrutex hic, eſt Bipedalis, Trifolii ſpecies, perpetua fronde virens, flores fert pendentes leguminoſos .ſ. Papileaceos, elegantèr purpureos: exeunte hyeme floret; quorum ſingulis ſuccedunt

cedunt ſingulæ ſiliquæ, hirſutæ biuncia-les, natricis Plinii ſiliquis, multò craſſi-ores, ſemina in ſe continentes majora; deliquia (cœterarum Anonidum, ſemi-num more) patientia, qua nota ſpecifica, indigitantur Anonides, à cœteris, trifo-liorum claſſibus. Perperàm ergò Pari-ſienſibus Botannicis, cicer perenne (me diſcipulo ſub Veſpaſiano Robino) di-cebatur.

♃ Anonis purpurea, erecta annua mitis: Hujus caules ſunt Bipedales nonnun-quam Tripedales erecti, in quorum ſum-mis faſtigiis ſpicatim, proveniunt floſ-culi. Dilutè purpurei, quibus fatiſcen-tibus ſuccedunt, Siliculæ lentiformes, erectæ, vulgaris Anonidis ritu, ſemina in ſe continentes, deliquium patientia, quæ eſt nota eſſentialis, & Generica, A-nonidum omnium. Et præcipuè, hac nota ab omnibus aliis trifoliis diſtingui-tur: ut clarius docebimus, in univerſali noſtra Hiſtoria Plantarum, per Tabulas cognationis diſpoſitarum.

♃ Apocynum Canadenſe foliis Andro-ſæmi: Planta eſt radice longè latéque

per terram ſubtûs repente, prædita; caules ſuggerente Bipedales, quibus binatìm, adhærent folia Androſæmi foliorum adinſtar: in caulium ſummis enaſcuntur flores obſoletè rubri. Quoad formam, aliorum Apocynorum floribus accedentes. Quibus euanidis ſuccedunt, ſiliquæ oblongæ, in medio craſſæ, membranaceæ, Aſclepiadis aut Apocyni vulgaris, ritu, ſemina continentes compreſſa, ſubrufa, intermixta, materiæ cuidam pappoſæ ſuccum lacteum Apocynorum more, quælibet pars rupta fundit.

♃ Apocynum Canadenſe, anguſtifolium flore aurantio: Hæc Apocyni ſpecies vix Bipedalem, excedit altitudinem, folia gerit, anguſta longiora multò Apocyno ſurrecto umbellifero Cornuti; in caulium ſummis faſtigiis, flores aureos aut aurantii coloris gerit. Quibus ſingulatìm, ſuccedunt ſiliquæ membranaceæ, pappoſæ materiæ, intermixta ſemina compreſſa rufa (cæterorum ritu) gerentes.

♃ Apocynum Virginianum, flore herbaceo ſiliqua longiſſima: Hujus folia

ſunt

ſunt lata glabra Bedelzar Arabum foliis, magnitudine accedentia. Caules habet ternos quaternos, pedes altos: ſubrubros, in ſummis alis caulium proveniunt floſculi herbacei, ejuſdem cum cœteris ſuæ ſortis, formæ; ſed multò minores, quibus flaccidis ſuccedunt ſiliquæ, Dodrantales tenuiſſimæ, pappoſam materiam, & ſemina compreſſa, aliorum more continentes. Lacteſcit etiam aliorum Apocynorum & Aſclepiadum modo.

♃ Argemone capitulo longiori, glabro: Folia habet magis diſſecta, quam ſunt papaveris Rhæadis folia, minùs autem, quam ſunt Argemones; capitulo hirſuto. Florem fert Phœniceum, cui ſuccedit capitulum biunciale, glabrum, per loculamenta triangularia, continens minuta ſemina, aſpera, aliorum papaverum tum Argemonarum modo.

♃ Artemiſia foliis variegatis: Sola variegatione foliorum, à vulgari Artemiſia differt.

♃ Arum Indicum bicubitale, amplo flore: Folia habet ampla, cannacori æmula, è quorum gremio, ſurgit caulis bicubitalis,

in

in ſummo gerens florem amplum, album Lilii candidi flore multò majorem, unifolium cui deciduo, ſuccedunt, racematim, in ſpica, grana plurima rubra, ſpicatim ſeinvicem contingentia, vulgaris (ut paucis dicam) ritu, diſpoſita.

♃ Aſter ſerotinus, anguſtifolius, Canadenſis flore cœruleo: Planta eſt longè latéque ſerpens, caules emittit tripedales, foliis anguſtis glabris, ſaturè virentibus, è regione diſpoſitis onuſtos. E ſummis caulium exeunt floſculi, cœrulei; ſub exitum æſtatis, aut ineunte hyeme, aliquando tardiùs: cœterorum more, in pappum abeuntes.

♃ Aſter præcox, flore cœruleo majore: Hæc, Canadenſis ſeu exotici aſteris, eſt ſpecies, caulis humilior flos major (ſi comparetur cum ſequenti congenere) media æſtate floret cœrulei coloris eſt.

♃ Aſter elatior flore cœruleo minore, Bellidis minoris: Hic longe ſub terram hac, Illac, repit ſerpitve; caules emittit tripedales, foliis anguſtis glabris, ſaturè virentibus, è regione diſpoſitis, onuſtos. Flores ſuſtinentes, (quoad magnitudinem)

nem) Bellidis minoris, ſed cœrulei coloris verſus hyemis initium (cœterorum more) in pappos abeunt.

☞ Aſter Tripolii flore latifolius: Hic omninò accedit minori, Narbonenſium. Si non quod folia producat glabriora & latiora, floreſque paulò majores, deniq; tota Planta eſt major, quoad omnes ipſius partes.

☞ Aſter Conyzoïdes Monſpelienſium: Eſt planta Bipedalis, cujus folia ſunt villoſa .ſ. lanuginoſa, Conyzæ in modum, quin & contrectata ejus folia, Conyzæ odorem ſpirant. In ſummis, caulium faſtigiis, flores fert luteos, multos, imo ad alas foliorum, quibus deciduis, ſuccedunt ſemina ſolida Anguloſa, qua nota debet jure merito appellari, Chryſanthemum Conyzoïdes Monſpelienſium. Conyzoïdes apte dicitur, quia Conyzæ habet odorem. Monſpelienſis dicitur quia frequentèr circa oppidum illud reperitur. Omnis aſteris flos, abit in pappos, qua ſola nota eſſentiali & generica, differt aſter, à Corymboſis ſeu Corymbiferis, quippe producentibus, flores

flores etiam ſtellatos, quemadmodum aſter, ſed ſemina ſolida, ergò potiori jure Chryſanthemum Conyzoides Monſpelienſium denominabitur, ut clarius demonſtrabimus in tabulis noſtris cognationis. Conyzæ fundit odorem, ſed nec odor nec ſapor, nec color indigitant plantas, per ſe, ſed per accidens tantùm: ad deſignandas ſpecies, ſubalternas inſerviunt. Idem dicendum de aſtere luteo, foliolis ad florem rigidis, itèm de aſtere cernuo col. ſeu foliis circa florem mollibus; paritèr de aſtere Attico ſupino Dod. & multis aliis hujus Farinæ, ab Authoribus, aſterum claſſi aſſignatis, ut prolixius in Tabulis affinitatis ſeu cognationis, clare demonſtrabimus.

♃ Aſter ramoſus annuus Canadenſis: Hæc planta folia producit oblonga, in margine ſinuata, ſupernè hirta, caules edit Bipedales ramoſos, flores albos, Bellidis inſtar. Qui abeunt in pappos: ergò aptiùs retulimus, ad ſuæ claſſis conſortes. Nempe pappeſcentes, vide Bellis ramoſa umbelliſera Cornuti in horto Regio Bleſenſi.

Atriplex

Atriplex folio haſtato ſeu Deltoïde: Hæc atriplicis ſpecies paſsìm in foſſis. Suburbanis provenit, folio eſt Triangulari acuto, mucronato, haſtæ cuſpidi ſimili: caulibus procumbentibus, pedalibus & ſeſquipedalibus; pediculis longis innixo. In quorum ſummis alis, ſemina multa proveniunt: ſingula binis foliolis (ut in Atriplice ſativo, Polygani folio, marino, aliiſque) incluſa.

Atriplex procumbens folio ſinuato craſſo: Planta pedalis, procumbens, folia habet ſinuata in margine, ut plurimùm & caules & folia ſunt rubra; ſemine onerantur ſummi caules, racemoſo, cœterarum ſylveſtrium more.

B.

BELLIS pratensis duplici petalorum serie: Non alià ratione differt à Bellide pratensi vulgari, nisi quod natura luxuriante, duplicem petalorum latorum, umbonem luteum cingentium, seriem profert.

Bellis hortensis flore Herbaceo: Hortensi in omnibus convenit, nisi quod florum petala, in folia herbacea degenerent.

Bellis hortensis flore prolifero: Hæc notu facilima, ex primo intuitu, quia plures flores exeuntes, ex uno, (Calendulæ proliferæ more) producit.

Bellis ramosa umbellifera Cornuti: Cum ejus flos abit in pappos, ad Asteris classem retulimus vide suprâ, Aster ramosus annuus Canadensis.

Bellis Virginiana densiori folio: Folia habet latiora, serrata, densiora, quam ulla, Bellidum sylvestrium majorum majoréque fert flores. Forte Bellis alpina Cas. Banh. in prodr.

℣ Bellis radice repente, foliis latioribus ſerratis: Hæc omnium Bellidum majorum, folia habet latiora magiſque ſerrata, flores itidem maximos, radices longe latéque ſubter terram, repentes.

℣ Bellis montana minor & major Tanaceti folio: Vide Tanacetum montanum inodorum flore majore & minore in horto Regio Blæſenſi auctо. An non potiore jure Bellis Tanaceti folio, deſignatur. Examinent quicunque voluerint.

℣ Beta radice vulgaris, coſta ampla aurea: Hujus folia ſunt Platyneura, aliquando aurea, aliquandò rubra, nonnunquam alba.

℣ Blattaria folio verbaſci, flore luteo amplo: Hæc folia habet verbaſci, Incana mollia, mucronata, è quorum gremio exit caulis, Bipedalis aut Tripedalis, in faſtigio, gerens flores luteos, amplos verbaſci inſtar. Quibus tamen deciduis ſuccedunt, capſulæ bivalves, ſeu binis loculamentis, diſtinctæ. Non in Pyramidem verbaſci capſularum more, ſed ſunt craſſæ, rotundæ; qua nota ſola à verbaſco diſtinguitur Blattaria.

℣

♃ Blattaria purpurea radice perenni. Folia edit incanè viridia, sinuata, flores los cœruleos, quatuor petalis conflatos quibus deciduis succedunt capsulæ, pi oris capsularum æmulæ, similiaque in se continentes semina. Datur & hujus spe cies foliis majoribus, Symphyti foliis quam proxime accedens, quæ flores e dit elegantèr carneos vel gilvos. Cap sulasque edit minores; natura est adeò intenta productioni, hujus: longè la téque rependo ut vix in Gallia, multò minùs in Anglia, semen suum perficiat.

♃ Blitum Polyspermon, folio elatines subrotundo: Hæc Bliti species folia habet, hirta, seu villosa, subrotunda, quem admodùm elatine folio subrotundo; binatim è regione, cingunt, caules pedales & sesquipedales; ad alas, enascuntur racematim semina multa subnigra aut fusca, lata tumidiuscula: viridibus capsulis minimis (Atriplicis aut Bliti modo) contenta.

♃ Brunella Alpina, glabro folio, angusto, integro: Folia edit mucronata, glabra, angusta rigida, caulibus semi-

pedalibus

pedalibus è regione adnascentia: quorum summis apicibus verticillatim, densè dispositi, innascuntur flores, galeati cœrulei, nonnunquam purpurei, qui decidui, capsulas verticillatas, in spicam degenerantes, relinquunt: aliarum prunellarum more.

♆ Brunella Bætica annua foliis laciniatis: Folia inferiora profert sinuata, per terram strata, caulescente planta: folia edit laciniata, è regione disposita. Summis caulibus innascuntur, verticillatim ampli flores cœrulei, qui exsiccati, relinquunt spicatim, seu densissimè dispositas capsulas verticillatas quinquefariam in margine partitas; vide Melissa Bætica in horto Regio Blesensi aucto, cum qua nullam habet affinitatem sed omninò Brunellæ accedit. Ut clariùs postea docebitur.

♆ Buglossum lusitanicum bullatis foliis: Hæc Buglossi species, folia (si seratur autumno) exeunte hyeme profert viridia, bullis albis elegantèr conspersa: è quorum medio, exit caulis, dodrantalis, aliquando pedalis, per terram stra-

tus, in ſummitate, ſuſtinens flores elegantèr cœruleos, parvos quadripartitos, quibus deciduis, ſuccedunt ſemina, viperini capitis æmula, aliorum Bugloſſorum more. Hujus eſt, & alia varietas, priori in omnibus ſimilis, niſi, quod flores edit rubros ſtriis albis, elegantèr pictos.

♃ Bugloſſum procumbens annuum, pullo minimo flore: Hujus cauliculi Bipedales per terram ſtrati ſunt, folia gerunt villoſa, floreſque minimos; pulli ſeu obſcurè ferruginei coloris; Bugloſſi in modum, undè aptiùs Bugloſſum minimum procumbens, pullo flore, dicitur. Quam Echium; quia Echium, ſeu Lycopſis, flore donatur corniculato integro: qua nota, ab invicèm diſtinguentur, Bugloſſum: Echium ſeu Lycopſis, ut in Tabulis noſtris cognationis, clarius patebit. Vide Echium procumbens, floſculis atrorubentibus; in horto Regio Blæſenſi aucto.

♃ Buxus foliis aureis: Sola variegatione foliorum, à vulgari differt: quod in multis aliis arboribus, fruticibus, & ſubfruticibus, plantiſque, accidit. C.

C.

ℭ CAchrys peucedani foliis, ſemine fungoſo ſulcato: Hujus folia ſunt diſſecta, peucedani inſtar, caules Bipedales, umbellas ſuſtinent luteas, quibus fatiſcentibus, floribus ſingulis, ſuccedunt bina ſemina, ſtriata, fungoſa ſubſtantia incluſa, oblonga, nucis Myriſticæ, ferè magnitudine, Melonum inſtar ſulcata, à lævitate una, ſemine ſulcato lævi, altera ſemine ſulcato aſpero dicitur. Hinc, duæ ſpecies, ſola ſeminis fungoſa ſubſtantia, lævi & aſpera ſulcata, diſtinctæ, utraque ſpecies, folia gerit peucedani. Vide Libanotis Cachrifera, ſeu Cachrys verior, in horto Regio Bleſenſi aucto; cujus folia ſunt ferulacea, aut fœniculacea ſemina itidèm ſtriata gerit, ſubſtantia fungoſa, plana, incluſa, nucis Myriſticæ paritèr ad formam, & quaſi magnitudinem.

ℭ Calceolus mariæ luteus: Folia vulgaris edit, flores ejuſdem formæ niſi

quod luteos gerit, éſtque Helleborines ſpecies, à forma floris, ſic denominatur Calceolus mariæ.

Campanula .ſ. viola pentagonia perfoliata; Hujus folia ſunt ſerrata, ſubrotunda, binatim ex adverſo, caulem ambiunt Dodrantalem: ita, ut ab ipſo caule perforari, videantur. In ſummis, caulium, naſcuntur flores, Campanulati, violæ Pentagoniæ vulgaris æmuli, quibus ſuccedunt Siliculæ pares, Triplici loculamento diſtinctæ, ſemina Pellucida, ſubrufa, paria, cum vulgaris, Campanulæ ſeminibus: continentes.

Campanula .ſ. viola Pentagonia folio oblongo latiori: Hæc vulgari perquam ſimilis, niſi quod folia edat longiora, latioraque: totaque planta eſt major vulgari. Reperimus & vulgarem, intra ſata, Regiæ Chambort, flore cœruleo pleno, utraque hæc ſpecies lacteſcit aliarum Campanulatarum more. Vide Onobrychis arvenſis in horto Regio Bleſenſi aucto.

Carduus Leucographis .ſ. mariæ hirſutus, capitulo minore: Hic Carduus folia edit

edit longiora, & anguſtiora, obſcurè maculata, ſecundo anno caulem emittit Bipedalem, aut Tripedalem, in cujus cimis naſcuntur capita, minora, purpureos ferentia, tubulos, ſeu, flores; quibus fatiſcentibus, ſuccedunt, ſemina rotunda, Craſſa, & ſolida: annua eſt planta.

♃ Carduus mariæ non maculatus: Carduo vulgari mariæ, in omnibus accedit: niſi quod folia edit maculis .ſ. lineis albis, deſtituta.

♃ Carduus Leucoii foliis: Planta eſt pedalis aut ſeſquipedalis, cujus caulem ambiunt ex adverſo diſpoſita, bina folia Leucoii murorum ſeu Keiri inſtar: ſupernè viridia, ſubtûs ſeu infernè incana, ad quorum appoſitionem ſunt binæ ſpinæ. Floſculos gerit minimos, purpureos, qui in pappos reſoluti, relinquunt ſemina Craſſa, magna ſatis, pro plantæ tenuitate.

♃ Carduus exoticus minor, albis maculis notatus: Hic autumno ſeſe ſerit. Atque per hyemem folia per terram ſtrata gerit; laciniata, elegantèr lineis albis notata. Caules pedales & ſeſquipedales,

caputque parvum rubrum fert, cui pappeſcenti, ſuccedunt, ſemina glutinoſa, pappo, incluſa. An Carduus Galactites Joh. Bauh. paſsim ſecus vias, prope Monſpeſſulum reperitur.

♃ Carduus Polyacanthæ æmulus, ſeu alatus; Polyacanthæ, capitulis æmulus: Hic Carduus ad Tripedalem, nonnunquàm ad quadripedalem aſſurgit altitudinem. Caulem habet, quatuor alis undulatis cinctum, folia obſcuriùs virent, in margine criſpa, rarioribus & mitioribus ſpinis, quam Polyacantha, armatur: Hic Carduus paſsim, ſecùs viarum margines, circa Londinum, Blæſas, pariſios, & cœtera (id genus) loca, provenit copioſe. Floſculos capitatos, in caulium faſtigiis gerit, rubicundiores pauloque majores, Polyacanthæ Theophr. ſaturatius rubeſcunt flores: nonnunquam variat flos, colore albo, cœterorum carduorum rubro colore, præditorum; more.

♃ Carduus Sphærocephalus annuus Bæticus minor: Hic cœteris Carduis Sphærocephalis, minor eſt. Vix Bipedalem excedit

excedit altitudinem: flores cœruleos minores, globulatim fert; capita etiam minora, sed semina multò, cœteris suæ familiæ seminibus majora fundit.

℣ Caryophyllata montana minor, flore nutante purpureo: Hæc à Caryophyllata majori vulgari; flore purpureo nutante descripta, differt, in hoc, quod folia edat glabra, minutiúsque dissecta, totaque planta minor est.

℣ Caryophyllus omnium humillimus & minimus: Hic in montibus Pyrenæis, & alpibus provenit, pediculos profert unciales & biunciales, sustinentes flosculos minutos, rubros, laciniatos, folia gerit tenuia, muscosa, undè muscosus appellari, meretur.

℣ Caryophyllus marinus minimus flore globoso: Hic, folia tenuia, ternas quaternas uncias, longa, flores globosos, omnium hujus generis, minimos fert, eorum qui in maritimis nascuntur. Arearum aut Ambulacrorum margines, hoc conseri (cum propter perennitatem foliorum, tum amœnitatem florum per æstatem durantium) solent.

Centaurium purpureum minimum: Caules biunciales vel triunciales ramatim fert, flores purpureos, semina & capsulas seminales, centaurii vulgaris minoris modo, fert. In humidis (circa stagna) locis, provenit.

Centaurium luteum minimum: Hæc plantula etiam in humidis vegetat: vix Palmaris est; flosculos gerit luteos: capsulas, plurima minuta semina (vulgaris more) in se continentes, habet. Forte luteum novum colum.

Chamæcistus halimi folio oblongo: Hic subfrutex ad pedalem ut plurimùm aliquando Bipedalem assurgit altitudinem, folia profert oblonga, mucronata, incana, halimi instar. In Glareosis & Arenosis, circa caput Cenomanorum, copiosè conspicitur flores fert luteos, quibus labentibus, succedunt capsulæ, triangulares; minuta multa subrufa semina in se continentes cæterorum Chamæcistorum ad modum. Vide Petrum Belonium Cenomanum.

Chamæcistus annuus erectus: Hic caules rectos palmares & sesquipalmares,

res, producit; floſculos minimos luteos, quinis petalis, luteis, donatos profert. Quibus decidentibus, ſuccedunt (aliorum more) capſulæ triquetræ. Ad cellam Eremitarum, Milliari, Bleſis diſſitam; prope pagum dictum la Chauſſé & circa pictavium copioſè reperitur; eſt minor ſpecies Ciſti, folio Salicis Cluſ. ad pedalem altitudinem rectè aſcendentem, circa pictavium reperimus.

℞ Chamæmelum inodorum; ſeu cotula inodora ſemine nigro: In ora maritima Armoricæ, ſatis frequens occurrit; hæc planta, cujus folia, ſunt Cotulæ vulgaris fœtidæ foliis, magis diſſecta, Fœnieuli, quaſi modo, obſcuriùs virent: quin & florum petala, ſunt multò ampliora, longiora, diſcum luteum cingentia. Quibus fatiſcentibus ſuccedunt ſemina nigra, éſtque hujus ſpecies, quæ in hortis colitur, & Cotula inodora flore pleno dicitur, quæ pangendo, propagatur. Semen itidèm habet nigrum, quemadmodùm, obſervavimus & penes nos impreſentiarùm habemus, plurimæ ſunt plantæ præcipuè annuæ, etiamſi flore pleno

pleno donentur, tamen ſemen producunt. Ut clariùs Enucleabimus in Hiſtoria generali, ſeu univerſali, Plantarum: per Tabulas cognationis, ſeu affinitatis, diſponendarum.

♂ Chelidonium majus, foliis tenuiſſimè diſſectis: Sola foliorum inciſione, multò tenuius, diſſectorum à Chelidonio foliis quernis differt: nam florem fert, laciniatum itidem; quare ex hujus ſemine, creditur eſſe degener planta. Nam ſemen ex hoc collectum, & à me ſatum: Chelidonium foliis quernis laciniato flore, produxit.

♂ Chryſanthemum Hiſpanicum, tenuifolium: Folia habet minùs tenuiter diſſecta, quam Achillea montana, floremque duplò majorem: utrumque & hoc & Achillea montana: Chryſanthemum, ferulaceis foliis nobis dicitur.

♂ Chryſanthemum Canadenſe latifolium altiſſimum: Ad quinos ſenoſve octonos nonnunquam pedes, aſſurgit caulis, craſſus, ſupra pollicarem craſſitudinem, quem cingunt alternatim, folia rugoſa oblonga, lata, plantaginis majoris

(quoad

(quoad formam) majora. In ſummis caulium faſtigiis, fert flores luteos diſcum luteum ambientes: (numiſma, dimidium taleri) vix æquantes; quibus exſiccatis ſuccedunt ſemina anguloſa, quaſi floris ſolis ſemina; ſed minora.

♃ Chryſanthemum Canadenſe latifolium humilius: Hoc vix Tripedalem excedit altitudinem, foliis, priori, quam proximè accedit, flores multò minores; ſemina paritèr minora: ejuſdem tamen figuræ, cum præcedentis ſemine.

♃ Chryſanthemum Americanum laciniato folio majus: Caules producit tricubitales, ad quorum nodos, apponuntur folia laciniata, magna, dilutè viridia: flores fert Corymbiferos luteos, quibus deciduis, ſuccedunt ſemina quadrangula, oblonga; quæ declarant, non eſſe Doronicum. Cum omnis Doronici flos abit in pappos.

♃ Chryſanthemum Americanum laciniato folio, obſcuriùs virenti, minus: Hoc à priori differt quod ſit humilius, folia gerit minora, magis laciniata, & obſcuriùs virentia, floreſque minores,

utrumque

utrumque & ſuperius, & hoc ſemen fert ſolidum quadrangulum; neutrum pro Doronico haberi debet: Ut vult Johan. Parkinſon, cum utriuſque ſemen ſit ſolidum, Chryſanthemi more; multò minùs, eſt Aconitum ut vult Jacobus Cornutus; omnis Aconiti flos eſt Cucullatus, producens ſiliquas membranaceas, quaternas quinas: multa minuta ſemina rugoſa, in ſe continentes .ſ. nigra .ſ. rufa, ergò aptius, denominatur Chryſanthemum, & redarguendi ſunt authores, qui non norunt diſtinguere inter aſterem, Doronicum, Conyzam, Helenium & cæteras pappeſcentes, & Corymboſas: ſolida producentes ſemina. Atque hæc dixiſſe impræſentiarùm ſat. eſt.

36 Chryſanthemum Canadenſe minus, alato caule: Hæc Chryſanthemi ſpecies, folia habet glabra, anguſta, ſecundum longitudinem caulium, producta, adeò ut alatus caulis dici poſſit. Caules habet Bipedales Tripedales, flores ſuſtinent luteos: quibus deciduis ſuccedunt, ſemina ſolida quadrangula, minimè autem in pappos abeunt Aſteris inſtar: ergò

malè

malè à Jacobo Cornuto Aſter alatus luteus dicitur, ut videre eſt in horto Regio Bleſenſi aucto, & in Parkinſono ſub Aſteris nomine, quam bene Judicent lectores.

℞ Chryſanthemum Canadenſe bidens, alato caule: Omnium Chryſanthemorum exoticorum, altiſſimum eſt hoc; caules edit ſenos ſeptenos, nonnunquam duodenos excedentes pedes, quibus, adhærent folia aſpera, oblonga, ad appoſitionem, alas conſtituentia, ſecundum longitudinem caulis. Undè alato caule dicitur: flores in cimis caulium, Corymbatim fert, luteos; umbonem luteum cingentes, valdè exiguos, pro magnitudine plantæ vix Calendulæ flores æquant: quibus fatiſcentibus ſuccedunt ſemina, ſubrotunda compreſſa, binis aculeis, in ſuperiore parte ſeminis prædita. Undè bidens (adinſtar Chryſanthemi Cannabini) appellandum, judicavimus. Malè ſub Helenio Canadenſi in horto Regio Bleſenſi. Quædam horum nominantur ut hoc Helenium Canadenſe prælatum, alato caule Aſter virgineus

gineus luteus, membranaceo caule Park. ex semine. Chrysanthemum Canadense bidens, melius nominatur; legentium & perpendentium, esto judicium.

♃ Chrysanthemum Cannabinum Americanum: A nostrate, cognitu facile, quippe caules edit quadripedales, subrubentes firmiores & rectiores, flosculos, ex multis staminulis luteis, conflatos habet: & semina bidentia, multò, vulgaris Chrysanthemi Cannabini, seminibus majora; vestibus paritèr adhærentia, pari modo ut nostras fert: malè in horto Regio Blesensi pro Eupatorio, cum authoribus aliis scribitur. Ut postea ad Oculum demonstrabitur.

♃ Cicer arietinum, fructu nigro: Solo fructus colore, à Cicere arietino fructu rubro, & fructus ipsius parvitate, & figura, utriusque enim flores sunt rubri.

♃ Clematis peregrina flore parvo: Hæc Clematidi peregrinæ in omnibus accedit: nisi quod flores profert duplò minores, aut rubros aut albos: semina paritèr minora, ejusdem cum priorum feminibus, formæ.

♃

℥ Clematis Tetraphyllos Americana: Ex inſpectione quaternorum foliorum cruciatim diſpoſitorum, citò dignoſcitur; nec ſemen nec florem nobis conſpicere licuit: ſcandere (adhibito baculo) obſervavimus.

℥ Clematis Hederæ folio: Planta eſt ſcandens & circa perticam ſeſe involvens ad altitudinem quinorum pedum, plus minuſve aſcendit; cujus folia ſunt Hederæ, æmula, latiora; flores fert minores, herbaceos; fructum nunquam vidi. Malè citatur in horto Regio Bleſenſi. Convolvulus Hederaceus perennis, cum Convolvulo propriè dicto, lacteſcente, florem unifolium gerente, nullam habet affinitatem, niſi quod ſcandit.

℥ Cochlearia, armoriça flore parvo, ſubpurpureo: Hæc minor eſt ſpecies, Batavicæ; folia ei ſimilia edit, ſed minora, anguloſa, flores etiam minores, ſubpurpureos, ſeu dilutè purpureos: quibus ſuccedunt, Siliculæ bivalves, minores aliarum Cochleariarum more, ſemina in ſe minora paritèr continentes.

℥

Conſolida regalis hortenſis, flore minore verſicolore: Seu Delphinium minus verſicolor: folia habet, hortenſis Delphinii vulgaris foliis tenuius diſſecta, flores minores rubros, ſtriis nigris maculatos; & eo ipſo nomine, ab aliis quam facillimè diſtinguitur.

Convolvulus minor argenteus, ſ. incanus radice repente: Radices ut cæteri, ejus claſſis, ſub terram, repentes, habet: folia producit ſubrotunda, incana: flores, Coloſſinos, ſeu purpureos & albos, quorum ſingulis ſuccedunt ſemina, nunc plura, nunc pauciora, angulpſa: paſsim, ad oram maritimam, circa Rupellam, ſpontè provenit.

Conyza acris, annua, alba: Planta eſt Bipedalis, cujus folia ſunt oblonga, ſerrata in margine; villoſa: flores gerit ramatim, in ſummis caulibus, albos: erigeri, ſeu Conyzæ acris cœruleæ, more, quin Acria Guſtui, ejus folia maſticata; ſtatim apparent. Flores decidui in pappos abeunt, & vento Aſportata ſemina, copioſè ſeſe ferunt, per agros, tam in ſylvis quam vinetis Galliæ, Angliæ paſsim,

sìm. Aſter Canadenſis annuus, malè in horto Regio Bleſenſi aucto nuncupatur, quin & pariſienſibus, Aſter Canadenſis (me diſcipulo) dicebatur, ſed cum non ſtellatum gerit florem, ſed Erigeri aut potius Conyzæ cœruleæ, cui ſapor acris accedit, aptius (mea opinione) Conyza acris alba; quam appoſitè Canadenſis dicitur (cum paſsìm reperire eſt) Judicent lectores.

☞ Cotyledon, radice tuberoſa, longa, repente: Hæc Cotyledonis ſpecies priori, ab Authoribus diſcriptæ, quam proximè accedit, niſi quod folia gerit majora, ſpiſſiora, nec circularitèr, ſcutellam .ſ. Cotyledonem effingunt: Sed juxta, pediculi, ſuperiorem partem aperta; nec circularitèr clauſa, prioris & majoris modò, quin & radicem, non promit rotundam & tuberoſam, rapi inſtar, ſed longitudinalitèr porrectam, & ſub terram repentem, à qua exeunt fibræ multæ exiles, quibus nutritur radix. Flores & ſemina vulgaris modo, habet.

Cynogloſſum folio molli, incano, flore cœruleo ſtriis rubris variegato: Hæc Cynogloſſi ſpecies, folia vulgaris foliis, multò producit minora, mollia, incana. Caules profert Bipedales, quorum ſummis innaſcuntur: flores dilutè cœrulei, ſtriis rubris variè ducti: quorum ſingulis deciduis, ſuccedunt quaterna ſemina (vulgaris & aliorum more) aſpera veſtibus adhærentia, multò minora, rotunda: palsìm ſecus vias; circa Blæſas provenit.

D.

Dentaria Monophyllos, Anapodaphyllon pariſienſibus: Nominabatur; planta eſt vernalis, caulem è terra Palmarem erigens, cujus apici innitur folium ſub exortum complicatum proceſſu temporis extenſum, orbiculatìm, rotundum, ſinuatum, in margine, ad caulis prædicti exortum, è terra projumpit pediculus, triuncialis plus minuſve;

nuſve; ſuſtinens. Florem, quinis petalis albis, donatum; cui deciduo ſuccedit capſula, nucis Avellanæ magnitudine, multa minuta in ſe continens ſemina.

♃ Dentariæ affinis, Echii flore, capſula rotunda: Hæc planta ineunte vere, folia promit, ſub exortum, Aſtranſiæ aut Diapenſiæ ſimilia, tandem Dentariæ referunt folia, inter quæ exit caulis Palmaris, flores ſuſtinens quaternos, quinos, albos. Echii floribus ſimiles; quibus evaneſcentibus ſuccedunt capſulæ rotundæ Anagallidis capſularum inſtar: ſemina ſolida in ſe continentes, aſperulæ odoratæ ſeminibus quaſi paria.

♃ Digitalis Virginiana Lyſimachiæ facie, foliis ſubrubentibus, flore violaceo minore: Hæc Digitalis ſpecies, caules promit Bipedales ſubrubentes, quos ambiunt per intervalla bina folia mucronata, Limonii majoris (primo ortu) foliis haud abſimilia, inter quæ ſeſe erigit caulis cubitalis, lignoſus, rotundus, purpuraſcens: cui ad ſingula genicula, ex adverſo bina adnaſcuntur folia, Lyſimachiæ quodammodò, æmula, arctè adeo

caulem cingunt, ut perfoliata planta, dici meritò possit: ex alis ad genicula superiora, enascuntur pediculi, alios procreantes, quibus innascuntur flores, calice & forma Dactylothecæ seu digitalis ferrugineæ minoris, æmuli, dilutè violacei, ore non alitèr, quinque incisuris, tribus propendentibus, duabus erectis, diviso; per margines hirsuto: in fundo autem tubi seu floris, quatuor staminula arcuata latent, horum singulorum extremo, aliarum digitalium more, duo apponuntur testiculi rubelli, lentiformes, in superiore floris parte. Est autem stilus (propendens versus inferiorem partem) luteus lanuginosus. Succedunt, post evanidum florem Thecæ bicapsulares in mucronem acutum bifurcatum desinentes: continentes in se semina infinita minuta, digitalium omnium more.

♃ Digitalis foliis maximè serratis: Vide, galeata & verticillata, Perficæ foliis, digitalis æmula: post Horminum & Hyssopum infrà.

♃ Digitalis latifolia flore ferrugineo: Hæc Digitalis, folia profert oblonga, sulcata,

ſulcata, nervoſa, multò digitalis ferrugineæ anguſtifoliæ foliis latiora, è quorum gremio ſeſe erigit caulis Bipedalis, ſuſtinens faſtigiatim complures flores, (Dactylothecæ vulgaris, inſtàr, elegantis ferruginei coloris) majores; in quorum ſingulorum locum ſuccedunt Thecæ, bicapſulares mucronatæ, & acutè bifidæ, craſſiores, digitalis anguſtifoliæ, flore ferrugineo, capſulis. Semina itidèm paria, hinc inde in duplici loculamento, rufa, ſed majora, continentes.

℣ Doronicum foliis ſubtûs lanuginoſis: Hujus caules ſunt pedales, folia ſuprâ obſcurius virentia, ſubtûs incana, oblonga: flores fert luteos ſtellatos (aliorum more) ſeminaque abeuntia in pappos.

E.

ECHIUM procumbens, floſculis atro-rubentibus, procumbens annuum: Vide Bugloſſum pullo minimo flore; in horto Regio Bleſenſi aucto.

Eruca tanaceti foliis: Hæc folia profert incana viridia; tanaceti foliis (quoad diſpoſitionem) haud abſimilia, ex quorum gremio exit caulis, ſeſquipedalis, in cujus ſummis, naſcuntur floſculi lutei, quatuor petalis conflati, quibus pereuntibus ſingulis, ſingulæ, ſuperveniunt ſiliquæ biunciales, bivalves, ſepto membranaceo medio, utramque ſeriem ſeminum, hinc inde terminante. Tota planta Guſtui calida & acris: quemadmodùm reliquæ erucarum ſpecies. Antequàm hæc planta cauleſcat, cauleſque & ſiliquas producat, folia ſunt adeo tanaceti foliis proxima, ut niſi guſtus, in opem vocetur, difficile erit terminatu. Sub quo genere militare debet: ſed flores & ſiliquæ bivalves, ſtatim ad Tetrapetalas,

trapetalas, siliquosas, referri debere, indicant.

☞ Eruca vinealis, parvis luteis floribus: Hæc Erucæ species est annua, inter vineta proveniens, folia edit glabra sinuata, binas vel ternas uncias longa: ex horum sinu, exeunt, cauliculi per terram strati, in summis caulium fastigiis, gerentes floseulos parvos, luteos, quatuor petalis, constantes: quibus succedunt siliquæ unciales & biunciales: seriem duplicem seminum continentes (aliarum siliquosarum more) septo medio membranaceo eandem, dirimente. Nec tactum manuum patiuntur maturæ, aliarum Erucarum more. Nec mihi videtur sylvestris minor lutea folio Bursæ pastoris, Banh. in Prodr. cum ejus folia neutiquàm ad Bursæ pastoris, folia accedunt.

☞ Eruca Barbareæ æmula major: Hujus folia sunt majora, caules altiores, siliquæ crassiores, seminaque grandiora. Etenim planta est perennis: quibus notis, quam facillimè, ab Eruca Barbarea, dicta: distinguitur.

☞ Eryngium ex plani ſemine degener: Hoc Eryngium ex plani Eryngii ſemine, ſato pullulavit, & folia produxit non integra, ſerrata ut planum, ſed multifida, & variè ſecta, florem cœruleum & ſemina paritèr, neutiquam ab Eryngio, plano diſcrepantia, edidit.

☞ Eryngium pannonicum latifolium, album, differt à pannonico Cluſii ſolo, florum colore.

☞ Euphraſia lutea viſcata, ſerrata pratenſis: Planta eſt Dodrantalis in pratis & humentibus agris proveniens, intra ſepta Regiæ, Chambort, paſſimque alibi, cujus folia ſunt ſerrata longa, tactui viſcoſa, in ſummis alis caulium floſculos gerit, ſatis amplos (pro tenuitate plantæ) luteos, Galeatos, qui flaccidi relinquunt, capſulas oblongas, continentes infinita ſemina minuta: Euphraſiæ vulgaris modo.

F.

℥ Fragaria ſterilis incana: Hæc Fragariæ ſpecies ſterilis dicitur; quia fraga non edit, ſed ſemina ſicca, ut reliquæ pentaphylli ſpecies, folia habet tripartita ut Fragaria, ſed incana aut pubeſcentia, nec alia nota, à Fragaria ſterili vulgari differt: copioſè in ſylvis adjacentibus, pictavio, reperitur. An leucas Dioſcoridis Lob. dubitatur.

℥ Fragaria pentaphylli fructu: Hæc Fragariæ ſpecies, ſub exortum, folia omninò tripartita, & Fragariæ vulgaris æmula gerit; ſed caules emittit pedales, & ſeſquipedales, erectos: ut pentaphyllum majus; Fragariæ folio, meritò dici poſſit. Flores luteos, capſulas ſeminales, & ſemina ibidem contenta, pentaphylli ſunt æmula. Vide pentaphylloïdes hort. Regii Bleſ. aucti.

℥ Fraxinus florifera Botryoïdes: Hæc à vulgari Fraxino parùm differt; primo intuitu, quoad foliorum diſpoſitionem,

&

& corticem; ſed florum profert racemos; Dodrentales albos, pendentes: ſiliquas ſeminales nondùm vidimus.

♃ Fritillaria ramoſa, ſeu Lilium Perſicum minus: folia profert omninò, Lilii Perſici florum æmula, ſed anguſtiora, caules edit pedales, in quorum ſummitate proveniunt ramatìm ſeu Corymbatìm, floſculi quini, ſeni pendentes, pullo colore præditi, Lilii Perſici inſtàr.

♃ Frumentum Indicum, ſpica articulata, radice perenni Spicam longam ſemipedalem per articulos, ſemiunciales aut unciales, diſpoſitam gerit, qua ſola nota (juncta duratione) facile cognoſcitur.

♃ Fumaria tenuifolia, ſemine compreſſo, lini inſtár: Hæc Fumariæ ſpecies, folia omnium tenuiſſima gerit, caules promit palmares & ſeſquipalmares, in quorum ſummis proveniunt (aliarum more) floſculi Corniculati, ex albo elegantèr purpurei, quibus decidentibus, ſubveniunt ſemina, compreſſa, tumidiuſcula lini inſtàr, nec capſulas vulgaris Fumariæ ritu, producit. Et ideò indeſcriptam eſſe judicavimus: à ſemine primo intuitu, cuilibet

cuilibet obvia: creſcit in Galloprovincia, & Gallia Narbonenſi.

G.

ℭ Gallium album tripetalon: Hæc Gallii ſpecies folia gerit, oblonga & anguſta, vulgaris Gallii haud abſimilia, flores fert multò minores. Tribus tantùm petalis donatos. Qua nota, ab aliis ſuæ claſſis (quippe quatuor petalis donantur) facilè diſtinguitur.

ℭ Geranium Batrachoïdes, minus, perenne verſicolor: Hoc folia habet minora, minúſque incana, Ranunculi Batrachoïdis inſtàr, maculis nigris ſ. fuſcis notata; flores fert in ſummis ramis, ſtriatos, ex albo & nigro; quemadmodùm Romanum verſicolor Park. floribus cadentibus ſuccedunt ſemina quina minora, ſubrufa, roſtrum brevius aculeatum terminantia.

ℭ Geranium Batrachoïdes minus annuum purpurocœruleum: Hujus folia omninò

ninò Ranunculi Batrachoïdis; ſunt æmula, flores fert magnos, purpurocœruleos, quibus deciduis ſuccedunt ſemina paritèr quina, nigra; roſtrum Gruinum biunciale, terminantia, ad baſin. Hoc ſolum Batrachoïdes, annuum eſt, & ideò inter cœtera notu, facilius.

ℊ Geranium Malacoïdes, ſeu Malvæ folio rotundo, flore albo: Hoc ſolo florum, colore albo, differt à pede Columbino Dod. ſeu Geranio Malvæ folio rotundo vulgari B. P.

ℊ Geranium Robertianum, flore albo: Solo itidèm florum colore, à vulgari rubro differt.

ℊ Glaux major, paluſtris, flore herbaceo: Hæc in fluviis & ad margines fluviorum: per prata labentium, provenit; caules habet pedales, aquis innatantes, à quorum geniculis nodiſve, demittuntur fibræ, in aquam, quarum beneficio nutritur tota planta; ad ſingula genicula oriuntur bina folia, pulegii Regalis foliis latiora, glabra, mucronata; in caulium alis ſuperioribus, emergunt flores, herbacei coloris qui relinquunt in capſulis oblongis

oblongis, Caryophylli aromatici magnitudine ; in ſingulis infinita ſemina minuta, ſubviridia : etiam, Euphraſiæ ad modum, continentur.

♃ Gramen Phalaroïdes perenne, tuberoſa radice : Spicam fert, Phalaridis ſpica, tenuiorem longiorem ; ſeminaque multò ſunt minora. Radices habet tuberoſas, lucentes, perlarum inſtàr, per nodos, Typhini graminis radici ſimiles : perennis eſt planta.

♃ Groſſularia .ſ. Ribes fructu rubro, Uvæ criſpæ folio : Frutex hic ad tripedalem aſſurgit altitudinem cortice refert Ribem, foliis Uvam criſpam, fructum fert Ribis, rubrum, racematim, ſeu. Botryos in modum diſpoſitum.

H.

HEDERA trifolia Canadenſis; folio ſinuato: Hæc à Hedera trifolia Canadenſi Cornuti differt in hoc, quod folia, habet minora, tripartita, in margine autem ſinuata, quod non conſpicere licet, in Hedera trifolia Canadenſi Cornuti.

Helenium Indicum tuberoſum, radice oblonga: Sola radicum longitudine; (quæ ad ſemipedem aliquandò accedit) ab Helenio (ſeu potius Chryſanthemo) tuberoſo, radice rotunda, differt.

Helleborine, herbaceo flore: Ex primo intuitu florum, cognoſcitur. Hæc Helleborines ſpecies; in collibus, ſylvoſis. Ubi ſylvæ ſunt cœduæ, cernere ipſam frequentèr licet.

Helleborus niger, flore roſeo, minor Belgicus: Hic, omnibus ſuis partibus, foliis, caulibus, flore, eſt vulgari hortenſi, ſeu legitimo, minor: florem fert ex albo roſeum.

♃ Hieracium flore parvo luteo, apuli, flore ſuaverubenti, odore æmulum: Hæc Hieracii ſpecies adeò odore, Hieracio apulo, flore ſuaverubenti Col. accedit. Quippe Amygdalas amaras redolet utrumque: ut idem odoratui appareret, ſed hoc folia habet anguſta, flores minimos luteos, quibus evanidis ſuccedunt, in Calycis, margine exteriori, incurva quaſi roſtra. In viarum marginibus paſsim reperitur circa Bleſas. Hæc duplici nota, odore & roſtris incurvis, in marginibus Calycis, exterioribus: cognitu cuivis obvium.

♃ Hieracium, foliis & floribus dentis Leonis bulboſi, ſemine curvo: A ſemine curvo facilè diſtinguitur, hoc Hieracium ab omnibus aliis, ſuæ claſſis.

♃ Hieracium anguſtifolium glabrum, ſeu piloſella major glabra: Caules edit Bipedales, ramoſos: folia anguſta glabra. Atque ſola glabritie, quam facillimum erit, à cœteris hujus ordinis, (quippe villis ſcatentibus) ipſum diſtinguere.

♃ Hieracium (pulmonaria non maculata, dictum)

dictum) indiſſectis foliis: In ſylvis montoſis, & collibus ſylvoſis: Hæc pulmonariæ ſpecies, provenit. Foliis nullis maculis conſperſis, in margine integris. Hinc à cœteris, notu, non eſt difficile.

♃ Horminum majus, amplo flore violaceo, Lobis florum, punctis aureis notatis: Hoc Horminum folia profert hirſutiora, cœteris ſuæ ſortis; (excepto ſolo Æthiopico) ad baſin anguloſa: inter quæ exeunt, caules Bipedales, aliquandò tripedales, quadrati, quos (ad genicula) amplectuntur, bina folia Dodrantalia (ut ſuperius dictum) auriculata. In ſummis caulium, verticillatim proveniunt flores ampli, violacei, Lobis florum, lateralibus; punctis aureis aut purpureis, notatis; floribus ſingulis evanidis, ſuccedunt in capſulis magnis, ſemina craſſa nigra quaterna utplurimum, majora, cœterorum omnium Horminorum, ſeminibus. Atqué punctis aureis aut purpureis & ſemine majore: notu facile, à ſequenti, cum quo majorem habet affinitatem.

♃ Horminum lapathi unctuoſi folio, ſeu, majus

majus haſtato folio: Hoc folia habet hirſuta, angulosa aut auriculata ad baſin, ut ſuperius. In mucronem definunt, haſtæ inſtar cuſpidis, quin & forma lapathi unctuoſi, folia repreſentat. Flores fert magnos, omninò violaceos, ſemina, in omnibus prioris ſeminibus minora, & ſubfuſci coloris.

℥ Horminum napi folio: Ex diviſione foliorum, napi foliis ſimilium & florum parvitate, lavendulæ, inſtar. Satis notu facile.

℥ Horminum Salviæ folio: Hoc Horminum adeò Salviæ majoris foliis habet ſimilia ut principio, à ſatione. Salviæ (primo intuitu) videretur ſpecies: Flores fert purpureos majores. Odore, Horminum ſeſe declarat. Fortè hæc Hormini ſpecies eſt quæ, à proſp. alpino; marum Ægyptiacum denominatur.

℥ Horminum minus, folio ſinuato, flore minore dilutè cœruleo: Caules quadratos, pedales, hirſutos, producit; procumbentes, rariùs ramoſos: foliis nonnihil hirſutis (pollicarem latitudinem vix excedentibus) oneratos; uncias

tres longis, in margine ſinuatis. Cauliculi, floribus rarius diſpoſitis ornantur, dilutè violaceis, Lavendulæ florum æmulis. Quibus decidentibus, ſuccedunt in ſingulis capſulis, quaterna ſemina minora, nigra aut fuſca rotunda. Sylveſtris quarti, quinta ſpecies Cluſ. paſsim hìc in Anglia ſecus fluvium Thamiſin, copiosè provenit, folia habet majora ſinuoſa, ſaturatiùs viridia. Caules fert quadratos (ut verticillatæ Galeatæ fere omnes) pedales & ſeſquipedales, erectos. Quorum ſummis ramis, innaſcuntur flores paulò majores magiſque ſaturè violacei, quàm prioris deſcripti, ſunt flores; ſed florum magnitudine, quàm proximè accedunt.

ꝺ Hyſſopus hirſuta: Ab Hyſſopo latifolia vulgari, ſola hirſutie foliorum: Quemadmodùm, ſtriata ſeu aurea, à variegatione; diſtinguitur à vulgari; hoc accidit in multis aliis tàm arboribus, fruticibus, & plantis, ut ſuperiùs diximus

ꝺ Galeata & verticillata, Perſicæ foliis, digitalis æmula: Hæc Galeata & verti-

cillata

cillata planta, adeò ſimilia producit folia, foliis, Perſicæ mali, quoad formam & ſerraturam, ut nihil magis, flores autem fert Galeatos, ſubpurpureos, amplos, quorum ſingulis ſuccedunt, quaterna ſemina anguloſa, in capſulis quinque partitis in margine, verticillatarum & Galeatarum propriè ſic dictarum more. Nec Thecam bicapſularem, pyramidalemve: Hinc indè, infinita ſemina minuta, ſubruſa, continentem habet. Ergo perperâm Botanicis hucuſque, paſsim pro digitali Perſicæ foliis, habetur. Vide digitalis, foliis maximè ſerratis: in horto Regio Bleſenſi aucto.

I.

℞ Jacea lusitanica sempervirens: Planta est tripedalis, folia habet, cœteris, suæ sortis, latiora, durabiliora, per hyemem totam utplurimùm durant; flores, & semina habent majora. Quibus notis, à reliquis, speciebus facilè distinguitur.

℞ Jacobæa foliis amplioribus incanis: Ad sylvarum & vinetorum margines provenit hæc Jacobæa: foliis Jacobææ vulgaris, foliis multò; sunt latiora, minusque secta, quin & ipsis sunt multò magis incana. At Jacobææ marinæ foliis, multò minus sunt incana: medium inter utramque (quoad canitiem) obtinet locum; flores & semina paria.

℞ Jacobæa Crithmi litorei foliis: Planta est Bipedalis, folia angusta, crassa, oblonga, viridia, Crythmi Chrysanthemi maritimi instar, habet: florem fert luteum Jacobææ, stellatum: cujus petala lata lutea, cingunt discum luteum, ex plurimis staminulis luteis, conflatum:

(aliarum

(aliarum Jacobæarum more) flos abit in pappos.

℞ Jacobæa Senecionis folio: Observa, Jacobææ notam genericam & essentialem (quâ distinguitur à Senecione) esse, quod flos Jacobææ, constet multis petalis latis & planis: cingentibus discum, ex plurimis staminulis luteis, conflatum. Senecionis autem flos tantùm componitur, ex staminulis plurimis luteis; nullis petalis planis, latis, easdem cingentibus. qua ratione hæc concluditur esse vera & genuina, Jacobææ species; cum Jacobææ habeat florem stellatum: ut supra satis dictum. Quoniam folia omninò dissecta habet, ut Senecio: Jacobæa Senecionis folio, aptè dicitur. Desumpta denominatione, à nobiliore parte, Flore videlicet.

℞ Iberis Virginiana, latifolia ramosa: Folia fert Iberidis vulgaris foliis, latiora. Caulesque edit altiores & fruticosiores; annua est etiam planta, & hac nota à vulgari facilè distinguitur.

L.

LAMIUM parietariæ facie: in omnibus Lamio vulgari accedit. Facilè autem dignoſcitur, ex primo intuitu, à foliorum cum parietariæ foliis, ſimilitudine.

Laſerpitium alterum, foliis Lobatis anguſtis, dilutè virentibus: A Laſerpitio Gallico diſtinguitur, quod folia producit dilutius virentia, quam Gallicum, cujus folia, ſunt lucide atrovirentia.

Lathyrus latifolius, luteus, annuus, ſiliqua hirſuta: Hic Lathyrus inter Sata Bleſis adjacentia, frequentèr ſatis, provenit; florem fert dilutè luteum (aliorum more) papileaceum cui, ſuccedit ſiliqua longa, hirſuta, qua nota præcipuè diſtinguitur; à ſuæ claſſis, reliquis.

Lathyrus latifolius, flore obſoleto, ſiliqua Piſi minoris: In arvis ſatis, circa Rupellam, frequens nobis obvius fuit, hic Lathyrus: florem ſubrubrum vel obſoleti coloris gerit; cui ſuccedit ſiliqua

qua ſeſquiuncialis, duplici ala, cavâ parte (qua ſemina quaterna quina junguntur) prædita.

♃ Lathyrus anguſtifolius λεπτολόβος, ſemine rotundo, flore rubello: Hæc Lathyri ſpecies, folia ut ſequens, gerit anguſta, Graminea, longa, caulem pedalem & ſeſquipedalem, habet: in cujus cimis naſcuntur flores Rubelli, obſoleti coloris. Quorum ſingulis, ſuccedit ſiliqua rotunda, multò ſequentis, ſiliqua longior: in qua continentur ſemina dena, duodena rotunda.

♃ Lathyrus anguſtifolius λεπτολόβος, ſemine hexedro, flore cœruleo: Lathyrus hic folia habet anguſtiſſima, Graminea, florem fert cœruleum, papileaceum: (cœterorum more) cui ſuccedit ſiliqua, longa, tenuis: continens minuta ſemina, anguloſa cubum .ſ. hexedram, referentia.

♃ Laurus Alexandrina, fructu longis pediculis, caulibus, alligato: Sola hac nota diſtinguitur; quod fructuum ſeu baccarum pediculi, unciales aut biunciales, à cauliculis pendent, in reliquis

autem, folio aut pediculo, baccæ, fructuſque inſident.

☞ Liliaſphodelus, latifolius flore luteo, ſola magnitudine foliorum & florum ab anguſtifolio differt.

☞ Lilium .ſ. Martagon Canadenſe: Elegantia florum, elegantèr à natura punctatorum: facilè diſtinguitur; à cæteris ſuæ familias.

☞ Linaria minima hirſuta, flore obſoleto: Hæc tenuis Linariæ ſpecies, folia habet quodammodò Antirrhini æmula, florem habet ſubnigrum (inſoleti coloris) ſed omninò Linariæ, quippe rictum habet anteriùs, & calcari donatur poſteriùs capſulamque binis loculamentis, diſtinctam habet. Septo membranaceo utrumque diſterminante: malè ab authoribus pro Antirrhino minimo, appingitur: in ſatis arvis, paſsim occurrit.

☞ Linaria minor viſcoſa, flore luteo: Hæc Linariæ ſpecies, folia edit hirſuta, viſcoſa, caules ſemipedales, in quorum cimis, flores fert Linariæ, luteos: quibus evaneſcentibus, ſuccedunt capſulæ, aliarum more. Continentes ſemina nigra

gra compreſſa, ſeu foliacea, non autem ut Linaria vulgaris, rotunda : (hinc nata duo reperiri genera Linariæ, quorum unum fert ſemen compreſſum, nigrum, foliaceumve, alterum rotundum, ut prolixiùs alibi, in Tabulis noſtris, cognationis, deducemus) in Arenoſis maritimis Armoricæ provenit hæc Linaria.

♃ Linaria Armorica, flore ſaturè violaceo : Hæc folia producit glabra, anguſta : caules pedales, quibus innaſcuntur flores, ſaturatè violacei, parvi, parvas relinquentes capſulas, Linariæ in modum.

♃ Linaria anguſtifolia glabra, flore luteo majore : Hujus folia ſunt quaſi Pſyllii foliorum æmula, longiora. Caulem producit, ſeſquipedalem, cujus cimis innaſcuntur, flores lutei multò majores, pro tenuitate plantæ, quàm in ulla alia Linaria. Circa Burdegalam, in ſatis, provenit.

♃ Linum ſylveſtre annuum, luteum, folio latiore & anguſtiore : Sponte in humidis ſylvis, utraque hæc ſpecies creſcit, ſolo hoc diſcrimine quod, unius folia

ſunt

ſunt latiora, alterius anguſtiora. Vix Dodrantalem altitudinem excedit, utraque ſpecies.

ꝛ Linum perenne cœruleum, ſativo æmulum: Hoc in omnibus ſativo accedit niſi quod eſt perenne.

ꝛ Lychnis flore muſcoſo capillaceo: Habet caules ſeſquipedales, Lychnidis (ſeſamoïdes Cluſio) dictæ, æmula. Sola hac nota ab omnibus Lychnidum ſpeciebus differt quod non (aliarum more) florem, quinis petalis, ad medium bifidis, gerat. Sed florem edit ex plurimis capillis muſcoſis, herbacei coloris.

ꝛ Lychnis Alpina glabra, Caryophylli holoſtei flore: A foliis glabris Caryophyllorum, foliorum æmulis, biuncialibus aut triuncialibus, notu perquàm facilis, flores fert minores albos, quinis petalis, ad medium bifidis conſtantes; capſulam ſeminalem, & ſemina aliarum more producit.

ꝛ Lychnis minor viſcoſa Saxatilis; Caryophylleis foliis: Hæc inter Saxoſa, provenit, Pyrenæorum montium & in Alpium jugis, folia habet glabra, mucronata,

cronata, Caryophylli inſtar: Caules vix ſemipedales profert: ad ſingula internodia (ut in pluribus aliis Lychnidum ſpeciebus) viſco obductos; quo muſcæ captantur, unde viſcoſa dicitur.

♃ Lychnis maritima repens, ſtrictiſſimis foliis: Hujus cauliculi per terram ſunt ſtrati, quibus ſtrictiſſima, innaſcuntur folia, flores fert albos minores, quibus pereuntibus, ſuccedunt capſulæ, aliarum Lychnidum more, & ſemina ibidèm contenta. Provenit in ſabuletis maritimis armoricæ, & circa Rupellam. Hæc planta.

♃ Lychnis incana longiori folio, petalis non bifidis: Hæc Lychnidis ſpecies, quod folia edit longiora, incana, & florum petala, habet non bifida, notu facilima, nec novi ullam, hujus generis ſpeciem aliam, quæ petala gerit non biſida: præter auriculam muris, pulchro flore, folio tenuiſſimo. Joh. Bauh. in Ericetis ſabuloſis, ſex milliaria, à Burbonum capite, diſtantibus, reperitur, ſatìs frequentèr.

♃ Lychnis (papaver ſpumeum) latifolia vulgaris,

vulgaris, hirsuta: Hæc sola foliorum hirsutie, à papavere spumeo, vulgari glabro, differt; inter sata, valdè frequentèr occurrit.

♃ Lychnis (papaver spumeum) angustifolia glabra, flore purpureo, ab angustifolia vulgari glabra, floris colore, solummodò differt.

♃ Lycopsis Monspeliaca, floribus dilutè purpureis & albis: Ad tripedalem assurgit altitudinem, flores Corniculatos dilutè rubros & albos, aliorum Echiorum aut Lycopsium more habet, quaterna, dicidentes relinquunt semina; viperini capitis, figuram referentia. Nota essentialis & generica quâ distinguitur Echium seu Lycopsis. A Buglossa seu Anchusa, est hæc. Quòd hujus flores quinis petalis constent: illius autem flores sunt Corniculati. Quod cuilibet observanti & propiùs intuenti, quam facillimè apparet.

♃ Lysimacha Corniculata, lutea Canadensis minor seu angustifolia: Hæc sola foliorum angustia, aliarum suarum partium; florum scilicet & capsularum seminalium,

minalium, parvitate differt, à Lysimachia Corniculata lutea majori Cornuti.

℥ Lysimachia purpurea spicata lanuginosa, seu folio subrotundo incano: A Lysimachia spicata communi purpurea Clus. differt, quod hujus folia sunt glabra, oblonga, mucronata; illius vero incana seu lanuginosa, subrotunda, cætera ei par.

M.

℥ MALVA Betonicæ folio: Caulículos profert pedales & sesquipedales per terram stratos quibus adhærent alternatim, folia oblonga, Betonicæ foliorum instár. Flores fert amplos Rubellos; semina, nec ad maturitatem pervenêre.

℥ Malva Hispanica: Hæc Malvæ species folia producit mollia, undulata in margine. Superiùs, micis sulphureis ad solem, lucentibus donata sunt. Caules edit bipedales, aut tripedales, flores & semina

ſemina aliarum Malvarum modo. Perennis eſt planta: quin & perpetuâ fronde virét. Ut Althæa Olbiæ, in meridionalibus ſaltem regionibus.

ℭ Marrubium aquaticum ſeu aquatile foliis tenuiùs diſſectis: Hæc Marrubii ſpecies, longè lateque radices ſuas, hâc, illàc ſerpendo, ſpargit: Caules fert tripedales ut vulgare. Folia autém duplò aut triplò tenuiùs, vulgaris foliis, ſunt diſſecta. In omnibus aliis, vulgari congruit.

ℭ Meliſſa Romana hirſutior: Hæc folia profert multò vulgaris foliis latiora, multóque hirſutiora, quin & tota planta, multò eſt major vulgari, ad ternos, quaternos (aliquandò) aſſurgit pedes. Hujus ſemen, ut & aliarum plantarum (in horto Regio Bleſenſi auctо, contentarum) multa, ad me miſſa fuerunt ſemina. A doctiſſimo & peritiſſimo Botanico, Domino Jacobo Barillier, in ſacra ſancta Theologia Doctore, ordinis prædicatorum ſocio, digniſſimo, ad minervam Romæ, pro eo tempore commorante: cui immortales debemus gratias.

ℭ

♃ Meliſſa Bætica: Vide Brunella Bætica ſuprâ: Cum non habet odorem Meliſſæ, nec flores Galeatos, rariùs per verticillos diſpoſitos ut Meliſſa. Sed verticillos denſiſſimè diſpoſitos: & quaſi (prunellæ in modum) in ſpicam degenerantes, prout clariùs deducemus in Tabulis noſtris, cognationis. Pro prunella habeatur.

♃ Millefolium tanaceti foliis: Hujus folia ſub exortum, antequam, cauleſcat planta, adeò ſunt Tanaceti, foliorum æmula, ut non niſi ab oculato Botanico, diſtingui poſſint; niſi guſtus & olfactus, vocentur in opem. Sed poſtquàm produxerit caulem & Corymbum, Millefolii in modum, ſemenque paritèr Millefolii. Seſe declarat verum & genuinum Millefolium. Eſtque flore albo & purpureo. Vide Tanacetum montanum purpureum: in horto Regio Bleſ. non aucto. Quàm inneptè Botanicis, Tanacetum dicitur, videat lector & examinet mecum.

♃ Myrrhis perennis lutea daucoïdes: Hujus folia quàm proximè dauco, ſeu paſtinacæ

paſtinacæ tenuifoliæ, accedunt, quin & flores habet luteos, ſemina roſtrata ſtriata, Myrrhidis. Montanæ, ſeminibus longiora at minùs tumida habet. Perfecto ſemine, ſeſe renovat ex eadem radice.

♃ Myrrhis nodoſa annua, ſemine aſpero: Hujus caules ad internodia craſceſcunt, nodoſque gerunt pyriformes, flores gerit albos, in ſummis caulium bipedalium. Quibus exeuntibus, ſuccedunt ſemina roſtrata bina, ſtriata, aſpera, in convexa parte; imo multò ſunt, reliquis craſſiora. Unde à nodoſitate caulium, flore albo, & ſemine ſtriato aſpero, quàm facillimè, à reliquis Myrrhidum ſpeciebus diſtinguitur. Hoc addito, quod ſit annua planta. Nota quod omnis Myrrhidis, ſemina bina ſint ſtriata; Cereſolii autem lævia nigra, ergò Myrrhis Fuchſ. ſeu ſylveſtris ſeminibus lævibus B. Pin. eſt Chærophyllum ſylveſtre. At Anthriſcus Plinii hiſtoriæ Lugd. eſt Myrrhis ſylveſtris, non Chærophyllum ſylveſtre. Quia ſemina habet ſtriata, hoc adde quod nodos gerit pyriformes.

♃

♃ Myrrhis perennis montana alba: Hæc Myrrhidis ſpecies aſſurgit, ad binos ternoſve pedes, caules producit ſtriatos, flores (aliarum ſuæ claſſis more) albos: quibus ſuccedunt ſemina roſtrata, ſtriata. Semiuncialia exteriùs lutea: cava parte qua junguntur, ſubcœrulea; eſt foliis hirſutis & hirſutioribus, cujus folia medio modo, ſecta ſunt, ſatis lata. Eſt & tertia hujus ſpecies, cujus folia ſunt tenuiùs diſſecta.

♃ Myrtus aurantiæ folio: Hujus folia ſunt aurantiæ foliorum, colore & conſiſtentia, adeò æmula, niſi quod ſint multò minora, & anguſtiora. Ut malum aurantiam minorem (antequàm flores & fructum edit) nullus dicere vereretur. An Myrtus latifolia Park. Cluſ. hiſt. dubitatur.

T N.

N.

ℭ NASTURTIUM pratense floſculis minimis: Pedalem & ſeſquipedalem habet altitudinem hæc planta: folia quàm tenuitèr diſſecta, floſculos minimos albidos quatuor petalis (aliarum ſiliquoſarum, tetrapetalarum more) conſtantes producit; quorum ſingulis ſuccedunt ſiliquæ biunciales, bivalves, ſepto medio membranaceo, diſterminante: duplicem ſeriem, ſeminum, cæterorum (ſuæ claſſis) more. Quin & matura ſemina, manuum tactu; per terram ſparguntur. Unde noli me tangere dicitur. Fortè Naſturtium ſylveſt. minus Bauh. in Prodr.

ℭ Nigella ſylveſtris, flore luteo pallido; Seu Lychnis (Pſeudomelanthium) dicta ſolo, florum colore, à vulgari Pſeudomelanthio, differt.

O.

O.

℞ OCYMUM minimum foliis rubescentibus: Ex satione, tanta est varietas horùm, ut folia aliquandò rubescant, aliquandò sunt luteopallida, ut plurimùm viridia. Aliquandò integra, nonnunquam serrata, ita ut ex satione, concludo esse lusum naturæ, ut in multis aliis annuis.

℞ Onobrychis, flore saturatè rubro: Ab Onobrychide vulgari, solo florum colore differt.

℞ Onobrychis, viola Pentagonia dicta, vide Campanula. s. viola Pentagonia.

P.

℞ PASTINACA tenuifolia lucida: Vulgaris Pastinacæ, folia sunt hirta, hujus folia sunt glabra & lucida, sola luciditate & glabritie foliorum, à vulgari facilè distinguitur.

ꝺ Paſtinaca tenuifolia, radice & umbella lutea: Facilè ab hortenſi & ſylveſtri, diſtinguitur; quippe harum umbellæ, colore ſunt albo illius umbellæ ſunt colore luteo, præditæ.

ꝺ Pentaphylloïdes Fragariæ folio; Vide Fragaria Pentaphylli fructu.

ꝺ Pentaphylloïdes, Argentinæ facie, nobis: Pentaphyllum ſupinum potentillæ facie Cluſ.

ꝺ Pentaphylloïdes, Ulmariæ facie, nobis: Pentaphyllum fragiferum 5. Cluſ. cum duæ poſteriores plantæ, coſtas ſeu nervos medios, longos habent, quibus quina, interdùm plura foliola, adhærent è contrario, inter ſe foliorum exortu, naſcentia: uno extremum claudente. Potentillæ .ſ. Argentinæ, ritu. Ergo, cum florem & ſemen, aliorum Pentaphyllorum more, perficiunt. Folia autem Pentaphylli non habent, Pentaphylloïdes nuncupari velim.

ꝺ Petaſites minor, folio tuſſilaginis: Petaſitis folia ſunt ſcabra aſpera. Hujus autem, ſunt prona parte viridia, ſupina, incana, tuſſilaginis inſtàr, & niſi quod

florem

florem producit Petasitis, esset vera tussilaginis species.

♃ Peucedanum minus foliis Lobatis angustis: Hæc umbella, folia producit quina, sena, nunc plura, nunc pauciora, è regione Rachi seu nervo medio, adnascentia, uno extremùm claudente, è quorum medio sese erigit Caulis Bipedalis, sustinens flores luteos, umbellæ in modum; semina fert membranacea, rotunda, Peucedani vulgaris instár.

♃ Phalangium Virginianum, amplo flore: A Phalangio Virginiano tradescanthi, sola amplitudine, florum & seminum differt. Estque flore rubro, cœruleo & azureo.

♃ Phalaris, semine minore nigro: Hæc semen, producit, minus Phalaridis vulgaris, semine, quod & nigrum est, qua nota, facilè, distinguitur à Phalaride Dod.

♃ Phaseolus minor Collossinus, siliquis longissimis: Hic Phaseolus ut & sequens, vix pedalem aut sesquipedalem excedunt altitudinem; Hic florem Colossinum: fructumque minorem Colossinum,

ſiliquas, ſenas, ſeptenas uncias longas fert, ſtrictiſſimas. Non ſcandit nec ſequens.

♃ Phaſeolus, ſiliquis rotundis Viciæ, fructu ovali viridi: Hæc Phaſeoli ſpecies, vix pedalem excedit altitudinem, flores fert herbacei coloris; aut ſubvirides, papiliaceos, ſiliquas Viciæ in modum, rotundas, quaternas uncias aliquandò excedentes: ſemina oblonga, viridia, ovalia; in ſe continentes.

♃ Piloſella major glabra: Hæc à majori repenti hirſuta Bauh. in Pin. differt ſola glabritie.

♃ Pimpinella maxima, ſpica longa rubra: Hæc à ſanguiſorba differt, quod ſpicam gerit, ipſa longiorem, ternis, quaternis unciis conſtantem, hujus eſt & alia ſpecies, ei omninò accedens, niſi quod ſpica ſit brevi, Glomerata, rubra paritèr, utraque, folia gerit longiora, & magis ſerrata, quàm Pimpinella ſanguiſorba.

♃ Pimpinella Agrimonoïdes: Hujus folia (prima facie) Agrimoniæ foliis quàm proximè accedunt: aſpera, villoſa ſunt,

Rachi

Rachi seu nervo medio (aliarum Pimpinellarum more) adhærent, uno extremum claudente gratissimum, contrectata spirant odorem, caules pedales habet: in horum cimis proveniunt, spicæ Glomeratæ, seminibus striatis (gratissimi odoris) onustæ.

♃ Pisa nana rotunda: Omnium, suæ familias sunt minima, & humillima. Pisa hæc, nec prolixiore egent descriptione.

♃ Pisum sylvestre Viciæ fructu: Primo intuitu, à folliculo seu siliqua Viciæ dignoscitur.

♃ Pistacia Virginiana, sylvestris trifolia: Vel primo intuitu à foliorum (ternatim) dispositione, seminumque in vesicis parvitate, notu, à vulgari, perquàm facilis.

♃ Plantago marina quinquenervia incana: Hujus folia Plantaginis quinquenerviæ vulgaris, in omnibus, accedit: nisi quod sint minora & villis adeò obducuntur, ut incana, aut cinere obducta videantur.

♃ Polium rubrum majus, flore dilutiore: Hujus folia, Polii lutei vulgaris,

foliis, quàm proximè accedunt, & quoad magnitudinem, ſerraturam & incanitiem. Florem fert majorem, dilutiùs rubrum, quàm quintum Cluſ.

♃ Polyganum minus maritimum incanum: Hujus folia ſunt Polygoni marini vulgaris, multò minora, cinerei coloris, aut incana lanugine, obducta videntur.

♃ Portulaca minima flore albo: Hæc plantula eſt uncialis, in humidis arvis, ineunte æſtate, per terram ſtrata: folia producit ſemiuncialia anguſta, quodammodò craſſa. Floſculos ad nodos producit albos. Quibus deciduis, ſuccedunt, minutula ſemina, Portulacæ, ſeminibus omnimodè conformia, nigra itidem.

♃ Portulaca hortenſis flore flavo: Solo foliorum colore, à Portulaca hortenſi, ſeu culta differt.

♃ Potamogeton Virgineanum: Bipedalis aut tripedalis eſt planta: folia gerit latiora, obſcurè virentia; ſpicas triunciales, albis floribus rarò ibidèm diſpoſitis, onuſtas fert, non autem compactìm ſpicæ in modum. Semina habet triquetra, ut Perſicaria & Polygonum.

♃

℔ Ptarmica Virginiana folio Helenii: Hæc eſt Corymboſa, Bipedalis planta, cujus caulibus, adnaſcuntur, folia lata & oblonga, Helenii foliis haud abſimilia, flores fert (corymbatim) albidos, ſeminaque, Ptarmicæ vulgaris, ſeminibus, omninò ſimilia unde ei nomen impoſuimus.

Q.

℔ Quercus vulgaris brevi pediculo: Hæc facilè diſcernitur. In ſylvis annoſis, Galliæ paſsim; à vulgari, longo pediculo, vel ipſo aſpectu. Folia habet ſinuata; prona & ſupina parte, viridia.

℔ Quercus foliis ſubtus incanis, brevi pediculo. Datur & alia longo pediculo. Utraque folia habet anguſta, ſinuata, ſubtûs incana.

℔ Quercus Calyce Echinato, glande majore: Hæc à glandis magnitudine, & Calyce Echinis donato, inter cœteras ſuæ familias (in ſylvis annoſis, Galliæ) cognitu perfacilis.

℔

♃ Quinquefolium alpinum repens, ſerotinum: Hæc Quinquefolii ſpecies, ſub exitum autumni floret, caules per terram ſtratos gerit, ſuſtinentes flores luteos.

♃ Quinquefolium Canadenſe erectum: Hujus caules ſunt Bipedales, erecti, floſculos gerunt magnos, luteos, capſulas ſeminales, aliorum more.

R.

♃ Ranunculus arvenſis annuus flore minimo luteo: Hic Ranunculus folia gerit hirſuta, tripartita, caules edit per terram ſparſos, quorum ſummis caulibus innaſcuntur, floſculi lutei, minimi, quinis (aliorum more) petalis donati. Quibus deciduis, ſuccedunt racematim, ſemina minora, ſpinoſa aliorum more.

♃ Ranunculus nemoroſus flore albo pleno: Hic ſola plenitudine florum differt, à nemoroſo, flore albo ſimplici.

♃

♃ Ranunculus nemoroſus flore pleno violaceo: Hic paritèr plenitudine florum, & colore violaceo, differt, à nemoroſo ſimplici. Quoad folia & radices idem.

♃ Ranunculus Ceratophyllos, ſeminibus falcatis, in ſpicam addactis: Foliis eſt ter, tripartitis: Cornu cervi quodammodò referentibus è quorum medio exeunt cauliculi plurimi, triunciales, ſinguli, ſingulos ſuſtinentes floſculos (aliorum Ranunculorum more) quinis luteis petalis conſtantes; ambientibus rudimentum viride, quod tandem in ſpicam degenerat uncialem; ſeminibus falcatis onuſtam. Annua eſt plantula, præcox. Menſe Martio floret, in ſegetibus, Galloprovinciæ, & Narbonenſis Galliæ, ſatìs frequentèr; perperàm à Lobelio in adverſariis pagina 11. appingitur pro Melampyro perpuſillo; cum Melampyrum (in genere) ſit planta Galeata, toto Cœlo, ab hoc Ranunculo, diſcrepans. Cumque omninò propiùs ad Ranunculorum claſſem accedit. Magis appoſitè Ranunculus dicitur. Vide Hallucinationes

lucinationes Caſpari Bauh. in Pin. pag. 234. colum. 2. plant. 6.

♃ Raphanus ſylveſtris major flore luteo: Folia ſunt longa, ſerrata: aquis innatant. Flore eſt luteo, ſed dum recedunt aquæ, mutant inciſuram foliorum; florem fert luteum; (ut ante dictum) ſiliquas ſeu potius ſiliculas fert, aliorum (ſuæ claſſis) more.

♃ Raphanus minimus luteus Naſturtii folio: Hæc planta florem fert Tetrapetalum, luteum; Thecamque ſeu ſiliculam, bicapſularem: radicem etiam edit longè latéque repentem, ut Raphanus vulgaris, quin & uda, humidaque amat loca. Quæ omnia Raphani ſeſe declarant ſpeciem: folia autem gerit Naſturtii tenuitèr diviſa, ſeu diſſecta, flores ſatìs amplos luteos, pro exiguitate plantæ. Vix palmares aut ſeſquipalmares edit caules, quorum ſummis, (poſt deciduos flores) ſuccedunt ſiliculæ bicapſulares.

♃ Rapuntium Solonienſe, violaceo Galeato flore: Hæc Rapunculi ſpecies, radicem habet, aſclepiadis; caules emittit bipedales, quorum ſummis faſtigiis, eorumque

rumque alis, innaſcuntur flores Galeati, cœrulei: Rapuntii Americani, (quod flos Cardinalis Columnæ dicitur) omninò æmuli. Quibus flacceſcentibus, ſuccedunt capſulæ triangulares, (aliorum Rapunculorum more) continentes ſemina pellucida rufa. Tota planta percalida eſt, & Maſticata linguam, urendo, pungit. Creſcit in humidis ericetis & ſylvis annoſis, paſsim in agro Solonienſi, alibique in Gallia. Malè à Caſparo Bauh. in Pin. pag. 110. collocatur pro draba, flore cœruleo Galeato. Quum nil habet affinitatis, cum ſiliquoſis, cujus draba eſt ſpecies. Rapuntium Galeatum ſeſe declarat, ex ſucco lacteo emanante ex qualibet parte rupta; adde capſulam ſeminalem, & ſemina. Rapunculorum claſſi accedentia.

♃ Reſeda latifolia, flore flavo: Hæc Reſedæ ſpecies, folia gerit lata, obſcurè virentia; caules edit Bipedales, in quorum ſummis naſcuntur flores flavi (aliarum Reſedarum more) ſpicatim dipoſiti: quibus evanidis ſuccedunt, Thecæ, ſeminales tricapſulares, ut etiam, reliquis, ſuæ familias; contingit. ♃

♃ Reſeda foliis Calcitrapæ, flore albo: Hæc Reſeda, folia gerit omnimodè diviſa, quemadmodùm Reſeda vulgaris; caules edit ſeſquipedales, in quorum faſtigiis, naſcuntur, flores albi, ſtaminulis multis purpureis donati. Quibus ſuccedunt Thecæ tricapſulares; ſeu tribus loculamentis diſtinctæ; ſemina multa nigra in ſe continentes.

♃ Ricinus minimus: Omnibus ſuis partibus: cedit, majori & medio, quoad ſemina, folia & caulium altitudinem.

♃ Rubeola maritima lutea: Hæc Rubeolæ ſpecies, in ora maritima, Armoricæ. Radice longè latéque repente, reperire eſt, paſsim. Flore donatur luteo minimo (quatuor petalis conflato) flori unicuique, ſuccedunt bina ſemina teſticulata, Rubeolæ more.

♃ Rubeola minima alba: Plantula eſt in viis aridis, conſpectui, ſatis obvia: flore minimo albo, tetrapetalo aliarum more, foliis ſpinoſis donatur. Florum ſingulis, ſuccedunt bina ſemina teſticulata; cœterarum more.

S.

S.

℥ SANICULA montana crenata, umbilico pallido: Species eſt Saniculæ montanæ Guttatæ, cujus folia ſunt oblonga tenuia, ſerrata, è quorum medio; foliis crenatis (Roſæ inſtàr) ſepto: exit cauliculus Dodrantalis, ruber, ſuſtinens plurimos flores albos, (aliarum more) punctatos, umbilico pallido affectos. Quorum ſingulis cadentibus ſuccedunt ſiliquæ ſingulæ bifurcatæ, aliarum Saniculârum, montanarum, & Saxifragæ Chelidonidis more, nam hæc eſt vera & genuina Saxifraga montana, à flore & capſula ſeminali, ſeminibus inibi contentis, datur plantæ jam delineatæ, ſpecies minor, quoad folia & caules.

℥ Saxifraga aurea Lichenis facie: Hæc Saxifragæ aureæ, ſpecies, ſatis frequentèr reperitur in rivulis aquæ dulcis, à fontibus jugibus manantibus. Folia gerit oblonga, ſerrata hirta per terram ſtrata. Floſculos in alis, luteos; quin & primo intuitu,

intuitu, à Saxifraga aurea montana rotundifolia, diſcernitur, à foliorum, denſa diſpoſitione, & forma longa, cum alterius, montanæ, ſint rotunda & rariora.

♃ Scabioſa Gramineis foliis glabris: Hæc adeò eſt ſimilis, Scabioſæ: argenteo, folio, quod hæc, folio glabro ſit. Altera, folio argenteo, ſeu, incano prædita. Utraque eſt Calyce membranaceo, & ſemine lanuginoſo, donata.

♃ Scabioſa foliis diſſectis, flore amplo, Calyce membranaceo, ſemine lanuginoſo: Hæc folia, admodùm tenuitèr diſſecta, Columbariæ adinſtàr habet; ſed flores gerit amplos, dilutè cœruleos, quorum ſingulis ſuccedunt, ſemina lanuginoſa, Calyce amplo membranaceo, donata.

♃ Scabioſa minima, annua, erecta ſemine anguloſo: Vulgaris inſtàr, hæc Scabioſæ ſpecies eſt. Pedales & ſeſquipedales profert caules, erectos. Folia, vulgaris quodammodò æmula, ſed multò minora. Flores itidèm multò minores, carneos: quin & ſemina habet, vulgaris ritu, anguloſa.

♃

Scorzonera noſtras, pulverifera: Hæc in pratis humidis & udis, Italiæ Galliæ & Germaniæ, inter perfectas noſtrates provenit, in pratis inquam & ſylvis humidis; ſecus fluviorum margines, ſitis; à noſtrate perfectum florem & ſemina gerente, in hoc ſolo, differt, quod in hujus caulium ſummis, naſcitur, globulus, Bellidis majoris more, Calyculo inexpanſo: in cujus ſinu, loco floris continetur pulvis ferrugineus, ad Cynaberis colorem, valde accedens. Subtilitate nulli, peritiſſimi artificis manus induſtria, facto, ſecundus. Imò brevi, partim pluviis ingruentibus, partim humidis deciduis (nocte) vaporibus, accedente ſolis diurno calore, in materiam fæci vini ſimilem, exſiccatam, degenerat: Quam Tartarum vini, acetarii, nominant: qua tandem decidente, apparet apex cauliculi, ad modum dentis Leonis (caput Monachi dicti) floribus & pappo ſuo exutus. Scorzoneram ritè dici arguunt partium diſpoſitio & omnimoda cum Germanica ſeu noſtrate conformatio, excepto Apice. Pulverifera dicta,

quod loco floris & consequentèr seminum, pulverem (ferruginei coloris) in Calyculo caulium, Apici innascenti, gerat. Viget in omnibus pratis humidis Galliæ indifferentèr cum nostrate, seu Germanica dicta. Apex autem pulverifer, ab Aprili medio, usque ad idus Maii exactas, perseverat, nec ultra hoc tempus, ipsum conspicere licet, cum sit tantum vitium naturæ, à Cœlo aut solo proveniens. iisdem viribus, & radix & folia sunt prædita, quibus & nostras perfecta, ut ex radicis, foliorum colore, sapore, succoque lacteo, totiusque plantæ consistentia, colligere licet; idem observare licet in Tragopogo & aliis, ut sæpe nobis fuit obvium, in peregrinationibus nostris Botanicis, sereniſſimi, principis Gastonis Franciæ, impensis & liberalitate factis.

♃ Scrophularia foliis & caule hirsutis: Hæc Scrophulariæ species folia habet hirsuta, lanuginosa, Urticæ quasi æmula, quin & caules producit multò humiliores, vulgaris caulibus; paritèr hirsutos, flores & capsulas bivalves Pyramidales, vulgaris more habet. ♃

♃ Scutellaria Americana, Malvæ folio: Planta eſt emittens folia, quodammodò Malvæ foliorum æmula (quoad figuram) ſed majora è quibus proſilit caulis, ſeſquipedalis, rectus, plurimos in faſtigio fundens flores verticillatos Galeatos, quibus evanidis ſuccedunt capſulæ, tali inſtar, qui ſupponitur, mulierum Calceis, ſi poſteriùs inſpiciatur capſula, ſi autem ſuperiùs conſideratur capſula ſeminalis, Scutellam omninò refert, cavitate ſua, in ſuperiore parte. Nos hanc exoticam addimus novo generi à nobis deſignato. Scutellariam appellando ex variis nominibus, ab authoribus Botanicis, variis in locis diſpoſitis: ut cuilibet conſideranti, clariſſimè apparebit ex doctrina de Hallucinatione Caſpari Bauh. in Pin. tam in denominandis quàm digerendis plantis. Nos omnes plantas, capſulas ſeminales, Scutellatas, ad eundem modum efficientes Scutellatas appellavimus, & Scutellariæ, novum genus creavimus.

♃ Securidaca peregrina: Fortè Pareſſeux Galica; id eſt planta ſenſibilis pygra

Legumen est, cujus unicuique, foliorum Rachi, seu nervo medio; è regione, plurima adnascuntur folia, dena duodena, uno extremum claudente. Nec siliquam nec semen observavi. In horto Regio Blesensi floruit, sed per rigorem tempestatis, anni periit sine siliqua aut semine. Pigrè seu lentè se movet, tacta.

Securidaca minor lutea, siliquis articulatis: Vide Ornithopodium δυκέρατον minus nobis. Scorpioïdes altera Johan. Bauh. in horto Regio Blesensi aucto.

Sedum longifolium Citrino flore: Hæc sedi species, à sedo longo folio vulgari, solo, floris Citrini colore; differt. Quippe vulgare teritefolio; aureo seu luteo donatur flore, semen & capsula seminalis, hujus & illius, eadem; frequentèr reperitur in rupibus Saxosis, ad dextram Viæ communis, eundo Blesis, in oppidum, pictonum caput; vix milliare, ab oppido distantibus.

Sedum teretifolium majus flore albo: A præcedenti solo floris colore differt. Circa Rupellam, frequens satìs in tectis, & summis murorum, reperitur.

♃ Senecio Jacobææ folio: Hujus folia omninò ſunt Jacobææ, in modum ſecta, ipſis in omnibus ſimilia, at dum florem edit, Senecionem ſe prodit, quia Senecio florem fert, multis ſtaminulis luteis conflatum. Sine foliis latis, ſtellatim aut rotatim, ipſa ſtamina cingentibus, quod videre eſt in hujus flore.

♃ Sideritis glutinoſa, bitumen redolens: Hæc Sideritidis ſpecies, Dodrantalis eſt altitudinis, cujus folia, ex adverſo ſita, ſunt hirta, glutinoſa. Caulibus (binatim) adhærentia, contacta manibus, & naribus admotis: bitumen redolent, flores albos & ſemina reliquarum Sideritidum modo fert.

♃ Sinapi ſiliqua hirſuta, ſemine rubro: Hæc Sinapi ſpecies à vulgari, ſiliqua hirſuta, ſemine albo, ſolo ſeminum colore differt.

♃ Sium minimum ferulaceis foliis: Sium hoc ad margines fluviorum, per ſiccitatem æſtatis, exſiccatorum reperitur. Vix palmarem excedit altitudinem: folia gerit ferulacea ſeu Fœniculacea, craſſa biuncialia, aut triuncialia: pediculos

parùm aut nihil Palmum ſuperantes, edit. In quorum faſtigiis naſcuntur floſculi umbellati albi, quorum ſingulis deciduis ſuccedunt bina ſemina, minuta, ſtriata, aliarum hujus generis umbellarum more.

♂ Solanum foliis & caule ſpinoſis: Hujus folia ſunt lata, angulosa, ſinuatave, ſpinis armata, quemadmodùm etiam caules, ſpinis armantur, flores fert Solani modo, aut potiùs borraginis, ſemina nunquam obſervare licuit quippe perennis eſt planta, radice per terram longè latéque repentè, dotata. Ideò natura, minùs productioni ſeminum intenta, quod in pluribus repentibus obſervavimus.

♂ Solanum fœtidum pomo grandibus aculeis donato: At nobis, pomo aculeis craſſioribus & longioribus donato: Hæc Solani ſpecies, & folia & flores vulgaris foliis & floribus, multò gerit minora, poma autem aculeis, multò craſſioribus & longioribus prædita, fert.

♂ Solanum pomiferum fructu rotundo, parvo, molli, rubro, plano: Vulgò pomum

mum amoris hoc, dicitur authoribus. Fructu eſt ceraſi inſtar (quoad magnitudinem) nunc, luteo, nunc, rubro eſt colore.

☞ Solanum pomum amoris, fructu, ſtriato molli, aureo: Hujus pomum, ſeu fructus, ſolis ſtriis, à molli aureo plano majore differt.

T.

☞ TELEPHIUM Portulacæ folio: Hæc Telephii ſpecies, ſola craſſitie, ſeu ſpiſſitudine foliorum, Portulacæ æmulorum, à cœteris ſuæ claſſis, facilè diſtinguitur.

☞ Teucrium regium purpureum: Hæc Chamædryos ſpecies, multò altior eſt vulgari, humilior Teucrio fruteſcenti vulgari: floſculos gerit amplos rubros, Galeatos. Quibus pereuntibus ſubveniunt ſemina itidèm magna: folia ſunt Lucida, obſcuréque virentia.

♃ Thalictrum pratense maximum, Monspelienſium aſperioribus foliis ſeu: Folio rugoſo; nobis. Hæc Thalictri ſpecies ad ternos quaternos, pedes aſcendit. Folia, rugis ſcatentia, gerit, in ſuperiori, ſeu prona ſuperficie, dilutiùs virent, quam, pratenſe vulgare. Muſcarium ſeu Muſcoſos flores edit luteos, ſemina rugoſa (aliorum more) & ſtriata, (excepto Thalictro Canadenſi, Cornuti: quod ſemina gerit triangula) omnia Thalictra habent ſemina ſtriata.

♃ Thaſpi Iberidis folio, tenuiſſimè diviſo: Hoc, omninò Thlaſpi Iberidis folio accedit; in omnibus, niſi quod folia habeat, multò tenuius diſſecta. Flores & ſemina, cœteraſque partes minores.

♃ Thlaſpi Alyſſum minimum: Hæc Thlaſpios ſpecies, eſt à flore, ſemine omnibuſque ſuis partibus à prioribus, (majore & minore videlicet) notu facilis, propter exiguitatem partium.

♃ Tithymalus Caracias lanuginoſus: Hic Tithymalus paſsim in ſylvis Galliæ Solonienſis, provenit, & à foliis lanugine

ne obductis, à cœteris, suæ sortis facilè cognoscitur.

♃ Tithymalus Caracias radice repenté: Folia gerit oblonga, radicem longè latéque serpentem producit qua nota distinctu est facilis.

♃ Tithymalus Caracias radice pyriformi: Sola radicum tuberositate pyriformi, dignoscitur inter omnes Tithymalos (Caracias) dictos.

♃ Tithymalus Caracias, Salicis minoris folio: Hic à similitudine, foliorum Salicis longifoliæ vimineæ, notatu facillimus.

♃ Tithymalus Linariæ folio, lunato flore: A foliis Linariæ similibus & flore, Lunæ crescentis, referente figuram; absque longa verborum serie, facilè dignoscitur.

♃ Thymum Creticum fruteſcens: Planta, est seu potiùs Suffrutex, sesquipedalis, nudos edens cauliculos, foliolis longis, Satureiæ omninò similibus, onustos, quin & odorem fragantissimum, inter Thymi & Satureiæ, medium, suggerit.

♃ Tragopogon pratense luteum minus:

Hæc

Hæc Tragopogi ſpecies, ſola partium ſuarum, præcipuè florum & ſeminum, foliorumque parvitate, à majore differt deſcribitur à Parkinſono, in Theat. Botanico.

♃ Trifolium bitumen redolens majus: Hoc à minore omnibus ſuis partibus magnitudine ſolummodò diſtinguitur, præcipuè florum & ſeminum.

♃ Trifolium pratenſe majus album, caulibus fiſtuloſis, foliis ſubtùs punctatis nigris: Hoc Trifolium, in pratis udis & humidis creſcit. Cauliculos profert procumbentes cavos ſeu fiſtuloſos, pedales & ſeſquipedales, in quorum, ſummis alis exeunt flores ſubalbidi, ſeu Ochroleuco colore præditi. Planta hæc ad extremum pediculorum, producit terna folia ſubtùs maculata, maculis nigris ſeu fuſcis obducta.

♃ Trifolium album, ſubterraneum, Tricoccon, regium: Hoc Trifolium paritèr in udis & humentibus arvis ſeu pratis provenit. Ineunte æſtate flores fert albos, quorum ſingulis deciduis ſuccedunt, involucra, reticuli in modum, facta.

cta. Continentia terna ſemina, utplurimùm, ſtatìm evaneſcenti flore, in terram deſcendunt rudimenta ſeminum, ſeſeque ibidem condunt, inibique perficiuntur, ideò ſubterraneum nuncupavimus. A trinis ſeminibus (utplurimùm, niſi Cœlum & ſolum refragentur) Tricoccon diximus; denique regium addidimus, quoniam, ab ipſa celſitudine ejus regia, aurelianenſi duce (ut plurimæ aliæ plantæ hic ſcriptæ) primò detectum fuit.

♃ Trifolium nodoſum capitulis Thymi: Perexigua eſt hæc ſpecies Trifolii ſub exitum hyemis: Palmares & ſeſquipalmares, edens cauliculos per terram ſtratos, ad quorum ſingulos nodos, naſcuntur floſculi minimi, quibus deciduis, ſuccedunt vaſcula plurima, ſimul ad nodos juncta: Thymi capitulis ſimilia.

♃ Trifolium Salmanticenſi affine: Hæc Trifolii ſpecies, Salmanticenſi Cluſ. adeò accedit ut idem videatur, niſi quod, (quoad omnes partes) ſit minus.

♃ Trifolium veſicarium ampullatum, Rubello flore: In humidis Sabuloſis in ora maritima Armoricæ, & prope Rupellam,

pellam, copiosè satis pullulat hæc Trifolii species, vix Dodrantalem excedit altitudinem, imò frequentèr ad palmarem vix pervenit. Floſculos globatim gerit elegantes, dilutè rubri coloris. Quibus evaneſcentibus, ſuccedunt ampullæ, in modum veſicarum membranacearum; continentes, ſemina ſubflava, Trifolii fragiferi inſtár.

♃ Trifolium cochleatum majus, fructu globoſo plano: Fructum fert Cochleatum planum, globuli inſtar: hoc Trifolium. Et eo nomine à cœteris Cochleatis, perquàm facilè notu.

♃ Trifolium Cochleatum, ſpinoſum, majus, ſpinis ſursùm & deorsùm tendentibus: Hujus fructus eſt Cochleatus, Cœraſi magnitudine, ſpinis, ſursùm & deorsùm tendentibus atque hac nota, facilè cognoſcitur; eſt & hujus alia ſpecies fructu Ceraſi, itidem magnitudine, ſpinis rectis cujus folia ſunt, cordata maculata. Medicæ Arabicæ, Camerarii inſtár.

♃ Trifolium Cochleatum, ſpinoſum minus, nigrum Ciliare: Hæc Trifolii ſpecies,

cies, inter Cochleatas, radice eſt perenni, longè latéque repente, medicæ falcatæ vulgaris more; in ſummis caulium Bipedalium, multa vaſcula, ſeu fructus Cochleatos, ſpinoſos congeſtìm fert nigros, Ciliares (guillandino, ſatìs appoſitè, medica Ciliaris dicta) quia ciliorum pilis nigris, perquàm ſunt ſimilia. Unde à radice perenni, repente: Quod ſolummodò, medicæ marinæ incanæ &, Ciliari huic medicæ guillandini, convenit, inter omnes medicas Cochleatas, facilè cognoſcuntur: cœteræ quippe annuæ ſunt.

☙ Trifolium Cochleatum ſpinoſum minus δυκάρπον, ſeu ωλυγοκάρπον hæc parva Trifolii ſpecies, mille paſſus à capite Bleſenſium, prope Cellam, Eremitarum, copioſiſſimè provenit. Eſt vix triuncialis, in Aridis illis locis ſeu collibus Saxoſis: fructum fert rotundum, Cochleatum (ad Piſi majoris magnitudinem) ſpinoſum, binatìm è nodis Caulium (per terram ſtratorum) exeuntem.

☙ Trifolium Lagapoïdes, flore pallido luteo: ſeu Ochroleucon: Hoc in ſylvis meridio-

meridionalibus, Bleſenſibus, ſatìs copiosè provenit. Folia edit terna, incana lanugine obſita: in faſtigio caulium erectorum, Dodrantalium, proveniunt, ſpicæ oblongæ, Lagopi inſtár: coloris ſubalbidi ſeu potiùs (ut cum Cluſio loquar) ex ὀχρωλεύκῳ compoſitæ. Semina & ſeminales capſulas aliorum, ſuæ familias more, producit.

♃ Trifolium Acetoſum, Corniculatum Indicum, rectum: Hujus caules eriguntur rectâ & ad pedalem, altitudinem, folia, flores & ſiliquas ſeu Cornicula fert, repentis lutei minoris, quoad omnes ſuas partes, multò majora. Nota inſuper hoc exoticum eſſe, cum repens luteum minus paſsim in Britannica Gallia, ſeu Armorica provenit.

V.

V.

VALERIANELLA noſtras, major Scabioſæ ſemine: Hæc à Valerianella Scabioſæ ſemine, à doctiſſimo Fabio columna deſcripta & picta, ſola magnitudine ſeminum, præcipuè differt: quod, duplò ſunt majora, ipſius ſeminibus, à colum. deſcripti.

Valerianella, ſemine hirſuto, extremo umbilicato: Hæc ſemina gerit (quoad formam ſeu figuram) Uvarum acinis, ſimilia. Sed hirta & ad extremum umbilicata, ſeu magis cava.

Valerionella ſemine hirſuto minore rotundo: Hujus ſemen eſt hirſutius, prioris ſeminibus, valdè caucalis minoris ſemini (quoad figuram) accedens. Spontè provenit in picardiæ novalibus.

Valerionellæ vulgaris, ſpecies major Serotina, ~~præcox~~ Vulgaris (dicta lactuca agnina Gerardo) præcocior eſt; verna eſt planta, ineunte vere flores fert, ſubcœruleos, ſemina compreſſa, tumidi-

uſcula

uſcula tamen habet, ſtatimque diſparet. At hæc, cum frumento ſub finem æſtatis, matureſcit. Seſquipedalis eſt planta, erecta, inter ſata creſcit, flores fert albos. Semina, prioris vulgaris ſeminibus, duplò majora, & multò craſſiora & rotundiora producit. In ſatis arvis, intra ſepta Regiæ Chambort & alibi circa Bleſas, inter ſata reperitur: ſatis frequentèr.

♃ Verbaſcum ramoſum, floribus albis parvis: Folia gerit quaſi Cinere obducta, caulículos edit Bipedales, & Tripedales ramoſos: ſuſtinentes plurimos, flores albos, parvos. Qucrum, ſingulis deciduis, ſuccedunt: Valvulæ bicapſulares, mucronatæ, duplici loculamento diſtinctæ, minuta ſemina ſubruſa, hinc indè continentes aliorum more.

♃ Verbaſcum perenne nigrum floribus albis: Hæc Verbaſci ſpecies folia gerit ſubviridia, flores gerit, itidem albos, minutos, quibus paritèr, ſuccedunt capſulæ bivalves, minuta ſemina minuta (ut cœtera ſuæ familias) in ſe continentes perennis eſt planta.

♃

℥ Verbena Urticæ folio: Planta eſt Bipedalis, aliquandò altior, è regione; ad caulium. Nodos, quadratorum, bina naſcuntur folia, mucronata, Urticæ majoris foliis, haud abſimilia; ſed ſaturatiùs virent, quoad flores, & ſemina, Verbenæ vulgari, in omnibus accedit.

℥ Veronica ſpicata, flore purpureo: Hæc à vulgari, flore cœruleo, ſolo florum colore differt.

℥ Vicia maxima annua, foliis ſerratis: Hæc ſolis foliorum inciſuris, ſerræ, ſimilibus, à vulgari Vicia maxima, annua (perperàm, authoribus Faba Græcorum dicta) differt, cum hæc capreolis donetur, Viciam ſeſe declarat, porrò nec ſiliquam, nec fructum, Fabæ, conformes habet. Judicent lectores attentè. Plura addere non expedit impræſentiarúm.

℥ Vicia præcox verna, minima Soloniensis, ſemine Hexedro: Hæc omnium hujus ſeriei, eſt planta minima, ſub exitum hyemis, in pratis, contra Regiam Chambort, floret. Florem fert dilutè rubentem, ſiliquam vix pollicarem edit quin & ſemina angulosa, minuta, Hexe-

dram referentia, unde ei nomen à nobis inditum, datur & Lathyrus, Gramineis foliis, ejuſdem formæ, quaſi gerens ſemina, Hexedram referentia: de quo ſupra diximus.

ℭ Vicia ſiliquis glabris, flore violaceo: Eſt Viciæ ſ. Craccæ minimæ ſpecies, ſiliquis glabris Joh. Bauh.

ℭ Viola Granadillæ folio: Hæc Viola exotica, ſemine & floribus, noſtrati vulgari, Martiæ, omninò conformis eſt ſimilem violaceo colore præditum, fert florem: Sed folia habet lata, ſinuoſa, in plurimos Lobos profundos diviſa Granadillæ ſeu floris paſſionis, Granadillæ majoris modo, unde ei nomen datum.

ℭ Virga aurea foliis lævibus, non ſerratis: Hæc folia gerit læviora longioraque, vulgaris Virgæ aureæ foliis: ſed nullam, in margine patiuntur ſerraturam.

ℭ Virga aurea Americana, foliis ſerratis anguſtis, ſubtûs nervoſis: Hujus folia ſunt ſubtûs adeò nervoſa, & eminentèr anguſta, maximèque ſerrata, quin & radicem habet odoratiſſimam; hiſce notis notu facilis. ℭ

ꝟ Virga aurea Americana hirſuta, radice odorata, foliis ſerratis: Hujus folia ſuperiùs, quaſi pube obducuntur, & hac nota cognitu inter cœteras, (junge quod ſint multò latiora, multoque profundiùs ſerrata, ſuperioris foliis) facilis eſt.

ꝟ Virga aurea humilis Alpina: Hæc in omnibus vulgari accedit; ſola parvitate diſcrepans, eſt enim Virga aurea vulgari triplò minor. Cætera ei par.

ꝟ Virga aurea, altera Solidago Saracenica: Foliis minùs ſpiſſis, conſtat, quàm Solidago vulgaris. Ad altitudinem, quatuor plùs minuſve pedum, aſſurgit. Frequentèr nobis fuit obvia, in declivibus, Regionis illius Galliæ (Morvan dictæ) inter Burgundiam & Burboniam ſitæ.

ꝟ Urtica racemoſa Canadenſis: Hujus folia ſunt multò obſcuriùs virentia, quàm Urticæ noſtratis majoris: inſupèr hujus folia non pungunt, quippe non copioſè pube pungente, armantur: in cœteris, ei, ſemine & floribus par.

Obſervationes Generaliores
EX
Horto Regio
BLESENSI
Auctо, Collectæ:
BOTANICÆ
Rei, ſtudioſis, neceſſariæ, & cognitu perutiles.

Arbores, perpetua fronde, virentes.

Pomiferæ.

Malus Aurantia. Malus Limonia. Malus Citria.

Coniferæ & Reſiniferæ.

Abies. Pinus.
Picea. Pinaſter.

Cedrus Libani, .ſ. Conifera.
Cupreſſus mas.
Cupreſſus fœmina.
Cupreſſus humilis .ſ Cedrus Lycea.

Glandiferæ.

Ilex Glandifera.
Suber.

Bacciferæ.

Laurus vulgaris.
Laurus Indica Baptiſt. Ferrarii.
Laurus tinus ejuſque ſpecies.
Agrifolium .ſ. Ilex Baccifera.
Juniperus.
Myrtus.
Alaternus.
Phillyrea.
Pyracantha.
Taxus.
Hedera arborea.

Aliæ variæ.

Ceraſus Lauri folio.
Thuya .ſ. Arbor vitæ.
Arbutus.
Buxus.
Althæa Syriaca.

Reſiniferæ foliis deciduis.

Larix.
Terebynthus.
Lentiſcus.
Styrax.

Frutices

Frutices & ſubfrutices perpetua fronde virentes.

Barba Jovis.
Cytiſus Maranthæ.
Geniſta Hiſpanica.
Geniſta vulgaris.
Jaſminum luteum.
Roſmarinum.
Roſa ſempervirens.
Sabina.
Rhus Myrtifolia.
Althæa arborea Olbiæ.
Malva Hiſpanica.
Sedum vermiculatum.
Salvia Verbaſci folio & ejus ſpecies.
Atriplex Halimus, & Portulaca marina.
Chamælea tricoccos.
Laureola.
Erica ejuſque ſpecies.
Aſtragalus Bæticus.
Chamædrys Arboreſcens & vulgaris.
Colutea ejuſque ſpecies.
Ciſtus mas.
Ciſtus fœmina eorumque ſpecies.
Chamæciſtus.
Anonis montana purpurea.
Caryophyllus Creticus.
Cneorum Matth.
Ruſcus.
Hypogloſſum ſ. Laurus Alexandrina ejuſque ſpecies.
Hiſſopus.
Lavendula.
Thymum.
Satureia ſempervirens.
Pimpinella ſpinoſa ſ. Poterion.
Ruta.
Clematis Daphnoïdes major & minor.
Abrotanum.
Abſynthium.
Smilax aſpera.
Stœchas Arabica.
Thymelæa.
Tragacantha.

Herbæ perpetua fronde virentes.

Salvia hortenſis ejuſque ſpecies.
Polium ejuſque ſpecies.
Majorana.
Marum Syriacum.
Marum, Maſtic. Gallorum.
Hedera terreſtris.
Lamium luteum variegatum.
Bugula.
Prunella.
Serpillum.
Ageratum.
Aloë Americana.
Aloë vulgaris.
Yuca.
Keiri Arabum ejuſque ſpecies.
Leucoium marinum incanum ejuſq; ſpecies.
Leucoium viridi folio odoratiſſimum.
Draba repens.
Naſturtium aquaticum.
Thlaſpi ſpinoſum luteũ.
Thlaſpi ſupinum luteum.
Cochlearia.
Anagallis aquatica.
Azarum Canadenſe.
Azarum vulgare.
Bellis.
Auricula urſi.
Primula veris.
Caryophyllus ejuſque ſpecies.
Caryophyllus Holoſteus tomentoſus.
Caryophyllus minor marinus Globoſus.
Armerius.
Lychnis Cotonaria .ſ. Coronaria.
Sedum vulgare.
Sedum Arboreſcens.
Sedum Roſaceum ſerratum ejuſque ſpecies.
Sedum Vermiculatum ejuſque ſpecies.
Telephium ejuſque ſpecies.
Tithymalus Caracias ejuſque ſpecies.
Tithymalus Myrſinites, &c. Sani-

Sanicula.
Pſyllium ſempervirens.
Chamæmelum nobile.
Coris cœrulea.
Cymbalaria Italica.
Eryngium marinum.
Ficus Indica { major. / .ſ. Opuntia. { minor.
Gentianella verna.
Hypericum perfoliatum & perforatum.
Fragaria.
Jacea luſitanica ſempervirens.
Scabioſa Cretica Arboreſcens.
Trifolium hæmorrhoïdale.
Antirrhinum.
Champhorata Monſpelienſium.
Carthamus cœruleus.
Capillares omnes.
Filices quædam.
Polypodium.

Plantæ ſuccum Lacteum fundentes.

Ficus ejuſque ſpecies.
Nerium .ſ. Laurus Roſea.
Hæ duæ Arbores ſuccum reddunt; hujus viridis illius lacteus, emanat.
Apocynum ejuſque ſpecies.
Aſclepias ejuſque ſpecies.
Convolvulus ejuſq; ſpecies.
Rapunculus ejuſque ſpecies.
Campanula, Trachelium .ſ. Cervicaria ejuſque ſpecies.
Viola pentagonia, Onobrychis dicta, ejuſque ſpecies.
Cichoreum Intybus ſeu Endivia

Endivia ejuſq; ſpecies.
Lactuca ejuſque ſpecies.
Sonchus ejuſque ſpecies.
Chondrilla ejuſque ſpecies.
Hieracium ejuſq; ſpecies.
Piloſella ejuſque ſpecies.
Dens Leonis ejuſq; ſpecies.
Tragopogon ejuſq; ſpecies.
Scorzonera ejuſque ſpecies.
Carduus Scolymus ſeu Eryngium luteum.
Seſeli paluſtre lacteſcens.
Thyſſelium Dod.

Plurimæ umbellæ montanæ, ex radice inciſa, ſuccum fundunt lacteum.

Papaver ejuſque ſpecies.
Rhœas ejuſque ſpecies.
Argemone ejuſque ſpecies,
Tithymalus ejuſque ſpecies.
Eſula & ejus ſpecies.
Cataputia, peplus, peplis, Chamæſyce.

Hæ duæ Plantæ ſequentes ſuccum fundunt rubentem.

Beta rubra.
Lapathum ſanguineum.
Chelidonium majus ſuccum reddit aureum.

Plantæ

Plantæ tuberoſæ .ſ. tuberoſa radice præditæ.

ANEMONE, omneſque ejus ſpecies.
Pulſatilla.
Ranunculus
- Aſiaticus.
- Illyricus.
- Montanus.
- Grumoſus, tuberoſus.
- Chelidonium minus.
- Aſphodeli radice.
- Rutæ folio, &c.

Geranium
- Triſte Cornuti.
- Tuberoſum.
- Batrachoïdes.
- Hæmatodes, &c.

Cotyledon
- radice rotunda.
- radice oblonga.

Rhodia radix.
Telephium ejuſq; ſpecies.
Saxifraga alba Chelidonides.
Bulbocaſtanum.
Orchis
- Teſticulata.
- Palmata, diverſæ earundem, omnes ſpecies.

Dens Caninus.
Dentaria.
Fumaria radice
- Canadenſis tuberoſa: Cornut.
- cava,
- non cava.

Biſtorta ejuſque ſpecies.
Doronicum radice
- Brachiata.
- Scorpioïde.

Chryſanthemum radice
- rotunda vide
- oblonga Battatas.

Aconitum ejuſque ſpecies & anthora.
Pimpinella ſanguiſorba.
Scrophularia.
Panax Coloni .ſ. Sideritis ſtrumoſa.
Cariophyllata.
Tormentilla.
Lathyrus v. Apios
- noſtras.
- Americana Corn.
- Sylv. repens Park.

Cycla-

Cyclamen ejuſque ſpecies.
Arum.
Ariſarum.
Dracuntium.
Symphytum tuberoſum.
Solanum tuberoſum vide Battatas.
Calceolus mariæ.
Orobanche ſeu Rapum Geniſtæ & Dentaria.
Tithymalus { Apios. Pyriformi-radice.
Polygonatum .ſ. ſigillum Salomonis.
Accorus verus.
Iris tuberoſa ejuſq; ſpecies.
Ariſtolochia { rotunda. longa.

Battatas { Indiæ Occidentalis .ſ. Inhame Orientalis luſitanorum, ſpecies Convolvuli lacteſcentis. Canadenſis, Chryſanthemi ſpecies Virginiana, Solani ſpecies.
Bryonia { alba. nigra.
Gramen { Nodoſum. Typhodes ſeu Perſarum inſtar.
Cyperus { edulis Thraſi. litoreus inodorus. aliæque ejus ſpecies.
Nymphæa lutea major.

Plantæ,

Plantæ, Carnosa radice, præditæ:

Coniformes seu Pyramidales.

Asphodelus { albus. luteus.
Alectorolophos alpina.
Rapuntium, Trachelium, Campanula eorumque species.
Napus.
Rapum radice { longa. rotunda.
Raphanus sativus { ruber niger.
Raphanus rusticanus & sylvestris.
Beta rubra radice Rapæ.
Lapathum ejusque species.
Oxalis ejusque species.
Dens Leonis.
Tragopogon.
Scorzonera.
Centaurium majus ejusque species.
Carlina.
Eryngium.
Fœniculum.
Sisarum.
Ænanthe ejusq; species.
Apium ejusque species.
Pastinaca sativa, latifolia.
Pastinaca sativa tenuifolia, Carota.

Omnes Umbella montanæ, luteos gerentes flores, radicem habent crassam, carnosam, Coniformem s. Pyramidalem cum medulla duriore in meditullio: Lacteſcunt ut plurimum.

Nardus radice { olivari. oblonga.
Circium ejusque species.
Valeriana.
Filipendula.
Mentha tuberosa.
Pœonia ejusque species.
Mandragora.
Mirabilis peruviana.

Arbores

Arbores Calidæ.

Ficus.
Nerium.

Bacciferæ Calidæ.

Terebinthus.
Lentiscus.
Laurus domestica.
Laureola, sempervirens.
Mezereon Germanicum.
Chamelæa tricoccos.
Thymelæa.
Rhamnus solutivus.

Coniferæ & Resiniferæ Calidæ.

Abies.
Picea.
Pinus.
Pinaster.
Cedrus Libani .s. Conifera.
Larix.
Thuya .s. Arbor vitæ.
Cupressus.
Cedrus Lycia; cupressi minor species.
Juniperus.
Sabina.
Styrax seu Storax.

Subfrutices Calidi.

Rosa ejusque species.
Apocynum ejusque species.
Asclepias ejusque species.
Clematis ejusque species.
Lupulus.

Plantæ

Plantæ Calidæ.

Convolvulus ejuſq; ſpecies.
Naſturtium Indicum.
Glycyrrhiza vulgaris.
Melilotus ejuſq; ſpecies.
Fœnugræcum.
Iris tuberoſa.

Bulboſæ Calidæ.

Crocus autumnalis, ſaltem ejus ſtamina.
Cepa.
Allium.
Moly.
Porrum.
Scilla.
Lilium album.
Narciſſus.
Hyacinthus.
Rapunculus ſeu Campanula ejuſque ſpecies.
Trachelium ſeu Cervicaria ejuſque ſpecies.
Gratiola.
Hypericum.
Ruta.

Siliquoſæ tretrapetalæ Calidæ.

Braſſica.
Sinapi.
Eruca.
Naſturtium ſiliquoſum.
Draba ſiliquoſa.
Eryſimum ſeu Irio.
Napus.
Rapum.
Rapiſtrum.
Raphanus ſativus. ſ. Radicula.
Leucoium.
Heſperis.
Dentaria.

Siliculoſæ

Siliculoſæ tetrapetalæ Calidæ.

Thlaſpi.
Naſturtium ſiliculoſum.
Burſa paſtoris.
Cochlearia.
Iberis.
Lepidium.
Draba ſiliculoſa.
Raphanus ſylveſtris.
Raphanus hortenſis ſeu Ruſticanus.
Myagrum.
Rapiſtrum Monoſpermon.
Coronopus Ruellii.
Veronica ejuſq; ſpecies.
Polygala.
Perſicaria urens.
Agrimonia.

Lactescentes Cichoraceæ & pappoſæ, per ſe omnes (quippe amaræ) ſunt Calidæ.

Corymbiferæ Calidæ.

Conyza.
Abrotanum.
Abſynthium.
Artemiſia.
Tanacetum.
Matricaria.
Chamæmelum.
Millefolium.
Ptarmica.
Ageratum.
Pimpinella & Agrimonoïdes Col.

Umbelliferæ omnes ſunt magis aut minùs Calidæ.

Verticillatæ Galeatæ, Calidæ.

Mentha.
Calamintha.
Clinopodium.
Pulegium.
Marrubium.
Dictamnus verus.
Pſeudodictamnus.
Bætonica.

Stachys.

Stachys.
Sideritis.
Lamium.
Meliſſa.
Tragoriganum.
Origanum.
Salvia.
Horminum.
Acinos.
Meliſſa peregrina.
Polium.
Chamædrys.
Chamæpitys.
Roſmarinum.
Hyſſopus.
Lavendula.
Stæchas.
Majorana.
Thymum.
Serpillum.
Satureia.
Ocimum.

Calidæ variarum claſſium.

Centaurium minus.
Pulſatilla.
Anemone ejuſque ſpecies.
Ranunculi omnes, exceptis Perpaucis.
Arum.
Ariſarum.
Dracunculus major.
Capſicum ejuſq; ſpecies.
Tithymali omnes, Eſulæ & Cataputia.
Sedum vermiculatum acre.

Purgantes omnes ſunt Calidæ: vide infra Purgantes.

Plantæ Frigidæ:

Pomiferæ Scandentes.

Melo:
Cucurbita.
Pepo
Citrullus ſ. Anguria.
Cucumis.

Dum ſucco alimentitio abundant, refrigerant, at ſemina (quippe olco abundant) exſiccata, calefaciunt: Contra communem Dogma.

Beta.
Blitum.
Mercurialis.
Spinachia.
Lapathum.
Acetoſa.
Biſtorta.

Lactiſcentes Cichoraceæ & pappoſa per accidens ſunt Frigidæ, dum ſucco alimentitio abundant: at quatenus amaræ Calefaciunt, & apperiunt.

Acanthus.
Plantago.
Holoſteum.
Coronopus, ſpecies Plantaginis.
Pſyllium.
Viola.
Malva.
Althæa.
Mercurialis.
Mandragora.
Hyoſcyamus,
Portulaca.
Sedum ejuſque ſpecies omnes, præter acre.
Telephium

Telephium.
Cotyledon.
Saxifraga { Chelidonides / Aurea.
Sanicula.
Papaver ejusque species,

per accidens dum succo alimentitio abundant; ut & Cichoraceæ & papposæ lactescentes refrigerant: de quibus alibi prolixius disseritur.

Arbores, frutices, subfrutices, & Plantæ purgantes.

Sorbus, ornus dicta, ex qua manna elicitur.
Tamarindus.
Cassia solutiva.
Rhamnus Catharticus.
Malus Persica ejus flos.
Senna.
Genista.
Rosa { pallida / alba Mos. / chata } utriusque flos.
Laureola.
Mezereon Germanicum.
Chamelæa Tricoccos.
Tarton Rare.
Alypum montis Cete.

Plantæ purgantes succo.

Aloë vera.
Convolvulus ejusq; species (*per excellentiam scammonia Syriaca s. Antiochana est hujus speciei; ex qua fit diagredium.*
Cucumis Asininus *ex que extrahitur elaterium.*
Tithymalus, Esula & Cataputia: *quorum succo lacteo, adulteratur diagredium.*

Purgantes Radicæ

Filix fœmina.
Polypodium.
Lapathum ejuſq; ſpecies: *per excellentiam Lapathum, Rhabarbarum eſt præſtantiſſimum.*
Helleborus niger & albus.

Purgantes, aut vomitum cientes foliorum infuſione, aut decoctione.

Sedum vermiculatum,
Narciſſus.
Gratiola.
Braſſica rubra, criſpa.
Centaurium minus.
Linum Catharticum.
Cnicus .ſ. Carthamus, *ſemine purgat.*

Plantæ Venenatæ.

Nerium.
Apocynum.
Aſclepias.
Lolium.
Colchicum.
Cicuta.
Pyrethrum.
Solanum lethale.
Aconitum.
Fungi lethales.

Plantæ

Plantæ Vulnerariæ.

Pimpinella.
Apium.
Cicuta.
Marrubium.
Betonica.
Stachys.
Syderitis.
Salvia.
Horminum.
Hedera terreſtris.
Chamædrys.
Chamæpitys.
Bugula, Brunella.
Bellis.
Milleſolium.
Verbena.
Polygonum.
Polygonatum.
Alchimilla.
Sanicula.
Caryophyllata.
Plantago.
Pſyllium.
Ariſtolochia.
Cynogloſſum.
Symphytum.
Pulmonaria.
Nicotiana.
Craſſula ſeu Telephium.
Sedum.
Scabioſa.
Conſolida regalis.
Virga Aurea, Doria, & Solidago Saraçenica.

Plantæ Culinariæ.

Legumina, fructus horum inſerviunt Culinæ.

Phaſeolus.
Piſum.
Lathyrus.
Ochrus.
Lens.
Faba.
Lupinus.
Glycyrrhiza. *Hujus radix expeditur in Culina & Pharmacis.*

Plantæ Culinariæ.

Cærealea, horum grana inſerviunt Culinæ.

Triticum.
Secale.
Hordeum.
Oriza.
Avena.
Panicum.
Milium.
Panicum Indicum, Maïz dictum.

Plantæ Culinariæ.

Bulbi & folia, harum inſerviunt Culinæ, & Pharmacis:

Cepa.
Allium.
Moly.
Porrum.
Scilla.

Plantæ Culinariæ.

Radices harum inſerviunt Culinæ.

Rapuuculus ſeu Campanula.
Napus.
Rapum.
Raphanus { Sativus ſ. Radicula. / Niger Icon. Lob.
Raphanus ruſticanus.
Beta rubra Romana, ſeu Rad. Rapæ.
Trogopogon.
Scorzonera.
Chryſanthemum tuberoſum, *vide* Battatas de Cannada.
Solanum Eſculentum, *vide* Battatas de Virginea.
Convolvulus, Indiæ Occidentalis Inhame, *vide* Battatas ſuprâ.
Siſarum.

Siſarum.
Paſtinaca latifolia.
Paſtinaca tenuifolia ſeu Carota.
Apium ſeu Petroſelinum.

Plantæ quarum folia inſerviunt Culinæ, cocta.

Braſſica & ejuſque ſpecies.
Thlaſpi Holeraceum.
Naſturtium hortenſe.
Eruca ſativa.
Beta vulgaris ſativa.
Bonus Hendricus.
Spinachia.
Lapathum.
Acetoſa.
Lactuca ejuſque ſpecies.
Cichoreum, Intybus ſeu Endivia.
Tragopogon.
Scorzonera.
Calendula, hujus etiam flores.
Urtica minor & major.
Apium ejuſque ſpecies.
Cerefolium.
Myrrhis odorata.
Tanacetum.
Mentha.
Majorana.
Roſmarinum.
Thymum.
Satureia.
Borrago.
Buglóſſum.
Portulaca.

Plantæ quarum folia uſurpantur in Acetariis.

Lactuca.
Acetoſa.
Cichoreum.
Pimpinella ſpicata minor.
Braſſica minor (Brocali Italis) dicta.
Valerianella ſeu Lactuca agnina.
Viola pentagonia.

Coronopus hortenſis.
Sedum vermiculatum inſipidum, ejuſq; ſpecies.
Naſturtium { hortenſe. aquaticum.
Ptarmica .ſ. Dracunculus hortenſ. Aſtragon dictus.
Cereſolium.
Myrrhis nova æquicolorum & odorata.
Apium.
Cinera aculeata Hiſpanica.
Apium Italicum ſeu Seleri.
Lactuca Romana.
Cichoreum criſpum.
Harum quatuor folia & coſtæ ſeu Nervi medii, dealbata, evadunt tenera.
Chrithmum { Umbelliferum. Chryſanthemũ.
Folia utriuſque ſale, & aceto condita, Menſæ inſerviunt, hyeme pro acetario: quemadmodum,
Flores inexpanſi Capparis, Geniſtæ, & Naſturtii Indici, eodem modo ſale, & aceto Macerati hyemalibus Embammatis inſerviunt ut & fungi Eſculenti.
Cucumis, *hujus fructus, rudimenta: ſale, aceto & ſemine Anethi, condiuntur & Menſæ inferuntur.*

Plantæ Culinariæ.

Quarum ſemina Culinæ inſerviunt.

Sinapi.
Eruca.
Fœniculum.
Cuminum.
Carui.
Aniſum.
Coriandrum.
Anethum.

Plantæ

Plantæ Culinariæ.

Harum Turiones inſerviunt Culinæ.

Aſparagus.
Lupulus.
Sambucus.
Capſicum, *hujus ſiliquarum aut capſularum pelliculæ, locò Piperis in Gallaprovincia, Gallia Narbonenſi, aliiſq; locis, inſerviunt Culinæ. Quin & in Africa aceto, ſale & Saccharo condiuntur, & ab incolis avidè expetuntur pro Cordiali optimo.*
Cinera ſativa, *capita hujus, Culinæ inſerviunt.*

Plantæ Culinariæ.

Harum Fructus pulpoſi inſerviunt Culinæ, Menſæve.

MELO.
Pepo.
Cucumis.
Citrullus ſeu Anguria.
Cucurbita.

Arbores

Arbores Pomiferæ, quarum Fructus inſerviunt Culinæ, Menſæve.

Malus ejuſq; variæ ſpecies.
Pyrus ejuſque diverſæ ſpecies.
Malus { Aurantia. Limonia. Citria.
Malus { Cydonia. Punica.
Sorbus.
Ficus.
Meſpilus.
Morus.

Arbores, Oſſeam nucem, carne obductam, habentes; quarum Fructus exterior & interior inſerviunt Menſæ.

Malus { Perſica ejuſque diverſæ ſpecies. Armeniaca.
Prunus & ejus variæ ſpecies.
Ceraſus ejuſque variæ ſpecies.
Olea.
Palma.

Arbores Nuciferæ, harum fructus interior, inſervit Menſæ ſeu Culinæ.

Amygdalus.
Nux juglans.
Corylus.
Caſtanea.

Arbores

Arbores ſeu potius Frutices, quorum Fructus inſerviunt Culinæ, Menſæve.

Berberis.
Labruſca.
Vitis vinifera.
Rubus Idæus.
Rubus.
Ribes.
Uva criſpa.
Myrtillus Germanorum.
Fragaria, *hujus planta, fraga, inſerviunt Menſe.*

FINIS.